

Общероссийский математический портал


А. Н. Лившиц, Когомологии динамических систем, *Изв. АН СССР. Сер. матем.*, 1972, том 36, выпуск 6, 1296–1320

Использование Общероссийского математического портала Math-Net.Ru подразумевает, что вы прочитали и согласны с пользовательским соглашением
<http://www.mathnet.ru/rus/agreement>

Параметры загрузки:

IP: 95.216.226.236

9 ноября 2019 г., 07:59:42



А. Н. ЛИВШИЦ

КОГОМОЛОГИИ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

В работе сформулирован и доказан критерий когомولوجичности нулю функций на фазовых пространствах различных динамических систем (\mathcal{U} -системы, топологические цепи Маркова, системы Смейла) с коэффициентами в некоторых группах и изучены приложения этого критерия. (В простейшем случае преобразования $T: M \rightarrow M$ когомولوجичность нулю вещественной функции f означает, что $f(x) = g(Tx) - g(x)$.)

В работе ⁽¹⁾ изучались гомологии \mathcal{U} -систем с коэффициентами в аддитивной группе вещественных чисел и в других группах. Цель данной заметки заключается в том, чтобы дать подробное доказательство анонсированных и не доказанных там полностью фактов. Кроме того, одна теорема работы ⁽¹⁾ будет обобщена и усилена. Также мы укажем некоторые приложения доказанных фактов: к проблеме расширений динамических систем, к проблеме приводимости систем линейных дифференциальных уравнений, к проблеме существования интегрального инварианта. Будут рассмотрены также и другие вопросы.

§ 1. Определения и предварительные сведения

Пусть на замкнутом римановом многообразии гладко действует группа G , а Γ — некоторая топологическая группа с единицей e_Γ , являющаяся полным метрическим пространством. Пусть $\Gamma(M)$ обозначает группу непрерывных отображений $M \rightarrow \Gamma$. Коциклом называется функция $f(x, g)$, отображающая $M \times G$ в Γ и такая, что $f(x, g_1) \times f(xg_1, g_2) = f(x, g_1g_2)$. Два коцикла f_1 и f_2 называются когомولوجичными, если

$$f_1(x, g) = \varphi^{-1}(x) f_2(x, g) \varphi(xg)$$

для некоторой непрерывной функции $\varphi: M \rightarrow \Gamma$. В случае, когда группа $G = \mathbb{Z}$, для которой мы перейдем к аддитивной записи, коцикл определяется функцией $\bar{f}(x) = f(x, 1)$, а условие когомولوجичности имеет вид

$$\bar{f}_1(x) = \varphi^{-1}(x) \bar{f}_2(x) \varphi(Tx),$$

где T — действие образующего элемента группы G . Если G — аддитивная группа вещественных чисел и если потребовать, чтобы коциклы и

функции $\varphi(xg)$ по g были дифференцируемы и чтобы Γ была группой Ли, то коцикл определится функцией $\bar{f}: M \rightarrow \mathfrak{G}$ (\mathfrak{G} — алгебра Ли группы Γ),

$$\bar{f}(x) = \lim_{t \rightarrow 0} t^{-1} \exp^{-1}(\bar{f}(x, 0)^{-1} \bar{f}(x, t)),$$

где \exp^{-1} определено при малых t , а условие когомологичности коцикла нулю будет в терминах \bar{f} таково:

$$\bar{f}(x) = \lim_{t \rightarrow 0} t^{-1} \exp^{-1}((\varphi(x))^{-1} \varphi(T^t x)),$$

где T^t — поток, определенный действием группы R , а φ — некоторая функция $\varphi: M \rightarrow \Gamma$.

§ 2. Случай двусторонне инвариантной метрики в Γ

В (1) по сути дела доказана следующая теорема (теорема 1 и замечания к теореме 3), которая будет нами неоднократно использована.

ТЕОРЕМА 0. Если группа G есть \mathbf{Z} (или \mathbf{R}) и ее действие на римановом многообразии M^n определяет топологически транзитивный U -каскад (или U -поток), то для любой полной группы Γ с двусторонне инвариантной метрикой гёльдеровская функция $\bar{f}: M \rightarrow \Gamma$ ($\bar{f}: M \rightarrow \mathfrak{G}$) определяет когомологичный нулю коцикл $\bar{f}(x, g)$ тогда и только тогда, когда $xg = x$ влечет $\bar{f}(x, g) = e_\Gamma$, причем соответствующая функция φ тоже гёльдеровская.

ТЕОРЕМА 1. Пусть S — эндоморфизм тора \mathbf{T}^n , представляющийся матрицей с простыми элементарными делителями, все собственные значения которой вещественны и отличны от ± 1 . Если для некоторой функции $f \in C^{r+\delta}$, где $r \geq 1$, $0 < \delta \leq 1$, все r -ые смешанные производные имеют абсолютно сходящиеся ряды Фурье, существует такая функция $g \in L^1(\mathbf{T}^n)$, что почти всюду $f(x) = g(Sx) - g(x)$, то функция g совпадает почти всюду с функцией $g' \in C^{r+\delta}$ и при всех x из \mathbf{T}^n $f(x) = g'(Sx) - g'(x)$.

Доказательство. В (1) (замечание 3 к теореме 1 и теорема 2) показано, что g' может быть взята из $C^1(\mathbf{T}^n)$, и сосчитана производная вдоль произвольного вектора X , сжимающегося под действием S :

$$g'_x(a) = \sum_0^\infty (\tilde{S}^k X, df(S^k a)),$$

где a — точка, в которой считается производная, \tilde{S}^k — дифференциал диффеоморфизма S , и, аналогично, для расширяющегося вектора X

$$g'_x(a) = \sum_0^\infty (\tilde{S}^{-k} X, df(S^{-k} a)).$$

Вследствие предположенной в условии теоремы полупростоты \tilde{S} в касательном пространстве к \mathbf{T}^n , в каждой точке может быть выбран базис из собственных векторов \tilde{S} . В связи с параллелизуемостью тора мы будем

считать, что все рассматриваемые нами в дальнейшем векторы отнесены к одной точке. Достаточно доказать, что существуют и лежат в $\text{Lip}^\delta(\mathbb{T}^n)$ все смешанные производные g' порядков до r включительно вдоль собственных направлений S .

Будет использован тот очевидный факт, что если $f \in C^{r+\delta}$ и все r -ые смешанные производные имеют абсолютно суммируемые ряды Фурье, то $f \in C^{r'+\delta}$ и все r' -ые смешанные производные f также имеют абсолютно суммируемые ряды Фурье, если $r' < r$. Допустим, что для всех r' , меньших данного r , наша теорема доказана. Поскольку, как уже отмечалось, для $r=1$ она доказана в ⁽¹⁾ даже без предположения абсолютной суммируемости рядов Фурье производных, достаточно совершить индукционный переход. Пусть X_1, \dots, X_r — некоторый набор собственных векторов S единичной длины, $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ — соответствующие собственные значения.

I случай. $|\lambda_1 \dots \lambda_r| \neq 1$. Допустим, что $|\lambda_1 \dots \lambda_r| < 1$ (случай $|\lambda_1 \dots \lambda_r| > 1$ аналогичен). Расположим собственные векторы и собственные числа S в следующем порядке:

$$y_1, \dots, y_k, y_{k+1}, \dots, y_r; \beta_1, \dots, \beta_k, \beta_{k+1}, \dots, \beta_r,$$

где β_i — собственное число, отвечающее собственному вектору y_i , $|\beta_1| < 1, \dots, \dots, |\beta_k| < 1, |\beta_{k+1}| > 1, \dots, |\beta_r| > 1$.

Докажем существование непрерывной производной g_{y_1, \dots, y_r} . Тем самым с помощью индукционного предположения и обычных теорем о повторных производных I случай будет полностью рассмотрен. Но из нашей формулы для производной g_{y_i} последовательным дифференцированием ее по y_i как функционального ряда (это дифференцирование законно вследствие расположения β_i) мы получаем, что $g_{y_1, \dots, y_r}(A)$ существует, равна

$$\sum_0^\infty (\beta_1 \dots \beta_r)^k f_{y_1, \dots, y_r}(S^k A)$$

в каждой точке $A \in \mathbb{T}^n$ и тем самым принадлежит $\text{Lip}^\delta(\mathbb{T}^n)$.

II случай. $\lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_r = \pm 1$. Если $\lambda_1 \dots \lambda_r = -1$, то заменяя S на S^2 , а $f(x)$ — на $f_1(x) = f(x) + f(Sx)$, мы сводим все к случаю $\lambda_1 \dots \lambda_r = 1$, который мы и будем впредь рассматривать. Пусть D — оператор смешанного дифференцирования вдоль направлений X_1, \dots, X_r , отвечающих, соответственно, собственным числам $\lambda_1, \dots, \lambda_r$:

$$(Dg)(x) = g_{X_1 \dots X_r}(x).$$

Если $g(Sx) - g(x) = f(x)$ и если бы существовала непрерывная функция $Dg(x)$, то мы имели бы $D(Us_g) - Dg = Df$, где $(Us_g)(x) = g(Sx)$ вследствие $\lambda_1 \dots \lambda_r = 1$, и $Dg(Sx) - Dg(x) = Df(x)$. Таким образом, мы должны доказать, что Df гомологична нулю в C . Рассмотрим ряды Фурье f и Df :

$$f = \sum_x c_x \chi, \quad Df = \sum_x b_x \chi,$$

где χ пробегает характеры тора. Очевидно, что $D\chi = a_\chi \chi$, где a_χ — некоторое число; это следует из общего вида χ :

$$\chi = e^{2\pi i \sum m_j \theta_j},$$

где θ_j — циклические координаты на торе \mathbb{T}^n . Но так как $(D(U_S \chi))(x) = D\chi(Sx)$, то $a_\chi = a_{U_S \chi}$. Из вышесказанного следует, что a_χ постоянно на любой траектории Q преобразования U_S в группе характеров тора. А поскольку $\sum_{\chi \in Q} c_\chi = 0$ (вследствие кохомологичности f нулю в $L^1(\mathbb{T}^n)$), то и

$\sum_{\chi \in Q} b_\chi = \sum_{\chi \in Q} a_\chi c_\chi = 0$. Докажем теперь, что для любой периодической траектории $\{S^k x_0\}_1^m$ в торе \mathbb{T}^n

$$\sum_1^m (Df)(S^k x_0) = 0.$$

В самом деле, $Df = \sum_Q \varphi_Q$, где $\varphi_Q = \sum_{\chi \in Q} b_\chi \chi$,

$$\sum_1^m \varphi_Q(S^k x_0) = \sum_1^m \sum_{\chi \in Q} b_\chi \chi(S^k x_0) = \sum_{\chi \in Q} b_\chi \sum_1^m \chi(S^k x_0).$$

Но для периодической точки x_0 , $S^m x_0 = x_0$, сумма $\sum_1^m \chi(S^k x_0)$ для всех χ из одной траектории Q одинакова, ибо если $\chi_1 = U_{S^l} \chi_2$, то

$$\sum_1^m \chi_1(S^k x_0) = \sum_1^m \chi_2(S^{k+l} x_0) = \sum_{1-l}^{m-l} \chi_2(S^{k+l} x_0) = \sum_1^m \chi_2(S^k x_0).$$

Поэтому $\sum_1^m \varphi_2(S^k x_0) = 0$ и $\sum_1^m (Df)(S^k x_0) = 0$ (мы неоднократно использовали абсолютную сходимость ряда Фурье Df). Из теоремы 0 следует теперь, что Df кохомологична 0 в $\text{Lip}^0(\mathbb{T}^n)$.

Среди функций $U(x)$ таких, что $U(Sx) - U(x) = (Df)(x)$, выберем ту, которая в разложении Фурье имеет нулевой коэффициент при тривиальном характере. Но эта функция и будет Dg . Действительно, пусть $g = \sum_{\chi} d_\chi \chi$ —

ряд Фурье функции g . Применив к нему формально оператор D , получим ряд $\sum_{\chi} a_\chi d_\chi \chi$. Мы знаем, что $(Dg)(Sx) - (Dg)(x) = (Df)(x)$ в множестве формальных рядов Фурье. Пусть, далее, ряд Фурье нашей функции есть $\sum_{\chi} p_\chi \chi$. В пространстве формальных рядов Фурье теперь окажется

$$((Dg)(Sx) - U(Sx)) - ((Dg)(x) - U(x)) = 0,$$

т. е.

$$a_{\kappa}d_{\kappa} - p_{\kappa} = a_{U_{S^{\kappa}}}d_{U_{S^{\kappa}}} - p_{U_{S^{\kappa}}}.$$

Таким образом, последняя разность постоянна на траектории в группе характеров. Но мы видели, что a_{κ} постоянна на траектории в группе характеров; d_{κ} стремится к 0 вдоль траекторий как коэффициент Фурье функции g ; p_{κ} — стремится к 0 вдоль траекторий как коэффициент Фурье функции U . Поэтому $a_{\kappa}d_{\kappa} - p_{\kappa} = 0$, т. е. $Dg = \sum p_{\kappa} \kappa = U$, где $u \in \text{Lip}^{\delta}(\mathbb{T}^n)$. Таким образом, мы доказали, что ряд Фурье функции g имеет формальные смешанные производные порядков до r включительно, являющиеся рядами Фурье функций из $\text{Lip}^{\delta}(\mathbb{T}^n)$. Докажем, что из этого следует принадлежность g к $C^{r+\delta}$.

Будем для удобства изучать дифференцируемость не по собственным направлениям S , а по θ_i , где θ_i — циклические координаты на торе. Пусть нам нужно доказать существование производной $g_{\theta_{i_1} \dots \theta_{i_r}}$. Согласно предположению индукции существует $g_{\theta_{i_2} \dots \theta_{i_r}}$ и лежит в $\text{Lip}^{\delta}(\mathbb{T}^n)$. Зафиксируем значения всех координат θ_i , кроме θ_{i_1} . Пусть

$$\varphi(\theta_{i_1}) = g_{\theta_{i_2} \dots \theta_{i_r}}(\theta_1 \dots \theta_{i_1} \dots \theta_r),$$

где θ_{i_1} — переменная координата. Тогда ряд Фурье $\varphi(\theta_{i_1})$ и формальный ряд Фурье $\varphi'(\theta_{i_1})$ равномерно сходятся как ряды Фурье гёльдеровских функций. Теперь уже существование производной $g_{\theta_{i_1} \dots \theta_{i_r}}$ и принадлежность ее к $\text{Lip}^{\delta}(\mathbb{T}^n)$ следует из ранее доказанного и теоремы о дифференцировании функциональных рядов. Теорема доказана.

Как известно, функция на n -мерном торе, лежащая в $C^{\left[\frac{n}{2}\right]+1}$, имеет абсолютно сходящийся ряд Фурье (доказательство такое же, как для одномерного случая — см. (8), т. I, стр. 384). Таким образом, «утрата гладкости» — $\left[\frac{n}{2}\right] + 1$, и если $f \in C^{\infty}$, то $g \in C^{\infty}$. По тем направлениям, для которых произведения собственных значений отличны от единицы по модулю, дифференцируемость не утрачивается даже и без предположения о полупростоте \tilde{S} над R .

Сейчас будут даны некоторые обобщения и усиления теоремы 0.

§ 3. Более сложные группы Γ

О п р е д е л е н и е. Топологическая группа Γ называется хорошей, если она допускает эквивалентные правоинвариантную и левоинвариантную метрики ρ_{Π} и ρ_{Λ} такие, что Γ , метризованная посредством этих метрик, является полным метрическим пространством, и для любой пары точек $(x_1, x_2) \in \Gamma \times \Gamma$

$$\frac{\rho_{\Lambda}(x_1, x_2)}{\rho_{\Lambda}(gx_1g^{-1}, gx_2g^{-1})} \rightarrow 1, \quad \frac{\rho_{\Pi}(x_1, x_2)}{\rho_{\Pi}(gx_1g^{-1}, gx_2g^{-1})} \rightarrow 1$$

при $g \rightarrow e_G$. Это стремление равномерно по (x_1, x_2) в Γ на ограниченных множествах.

Разумеется, все конечномерные группы Ли хороши. Вероятно, возможна аналогичная трактовка для некоторых бесконечномерных групп.

ТЕОРЕМА 2. Если группа G есть \mathbf{Z} (или \mathbf{R}) и ее действие (класса C^2) на многообразии M определяет \mathcal{U} -каскад (или \mathcal{U} -поток) со свойством топологической транзитивности, то в каждой хорошей группе Γ , существует такая окрестность единицы U (в алгебре Ли хорошей группы Ли Γ существует такая окрестность нуля U), что гёльдеровская функция $\bar{f}: M \rightarrow U$ определяет когомологичный нулю коцикл $\bar{f}(x, g)$ тогда и только тогда, когда $\bar{f}(x, g) = e_G$.

Доказательство. Рассмотрим случай каскада $\{T^n\}_{-\infty}^{\infty}$. В работе ⁽¹⁾ была использована следующая лемма (мы предполагаем, что многообразие M снабжено ляпуновской метрикой $d(x, y)$ относительно T ⁽²⁾).

ЛЕММА. Существует $K > 0$ такое, что для всякого $\varepsilon > 0$ можно найти такое N_ε , что если $n > N_\varepsilon$, то из $d(T^n x, x) < \varepsilon$ следует, что существует точка x_0 , для которой $T^n x_0 = x_0$ и $d(T^l x_0, T^l x) < K\varepsilon$ при $1 \leq l \leq n$.

Пусть $\{T^n x\}^\infty$ — всюду плотная траектория. Будем, как и в работе ⁽¹⁾, строить на ней и пытаться продолжить с нее по непрерывности функцию $\varphi(T^n x) = \bar{f}(x)\bar{f}(Tx) \dots \bar{f}(T^{n-1}x)$. Воспользуемся сейчас левоинвариантной метрикой ρ_A в группе Γ . Допустим, что $d(T^{m-1}x, T^{n-1}x) < \varepsilon$ и, для начала, $|m-n| > N_\varepsilon$. Тогда существует периодическая точка x_0 из леммы, а также лежащая с ней в одном сжимающемся слое точка S , такие, что $T^{n-m+1}x_0 = x_0$,

$$d(T^k S, T^k x_0) < CQ^{m-k} \times d(T^{m-1}x, T^{n-1}x)$$

и

$$d(T^k S, T^k x_0) < Q^{k-n} \times C \times d(T^{m-1}x, T^{n-1}x), \quad m < k \leq n-1,$$

где $C > 0$, $Q > 1$ — константы, зависящие лишь от \mathcal{U} -системы T на M . Это легко следует из леммы и определения \mathcal{U} -системы. Из левоинвариантности ρ_A следует, что

$$\begin{aligned} \rho_A(\varphi(T^{m-1}x), \varphi(T^{n-1}x)) &= \rho_A(e_G, \bar{f}(T^m x) \dots \bar{f}(T^{n-1}x)) = \\ &= \rho_A(\bar{f}(T^m x_0) \dots \bar{f}(T^{n-1}x_0), \bar{f}(T^m S) \dots \bar{f}(T^{n-1}S)) \end{aligned}$$

в силу условия теоремы, которое для $G = \mathbf{Z}$ как раз и означает, что для периодической точки x_0

$$\bar{f}(T^m x_0) \dots \bar{f}(T^{n-1}x_0) = e_G.$$

Следовательно,

$$\begin{aligned} \rho_A(\varphi(T^{n-1}x), \varphi(T^{m-1}x)) &\leq \rho_A(\bar{f}(T^m x_0) \dots \bar{f}(T^{n-1}x_0), \bar{f}(T^m S) \dots \bar{f}(T^{n-1}S)) + \\ &+ \rho_A(\bar{f}(T^m S) \dots \bar{f}(T^{n-1}S), \bar{f}(T^m x) \dots \bar{f}(T^{n-1}x)). \end{aligned}$$

Допустим, что показатель гёльдеровости функции f равен δ . Обозначим $\bar{f}(T^{m+k-1}x_0)$ через a_k , $\bar{f}(T^{m+k-1}S)$ — через b_k , $\bar{f}(T^{m+k-1}x)$ — через c_k , $d(\varphi(T^{n-1}x), \varphi(T^{m-1}x))$ — через ε . Из определения \mathcal{U} -системы, гёльдеровости f и условия теоремы следует, что

$$a_1 \dots a_{n-m} = e_\Gamma, \quad \rho_\Lambda(a_k, b_k) < K_1 Q^{-\delta(k-1)} \varepsilon^\delta, \\ \rho_\Lambda(b_k, c_k) < K_1 Q^{-\delta(n-m-1-k)} \varepsilon^\delta. \quad (1)$$

План дальнейшего доказательства следующий. Мы установим существование такой окрестности U единицы e_Γ группы Γ (она и будет искомой окрестности из условия), что если $a_i \in U$, $b_i \in U$, $c_i \in U$, то существует константа K_2 такая, что выполнение соотношений (1) влечет оценку $\rho_\Lambda(e_\Gamma, c_1, \dots, c_n) < K_2 \varepsilon^\delta$. Тем самым для нашего случая будет доказано, что

$$\rho_\Lambda(\varphi(T^m x), \varphi(T^n x)) < K_2 \times d(T^{m-1}x, T^{n-1}x)^\delta,$$

если $|m-n| > N_{d(T^{m-1}x, T^{n-1}x)}$ (см. лемму). Если $|m-n| < N_{d(T^{m-1}x, T^{n-1}x)}$, то, как и в работе ⁽¹⁾, пользуясь всюду плотностью нашей траектории $\{T^1 x\}_0^\infty$, найдем такое q , что

$$d(T^q x, T^{m-1}x) < d(T^{m-1}x, T^{n-1}x), \quad d(T^q x, T^{n-1}x) < d(T^{m-1}x, T^{n-1}x), \\ |q-m| > N_{d(T^{m-1}x, T^{n-1}x)}, \quad |q-n| > N_{d(T^{m-1}x, T^{n-1}x)}$$

и, стало быть, предыдущее неравенство будет доказано для любых m и n , а функция φ будет продолжима по непрерывности на все многообразие.

Кроме метрики ρ_Λ мы будем пользоваться также правоинвариантной метрикой ρ_Π в группе Γ , для которой тоже справедливы соотношения (1). Поскольку ρ_Λ и ρ_Π эквивалентны, то существует окрестность единицы V в Γ , в которой

$$\frac{1}{R} \rho_\Pi(v_1, v_2) < \rho_\Lambda(v_1, v_2) < R \rho_\Pi(v_1, v_2),$$

где R — некоторая константа, v_1, v_2 — любые элементы из V . Пусть U — такая окрестность e_Γ , все элементы u которой обладают следующим свойством:

$$\rho_\Pi(g_1, g_2) < D \rho_\Gamma(ug_1 u^{-1}, ug_2 u^{-1}), \quad \rho_\Lambda(g_1, g_2) < D \rho_\Lambda(ug_1 u^{-1}, ug_2 u^{-1}),$$

где g_1, g_2 — любые элементы Γ , а $D: 1 < D < Q^\delta$ — некоторая константа. Пусть, наконец, ε столь мало, что шары в метриках ρ_Π и ρ_Λ с центром в e_Γ и радиусом $H = (R+1) \times K_1, \varepsilon^\delta (1-DQ^{-\delta})^{-1}$ лежат в V . Тогда

$$\rho_\Pi(a_1, \dots, a_{n-m}, b_1, \dots, b_{n-m}) < \rho_\Pi(a_1, \dots, a_{n-m}, b_1 a_2, \dots, a_{n-m}) + \\ + \rho_\Pi(b_1 a_2, \dots, a_{n-m}, b_1 b_2 a_3, \dots, a_{n-m}) + \dots + \rho_\Pi(b_1, \dots, b_{n-m-1} a_{n-m}, b_1, \dots, b_{n-m}) = \\ = A_1 + \dots + A_{n-m}.$$

Но $A_1 < C_1 \varepsilon^\delta < H_1$, значит, $b_1 a_2, \dots, a_{n-m} \in V$,

$$A_2 = \rho_{\Pi}(b_1 a_2, \dots, a_{n-m}, b_1 b_2 a_3, \dots, a_{n-m}) < D \rho_{\Pi}(a_2, \dots, a_n b_1^{-1}, b_2 a_3, \dots, a_n b_1^{-1}) = \\ = D \rho_{\Pi}(a_2, b_2) < K D Q^{-\delta} \varepsilon^\delta$$

(что следует из (1)). Следовательно, $A_2 + A_1$ меньше H и $b_1 b_2 a_3, \dots, a_{n-m} \in V$. Поступая и далее таким же образом, мы убедимся, во-первых, что $b_1, \dots, b_{n-m} \in V$ и, во-вторых, что

$$\rho_{\Pi}(a_1, \dots, a_{n-m}, b_1, \dots, b_{n-m}) < K_1 \varepsilon^\delta (1 - D Q^{-\delta})^{-1}.$$

Теперь оценим $\rho_{\Lambda}(b_1, \dots, b_{n-m}, c_1, \dots, c_{n-m})$:

$$\rho_{\Lambda}(b_1, \dots, b_{n-m}, c_1, \dots, c_{n-m}) < \rho_{\Lambda}(b_1, \dots, b_{n-m}, b_1 b_2, \dots, b_{n-m-1} c_{n-m}) + \\ + \rho_{\Lambda}(b_1 b_2, \dots, b_{n-m-1} c_{n-m}, b_1, \dots, b_{n-m-2} c_{n-m-1} c_{n-m}) + \dots$$

$$\dots + \rho_{\Lambda}(b_1 c_2, \dots, c_{n-m}, c_1, \dots, c_{n-m}) = B_1 + B_2 + \dots + B_{n-m}, \quad B_1 > K_1 \varepsilon^\delta$$

(вследствие (1)), значит,

$$\rho_{\Lambda}(a_1, \dots, a_{n-m}, c_1, \dots, c_{n-m-1} b_{n-m}) < R K_1 \varepsilon^\delta (1 - D Q^{-1})^{-1} + B_1 < H,$$

т. е. $c_1, \dots, c_{n-m-1} b_{n-m} \in V$.

Далее,

$$B_2 = \rho_{\Lambda}(b_1 b_2, \dots, b_{n-m-1} c_{n-m}, b_1, \dots, b_{n-m-2} c_{n-m-1} c_{n-m}) < D \times \\ \times \rho_{\Lambda}(c_{n-m}^{-1} b_1, \dots, b_{n-m-1}, c_{n-m}^{-1} b_1, \dots, b_{n-m-2} c_{n-m-1}) < D K_1 Q^{-\delta} \varepsilon^\delta.$$

Поэтому

$$\rho_{\Lambda}(a_1, \dots, a_{n-m}, b_1, \dots, b_{n-m-2} c_{n-m-1} c_{n-m}) < \\ < R K_1 \varepsilon^\delta (1 - D Q^{-\delta})^{-1} + B_1 + B_2 < H,$$

т. е. $b_1, \dots, b_{n-m-2} c_{n-m-1} c_{n-m} \in V$ и так далее. Окончательно мы получаем:

$$\rho_{\Lambda}(a_1, \dots, a_{n-m}, c_1, \dots, c_{n-m}) \leq H = K_1 (R + 1) (1 - D Q^{-\delta})^{-1} \varepsilon^\delta,$$

т. е. в качестве искомого K_2 для малых ε можно взять $K_1 (R + 1) (1 - D Q^{-\delta})^{-1}$. Значит, для случая U -каскада теорема доказана.

Для U -потока соответствующая лемма о периодических траекториях гласит следующее [см. (1)].

ЛЕММА. *Существуют P_1, P_2 такие, что для всякого ε можно найти F_ε , что если $t > F_\varepsilon$, то из $d(T^t x, x) < \varepsilon$ следует, что существуют x_0 и t_0 , $t_0 < |t_0 - t| < P_1 \varepsilon$, для которых $T^{t_0} x_0 = x_0$ и $d(T^s x, T^s x_0) < P_2 \varepsilon$ при $0 < s \leq \min(t_0, t)$.*

По аналогии со случаем U -каскада мы должны доказать существование такой окрестности U нуля в алгебре Ли группы Γ , что если ρ' — метрика в алгебре Ли,

$$A: [0, T] \rightarrow U, \quad B: [0, T] \rightarrow U, \quad C: [0, T] \rightarrow U$$

— три любых непрерывных отображения отрезка $[0, T]$ в U ,

$$F_A: [0, T] \rightarrow \Gamma, \quad F_B: [0, T] \rightarrow \Gamma, \quad F_C: [0, T] \rightarrow \Gamma$$

— отображения того же отрезка в Γ такие, что $F_A(0) = F_B(0) = F_C(0) = e_\Gamma$ и $\lim_{t \rightarrow 0} t^{-1} \exp^{-1}(F_X(t_0)^{-1} F_X(t_0 + t)) = X(t_0)$, (X — это A, B, C), то если $F_A(T) = e_\Gamma$, $\rho'(A(t), B(t)) < K_1 Q^{-\delta t} \epsilon^\delta$, $\rho'(B(t), C(t)) < K_1 Q^{-\delta t} \epsilon^\delta$, $0 \leq t \leq T$, то $\rho_\Lambda(e_\Gamma, F_C(T)) < K_2 \epsilon^\delta$, где ρ_Λ — левоинвариантная метрика, порожденная метрикой в алгебре Ли, а K_2 — константа. Рассуждения, необходимые для доказательства этого факта, практически ничем не отличаются от тех, которые были только что проведены для случая каскада. Сформулируем лишь новое определение U . U — это такая окрестность нуля в алгебре Ли, что

$$\begin{aligned} \rho_\Pi(g_1, g_2) &< D^t \rho_\Pi(\exp(tu) g_1 \exp(-tu), \exp(tu) g_2 \exp(-tu)), \\ \rho_\Lambda(g_1, g_2) &< D^t \rho_\Lambda(\exp(tu) g_1 \exp(-tu), \exp(tu) g_2 \exp(-tu)), \end{aligned}$$

где g_1, g_2 — любые элементы Γ , а D , $1 < D < Q^\delta$, — некоторая константа (через Q обозначен «коэффициент расширения U -потока на единицу длины»). После этого редукция к рассуждениям для каскада получается тривиальным применением метода сеток. Таким образом, теорема доказана.

Рассмотрим теперь случай конечномерной группы Ли.

ТЕОРЕМА 3. Если группа G есть \mathbf{Z} (или \mathbf{R}) и ее действие (класса C^2) на многообразии M определяет U -каскад (U -поток), имеющий всюду плотную траекторию, то для каждой конечномерной группы Ли Γ гёльдеровская функция $\bar{f}: M \rightarrow \Gamma$ ($\bar{f}: M \rightarrow \mathfrak{G}$) определяет когомологичный нулю коцикл $f(x, g)$ тогда и только тогда, когда $xg = x$ влечет $f(x, g) = e_\Gamma$.

Доказательство. Сформулируем известный результат.

ЛЕММА 1. Для любой связной группы Ли Γ существует последовательность $\Gamma = \Gamma_1 \xrightarrow{i_1} \Gamma_2 \xrightarrow{i_2} \dots \xrightarrow{i_{n-1}} \Gamma_r = KN$, где K — компактная группа, N — одностовая разрешимая, i_k — эпиморфизмы с коммутативными ядрами $[{}^{(3)}$, стр. 149–150, 248, 257].

ЛЕММА 2. Если A — замкнутый коммутативный нормальный делитель группы C и для группы C/A теорема 3 верна, то она верна и для группы C .

ЛЕММА 3. Теорема 3 верна для группы вида KN .

Рассуждения в доказательствах леммы 2 и леммы 3 весьма схожи. Мы рассмотрим полностью технически наименее громоздкий частный случай леммы 2, достаточный в случае, когда Γ односвязна.

ЛЕММА 2'. Если утверждение теоремы 3 верно для групп Ли Γ_1 и Γ_2 и группа Γ_2 гладко действует автоморфизмами на Γ_1 , то это утверждение верно и для полупрямого произведения $\Gamma_1 \cdot \Gamma_2$ этих групп.

Доказательство. Обозначим для элемента $y \in \Gamma_2$ через $\varphi(y)$ автоморфизм группы Γ_1 — действие y . Тогда если $x, x' \in \Gamma_1$ и $y, y' \in \Gamma_2$, то умножение в $\Gamma_1 \cdot \Gamma_2$ будет следующим:

$$(x, y)(x', y') = (x \cdot \varphi(y)(x'), y \cdot y').$$

Пусть функция $\bar{f}: M \rightarrow \Gamma_1 \cdot \Gamma_2$ имеет вид $\bar{f}(x) = (f_1(x), f_2(x))$. Из определения умножения в группе $\Gamma_1 \cdot \Gamma_2$ и из условия теоремы 3 следует, что для любой периодической точки x_0 , $T^m x_0 = x_0$ (T — действие образующей группы $G = \mathbb{Z}$)

$$\bar{f}(x_0) \cdot \bar{f}(Tx_0) \dots \bar{f}(T^{m-1}x_0) = e_{\Gamma_1 \cdot \Gamma_2}$$

и, значит,

$$f_2(x_0) \dots f_2(T^{m-1}x_0) = e_{\Gamma_2}.$$

Отсюда вытекает, что f_2 когомологична нулю в группе гёльдеровских отображений M в Γ . Следовательно, существует отображение $\varphi_2: M \rightarrow \Gamma$ такое, что $f_2(x) = \varphi_2(x)^{-1} \varphi_2(Tx)$ с гёльдеровской функцией φ_2 . Учитывая это, снова используем тот факт, что

$$\bar{f}(x_0) \cdot \bar{f}(Tx_0) \dots \bar{f}(T^{m-1}x_0) = e_{\Gamma_1} \cdot e_{\Gamma_2}.$$

Из него следует, что

$$\begin{aligned} & (f_1(x_0) \cdot \psi(\varphi_2(x_0)^{-1} \varphi_2(Tx_0)) (f_1(Tx_0)) \times \\ & \times \psi(\varphi_2(x_0)^{-1} \varphi_2(T^2x_0)) (f_1(T^2x_0)) \dots \psi(\varphi_2(x_0)^{-1} \varphi_2(T^{m-1}x_0)) (f_1(T^{m-1}x_0)) \end{aligned}$$

(по формуле умножения в полупрямом произведении), значит,

$$\begin{aligned} & \psi(\varphi_2(x_0))^{-1} [\psi(\varphi_2(x_0)) (f_1(x_0))] [\psi(\varphi_2(Tx_0)) (f_1(Tx_0))] \dots \\ & \dots [\psi(\varphi_2(T^{m-1}x_0)) (f_1(T^{m-1}x_0))] = e_{\Gamma_1}. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$[\psi(\varphi_2(x_0)) (f_1(x_0))] \dots [\psi(\varphi_2(T^{m-1}x_0)) (f_1(T^{m-1}x_0))] = e_{\Gamma_1}$$

для любой периодической точки x_0 . Но функция $g(x) = \psi(\varphi_2(x)) (f_1(x))$ гёльдеровская и, стало быть, удовлетворяет условию когомологичности нулю в Γ_1 . Поэтому для некоторой функции $\varphi_1(x)$ имеем:

$$g(x) = \psi(\varphi_2(x)) (f_1(x)).$$

Теперь из определения нашего полупрямого произведения непосредственно можно получить, что для отображения $\varphi: M \rightarrow \Gamma$, $\varphi(x) = (\varphi_1(x), \varphi_2(x))$,

$$\bar{f}(x) = \varphi^{-1}(x) \varphi(Tx).$$

Тем самым теорема 3 доказана.

Случай потока рассматривается аналогично.

Замечание 1. Доказательство леммы 2 протекает аналогично доказательству леммы 2'.

Если мы обозначим C/A через P , то групповая структура C может быть определена на $A \times P$ с помощью гомоморфизма $\psi: P \rightarrow \text{Aut}(A)$ и системы факторов $f: P \times P \rightarrow A$ (f разрывна), $f(x, 1) = 0 = f(1, y)$,

$$\psi(x)(f(y, z)) + f(x, yz) = f(x, y) + f(xy, z) \quad (1)$$

(групповая операция в A записывается аддитивно; в P — мультипликативно). Тогда имеем:

$$(a_1, p_1) + (a_2, p_2) = (a_1 + \psi(p_1)(a_2) + f(p_1, p_2), p_1 p_2).$$

Предполагая теорему выполненной для группы P , мы проведем, пользуясь (1), формальные выкладки, аналогично лемме для односвязных групп, и получим, что для некоторой функции $g: M \rightarrow A$ суммы по периодам — нулевые, но она не гёльдеровская, потому что в нее уже будет входить разрывное (возможно) отображение f , задающее систему факторов. Однако если мы функцию $\varphi = (\varphi_1, \varphi_2)$ будем получать по $f = (f_1, f_2)$ стандартным методам продолжения с всюду плотной траектории, то достаточно показать следующее: для каждого куска траектории $T^m x, \dots$

..., $T^n x$, для которого $\rho(T^m x, T^n x)$ мало, сумма $\sum_{m+1}^n g(T^i x)$ тоже мала

при каком-нибудь выборе системы факторов в том же классе двумерных когомологий, что и f . Действительно, тогда вследствие предположенных коммутативности A и справедливости теоремы для P , влекущей существование непрерывной φ_2 , будут близки

$$((f_1(x), f_2(x)) \dots (f_1(T^m x), f_2(T^m x))) \text{ и } ((f_1(x), f_2(x)) \dots (f_1(T^n x), f_2(T^n x)))$$

(при этом, как и выше, надо использовать непрерывность φ_2 на M). Но если мы возьмем y и z такие, что $T^{n-m} z = z$, y лежит в одном сжимающемся слое с z и в одном расширяющемся с $T^m x$, $\rho(y, z)$ и $\rho(T^n x, T^{n-m} y)$ малы (как обычно), то, конечно, можно, выбрать систему факторов так, чтобы наши обычные экспоненциальные оценки для $g(T^i y)$, $g(T^i z)$, $g(T^{m+i} x)$ (как в (1) или здесь в теореме 2) сохранялись, что и требовалось. В случае потока мы будем методом сеток заменять интегралы суммами и после этого варьировать выбор системы факторов. Доказательство леммы 3, конечно, тоньше, ввиду отсутствия в произведении KN структуры расширения, но компактность группы K спасает дело.

Разумеется, снова приходится пользоваться леммой о периодической аппроксимации и тем фактом, что разрешимая односвязная группа получается из прямой R несколькими полупрямыми умножениями на R .

То, что алгебраические конструкции теоремы 3 работают, естественно: ведь верна «локальная» теорема 2.

З а м е ч а н и е 2. Аналогично работе (1) можно доказать, что во всех рассмотренных случаях когомологичности коцикла нулю гладкость отображения \bar{f} влечет гладкость соответствующего отображения φ . Кроме того, если \bar{f} — гёльдеровская, то φ — гёльдеровская и ее гёльдеровский модуль непрерывности не превосходит гёльдеровского модуля непрерыв-

ности \bar{f} , умноженного на некоторую положительную константу. И, наконец, требование гёльдеровости f можно заменить требованием

$$\int_0^1 \frac{\omega(\rho)}{\rho} < \infty,$$

где $\omega(\rho)$ — модуль непрерывности, и тогда f будет непрерывным отображением M в Γ . Легко, тем не менее, показать что непрерывности функции f недостаточно.

§ 4. Топологические цепи Маркова и системы Смейла

Рассмотрим теперь аналог нашей теоремы для сдвига f в пространстве Ω_Π (4), где $\Pi = \{\pi_{ij}\}$ — матрица переходов некоторой транзитивной топологической цепи Маркова, т. е. Ω_Π — пространство последовательностей $\omega = \{\dots i_{-n} \dots i_0 \dots i_n \dots\}$, для которых $\pi_{i_s i_{s+1}} = 1$ при всех s . Транзитивность означает, что матрица Π^m для достаточно больших m имеет только строго положительные элементы.

Я. Г. Синай ввел пространство F_ρ функций на Ω_Π с «быстрым убыванием зависимости». Несколько обобщая его определение, мы будем через $F_{\rho, \Gamma}$ обозначать группу отображений M в Γ , где Γ — произвольная группа Ли со следующим свойством: для любых x_1 и x_2

$$d(g(x_1), g(x_2)) < C_g \rho^{K(x_1, x_2)}, \quad 0 < \rho < 1,$$

где C_g — константа, d — метрика в группе Γ , а $K(x_1, x_2)$, $x_1, x_2 \in \Omega_\Pi$, есть наименьший модуль номера несовпадающих координат точек x_1 и x_2 . Определение когомولوجичности прежнее.

ТЕОРЕМА 4. Если $g \in F_{\rho, \Gamma}$, то g когомولوجична нулю тогда и только тогда, когда для всякой точки $\omega_1 \in \Omega_\Pi$, $f^n \omega_1 = \omega_1$, верно $g(\omega_1) \dots g(f^{n-1} \omega_1) = e_\Gamma$, причем соответствующая функция h лежит в $F_{\rho, \Gamma}$ и сопоставление $g \rightarrow h$ можно выбрать непрерывным в естественной метрике $F_{\rho, \Gamma}$.

Доказательство. Мы будем предполагать, что Γ имеет двусторонне инвариантную метрику d . Редукция задачи к этому случаю проведена в доказательстве предыдущей теоремы. Поскольку наша топологическая марковская цепь транзитивна, найдется такая точка $\omega \in \Omega_\Pi$, что ее траектория $\{f^n \omega\}$ будет всюду плотна в Ω_Π в слабой топологии. Зададим на ней функцию $h: h(f^n \omega) = g(f^{-1} \omega) \dots g(f^{n-1} \omega)$. Пусть $K(f^l \omega, f^j \omega) = K$. Тогда ω имеет вид $\{\dots i_{-n} \dots i_0 \dots i_n \dots\}$, причем для $|r| \leq K$ $i_{l+r} = i_{j+r}$. Отсюда и из определения топологической марковской цепи очевидным образом следует, что существует точка $\omega' \in \Omega_\Pi$, имеющая период $j-l$ и в местах с номерами $-k+l+1 \dots j+1$ координаты, совпадающие с координатами ω (этим требованиям ω' определена однозначно). Из двусторонней инвариантности метрики d , определения ω' и

принадлежности g группе $F_{\rho, \Gamma}$ следует теперь, что

$$\begin{aligned} d(g(f^l \omega') \dots g(f^{j-1} \omega'), g(f^l \omega) \dots g(f^{j-1} \omega)) &\leq \\ &\leq \sum_{l=1}^{j-1} d(g(f^l \omega), g(f^l \omega')) \leq 2C_g \rho^k (1 + \rho + \dots + \rho^{\left[\frac{j-1}{2}\right] + 1}) \leq C' C_g \rho^K, \end{aligned}$$

где C' зависит только от ρ ($C' = \frac{2}{1-\rho}$). Значит, на множестве $\{f^n \omega\}_0^\infty$ функция h тоже принадлежит $F_{\rho, \Gamma}$. Теперь мы можем продолжить ее по непрерывности и получить искомую функцию $h \in F_{\rho, \Gamma}$ на всем множестве Ω_{Π} . Непрерывного сопоставления $g \rightarrow h$ можно добиться следующим образом. Очевидно, что при фиксированном g функцию h можно слева умножать на любую константу. Зафиксировав точку $\omega \in \Omega_{\Pi}$ и потребовав, чтобы $h(\omega) = e_{\Gamma}$, мы однозначно определим искомую функцию h для любой g . Теорема доказана.

Перейдем теперь к случаю нетранзитивной цепи Маркова $\Omega_{\Pi'}$. Разобьем множество состояний цепи на классы A_k попарно сообщающихся состояний. Обозначим через $W^s(\omega)$ ($W^u(\omega)$) множество таких точек $\omega_0 \in \Omega_{\Pi}$, что для некоторого l координаты точек ω и ω' с номерами, меньшими l (большими l), совпадают, через Ω_k — объединение траекторий, попадающих только в состояния класса A_k .

ТЕОРЕМА 5. Для того чтобы функция $g \in F_{\rho, \Gamma}$ была когомологична нулю, необходимо и достаточно, чтобы выполнялись условия:

- 1) g когомологична нулю на $\bigcup \Omega_i$;
- 2) соответствующие функции $h_i: \Omega_i \rightarrow \Gamma$ путем умножения слева на константы можно выбрать такими, чтобы из

$$\omega \in W^u(\omega_1) \cap W^s(\omega_2) \quad (\omega_1 \in \Omega_{i_1}, \omega_2 \in \Omega_{i_2})$$

следовало

$$g(f^{-n}x) \dots g(x) \dots g(f^n x) h_{i_1}^{-1}(f^n x_2) (f^{-n} x_1) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e_{\Gamma},$$

причем сопоставление $g \rightarrow h$ можно снова выбрать непрерывным в естественной метрике F_{ρ} .

Доказательство. Мы снова будем считать, что Γ обладает двусторонне инвариантной метрикой d , ибо снова редукция задачи к этому случаю проводится чисто формально почти аналогично теореме 3. Прежде всего для всякой точки $\omega \in \Omega_{\Pi}$ найдутся точки ω_1 и ω_2 из условия 2) теоремы 5. Для точки ω рассмотрим последовательность

$$h^{(n)}(\omega) = h_{i_1}(f^{-n} \omega_1) g(f^{-n} \omega) g(f^{-n+1} \omega) \dots g(f^{-1} \omega).$$

Из определения h_{i_1} мы получим, что

$$h^{(n+1)}(\omega) = h_{i_1}(f^{-n} \omega_1) g(f^{-n-1} \omega_1)^{-1} g(f^{-n-1} \omega) h_{i_1}^{-1}(f^{-n} \omega_1) h^{(n)}(\omega)$$

и

$$d(h^{(n+1)}(\omega), h^{(n)}(\omega)) = d(g(f^{-n-1} \omega_1), g(f^{-n-1} \omega))$$

вследствие двусторонней инвариантности метрики d . Но поскольку g принадлежит F_ρ и поскольку $\omega \in W^u(\omega_1)$, мы видим, что, начиная с некоторого N , последовательность $d(h^{n+1}(\omega), h^{(n)}(\omega))$ экспоненциально стремится к нулю, поэтому $h^{(n)}(\omega)$, как последовательность Коши, будет иметь предел $h(\omega)$. Можно было бы определить $h(\omega)$ как $\lim_{h \rightarrow \infty} h_*^{(n)}(\omega)$, где

$h_*^{(n)}(\omega) = h_{i_2}(f^n \omega_2)(g(\omega) \dots g(f^{n-1}\omega)^{-1})$ (здесь h_{i_2} и ω_2 из условия 2) теоремы 5). Аналогично предыдущему этот предел существует и из того же условия 2) (согласованности) следует, что он равен значению h , полученному с помощью точки ω_1 . Выбор точек ω_1 и ω_2 в условии 2) теоремы 5, вообще говоря, неоднозначен, что же касается выбора Ω_{i_1} и Ω_{i_2} , то он однозначен. Нам нужно доказать последнее и то, что $h(\omega)$, построенное выше, не зависит от выбора ω_1 и ω_2 .

ЛЕММА. Любая точка $\omega = \{\dots i_{-n} \dots i_0 \dots i_n \dots\}$, не принадлежащая $\bigcup \Omega_k$, имеет вид $\{\dots i_{-n} \dots i_0 \dots i_n \dots\} = \{B_1 \dots B_n\}$, где B_1 — бесконечная слева, B_2 — бесконечная справа, остальные — конечные последовательности символов, причем символы из B_s принадлежат множеству A_k .

Доказательство. Напомним, что A_k — это множества попарно сообщающихся состояний, поэтому между двумя элементами из одного A_k в представлении точки ω не может стоять элемент из другого A_k , откуда и следует утверждение леммы. Теперь видно, что для точки ω , в обозначениях леммы, $\Omega_{i_1} = \Omega_{k_n}$, а $\Omega_{i_2} = \Omega_{k_1}$ и, конечно, Ω_{i_1} и Ω_{i_2} определяется однозначно.

Докажем теперь независимость $h(\omega)$, например, от выбора точки ω_1 . Для этого зафиксируем точку $\omega_2 \in \Omega_{i_2} \cap W^s(\omega)$. Из условия 2) теоремы 5, как мы знаем, следует, что независимо от точки ω_1 значение $h(\omega)$, полученное с помощью ω_1 , равно значению $h(\omega)$, полученному с помощью ω_2 , т. е. не зависит от ω_1 .

Необходимо проверить теперь принадлежность построенной нами функции h группе $F_{\rho, \Gamma}$. Пусть для точек ω' и ω'' верно $K(\omega', \omega'') = K$. Тогда ω' имеет вид $\{XAY\}$, а ω'' имеет вид $\{ZAT\}$, где A — слово длины $2K+1$, $A = \{i_{-k} \dots i_0 \dots i_k\}$. Согласно определению марковской цепи, существует точка $\omega''' = \{XAT\}$. Значит, для точек ω'' и ω''' существует общая точка ω_1 . С ее помощью мы и будем получать $h(\omega'')$ и $h(\omega''')$. Из определения $F_{\rho, \Gamma}$ и представления точек ω'' и ω''' следует, что $d(g(f^{-s}\omega''), g(f^{-s}\omega''')) \leq C\rho^{k+s}$. Поэтому из двусторонней инвариантности метрики d следует, что

$$d(h^{(n)}(\omega''), h^{(n)}(\omega''')) \leq C \sum_{i=1}^n \rho^{k+i}$$

и

$$d(h(\omega''), h(\omega''')) \leq C \frac{\rho}{1-\rho} \rho^k.$$

Аналогичная оценка верна и для $d(h(\omega'), h(\omega'''))$, но оба значения h получаются уже с помощью общей ω_2 . Отсюда и следует с помощью

неравенства треугольника, что $h \in F_{\rho, \Gamma}$. Соответствие $g \rightarrow h$ можно теперь установить аналогично теореме 4. Гладкими аналогами нетранзитивных топологических цепей Маркова являются диффеоморфизмы Смейла, а для непрерывного времени — потоки Смейла. Пусть M — многообразие и f — диффеоморфизм M (φ_t — поток на M). Мы будем считать, что $f(\varphi_t)$ удовлетворяет аксиоме $A(A')$ Смейла [см. (6), обозначения — там же]. Напомним аксиому A и теорему Смейла для диффеоморфизмов.

Аксиома A . а) *Неблуждающее множество Ω гиперболично.*

б) *Множество периодических точек плотно в Ω .*

Мы введем еще аксиому L , не вдаваясь в вопрос о связи ее с аксиомой A и другими аксиомами Смейла. Пусть ρ — риманова метрика в M .

Аксиома $L(L')$. *Существуют константы $\gamma > 0$, C_1, C_2, λ , $0 < \lambda < 1$, такие, что если $\rho(x_1, x_2) < \gamma$, то существует точка x_3 : $\rho(x_3, x_i) < C_1 \rho(x_1, x_2)$, $i = 1, 2$, такая, что*

$$\rho(f^n x_1, f^n x_3) < C_2 \lambda^n \rho(x_1, x_3), \quad \rho(f^{-n} x_2, f^{-n} x_3) < C_2 \lambda^n \rho(x_2, x_3)$$

при $n > 0$,

$$(\rho(\varphi^{t+t_0} x_1, \varphi^t x_3) < C_2 \lambda^t \rho(x_1, x_3), \quad \rho(\varphi^{-t} x_2, \varphi^{-t} x_3) < C_2 \lambda^t \rho(x_2, x_3))$$

при $t > 0, |t_0| < C_1 \rho(x_1, x_2)$.

Эта аксиома введена нами для того, чтобы при изучении вопроса о гомотопиях динамической системы f или, аналогично, φ_t можно было провести параллель с рассуждениями о топологических марковских цепях. После того, как будет сформулирована теорема 6 для систем Смейла, читатель с легкостью увидит, что единственное место в доказательстве теоремы 5, которое трудно перевести на язык диффеоморфизмов или, аналогично, потоков на многообразии — это доказательство принадлежности функции h к F_ρ (аналог гёльдеровости), а именно, построение по точкам $\omega' = \{XAY\}$ и $\omega'' = \{ZAT\}$ точки $\omega''' = \{XAT\}$. Но наша точка x_3 и есть аналог точки ω''' . Предположим, что $f(\varphi_t)$ удовлетворяет аксиомам $A(A')$ и $L(L')$. Тогда имеет место следующее утверждение.

ТЕОРЕМА 6. *Для того чтобы гёльдеровская функция $g: M \rightarrow \Gamma$ ($g: M \rightarrow \mathbb{G}$) была когомологична нулю, необходимо и достаточно, чтобы выполнялись следующие условия:*

1) *g когомологична нулю на $\Omega = \bigcup_i \Omega_i$.*

2) *Соответствующие функции $h_i: \Omega_i \rightarrow \Gamma$ путем умножения слева на константы можно выбрать такими, чтобы из*

$$x \in W^u(x_1) \cap W^s(x_2) \quad (x_1 \in \Omega_{i_1}, x_2 \in \Omega_{i_2})$$

следовало

$$g(f^{-n} x) \dots g(x) \dots g(f^n x) h_{i_2}^{-1}(f^n x_2) h_{i_1}(f^{-n} x_1) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e_\Gamma,$$

$$(H(g, -t, t) h_{i_1}(\varphi_{-t} x_1) h_{i_2}^{-1}(\varphi_t x_2)) \xrightarrow{t \rightarrow +\infty} e_\Gamma,$$

где $g(t) = g(\varphi_t x)$, причем существует конечная функция $C(M, f, \delta) \cdot (C(M, \varphi_t, \delta))$ такая, что если модуль непрерывности $g: \omega_g(\rho) \leq K\rho^\delta$, то модуль непрерывности $h: \omega_h(\rho) \leq K\rho^\delta C(M, f, \delta)$ ($\omega_h(\rho) < K\rho^\delta C(M, \varphi_t, \delta)$).

Если $g \in C^1(M)$, то и $h \in C^1(M)$. Если g — не гёльдеровская, но $\int_0^1 \frac{\omega(\delta)}{\delta} < \infty$, то теорема верна и $h \in C(M)$.

Доказательство вполне аналогично доказательству теоремы 5.

Для удобства в усмотрении этой аналогии в теоремах 5 и 6 за понятиями, соответствующими друг другу, закреплены одинаковые обозначения. Единственность Ω_{i_1} и Ω_{i_2} для данной точки еще более очевидна, чем в теореме 5.

З а м е ч а н и е. Теоремы 4, 5 и 6 верны и в предположении, что Γ — хорошая группа (для потоков — хорошая группа Ли). Надо только потребовать, чтобы значения функции g лежали в некоторой окрестности единицы группы Γ (нуля ее алгебры Ли \mathfrak{G}). Метод доказательства сходен с методом доказательства теоремы 2.

§ 5. Приложения

Рассмотрим вопрос об интегральном инварианте (инвариантной мере с плотностью > 0 почти всюду из L^1 по гладкой мере).

ТЕОРЕМА 7. Если $f(\varphi)$ — топологически транзитивный U -каскад класса C^2 (U -поток класса C^2), то для того чтобы $f(\varphi_t)$ имела интегральный инвариант, достаточно, чтобы для любой периодической точки $x_0: f^n x_0 = x_0$ ($\varphi_T x_0 = x_0$) было

$$g(x_0) \dots g(f^{n-1} x_0) = 1 \quad (g_T(x_0) = 1),$$

где g — якобиан f (g_t — якобиан φ_t) по некоторой гладкой мере.

Действительно, в этом случае g когомологична нулю в мультипликативной группе положительных вещественных чисел ($g_* = \frac{d \ln g}{dt} \Big|_{t=0}$ в ее алгебре Ли), поэтому очевидно, что соответствующую функцию h можно взять в качестве плотности искомой инвариантной меры по исходной мере, причем эта плотность окажется гладкой.

З а м е ч а н и е. Оказывается, что условие теоремы 7 не только достаточно, но и необходимо для существования интегрального инварианта. Это следует из результатов Я. Г. Синая о предельных распределениях Гиббса для U -систем и леммы усиления теоремы 0. Мы приведем эту лемму.

ЛЕММА. Пусть группа G есть \mathbb{Z} (или \mathbb{R}) и ее действие на римановом многообразии определяет топологически транзитивный U -каскад (U -поток), а U — произвольное открытое подмножество M . Для любой конечномерной группы Ли Γ гёльдеровская функция $\bar{f}: M \rightarrow \Gamma$ определяет когомологичный нулю коцикл $\bar{f}(x, g)$ тогда и только тогда, когда $xg = x$ при $x \in U$ влечет $\bar{f}(x, g) = e_\Gamma$, $xg = x$ при $x \in U$ влечет $\bar{f}(x, g) = e_\Gamma$.

Доказательство леммы требует малосущественных дополнений по сравнению с теоремой 3. Эти дополнения относятся, главным образом, к лемме о периодических траекториях (начало доказательства теоремы 2). Рассмотрим их.

Пусть ρ — метрика на нашем многообразии. Тогда существуют такие $\gamma > 0$ и $C > 0$, что для любых двух точек A и B многообразия с $\rho(A, B) < \gamma$ можно указать точку S , которая лежит в одном сжимающемся слое с A ⁽²⁾ и в одном расширяющемся слое с B ⁽²⁾, причем расстояния от S до A и от S до B в слоях меньше $C\rho(A, B)$. Мы обозначим S через $[A, B]$. В случае потока T^t существуют такие $\gamma > 0$ и $C > 0$, что при $\rho(A, B) > \gamma$ существуют t_1 , $|t_1| < C\rho(A, B)$, и точка S , лежащая в одном сжимающемся слое ⁽²⁾ с $T^{t_1}A$ и в одном расширяющемся слое с B , причем расстояния от S до $T^{t_1}A$ и от S до B меньше $C\rho(A, B)$. Обозначим S через $[A, B]$. И в случае потока и в случае каскада точка $[A, B]$ определена при $\rho(A, B) < \gamma$. Сформулируем нашу новую лемму для каскада $\{T^n\}$ (здесь она будет подлеммой).

Подлемма для каскада. *Существует $K > 0$ такое, что для всяких ε, δ можно найти такое $N_{\varepsilon, \delta}$, что если $n > N_{\varepsilon, \delta}$, то из $\rho(T^n x, x) < \varepsilon$ следует, что существует x_0 такая, что $T^n x_0 = x_0$ (или x'_0 такая, что $T^n x'_0 = x'_0$), $\rho(T^l x_0, T^l x) < K\varepsilon$ при $1 \leq l \leq n$ ($\rho(T^l x'_0, T^l x) < K\varepsilon$) и $\rho(x_0, [x, T^n x]) < \delta$ ($\rho(x'_0, [T^n x, x]) < \delta$).*

Подлемма для потока. *Существует K такое, что для всяких ε, δ можно найти такое $N_{\varepsilon, \delta}$, что если $t > N_{\varepsilon, \delta}$, то из $\rho(T^t x, x) < \varepsilon$ следует, что существуют x_0 и t_0 , $|t_0 - t| < K\varepsilon$, такие, что $T^{t_0} x_0 = x_0$ (x'_0 с теми же свойствами), $\rho(T^s x, T^s x_0) < K\varepsilon$ при $0 \leq s \leq \min(t_0, t)$ и $\rho(x_0, [x, T^t x]) < \delta$ ($\rho(x'_0, [T^t x, x]) < \delta$).*

Доказательство подлеммы для каскада. Пусть G^h и G^l — инвариантные, соответственно, сжимающиеся и расширяющиеся слоения. Мы воспользуемся следующим утверждением, вытекающим из непрерывной зависимости слоев от начальных точек: существует такое $a > 0$, что если Π_0 и Π_1 — гладкие площадки, лежащие в слоях G^h , такие, что любую точку $\omega_0 \in \Pi_0$ можно соединить путем, лежащим в слое G^l , длины $< a$ с точкой $\omega_1 \in \Pi_1$, то отображение $Q: \Pi_0 \rightarrow \Pi_1$, $Q(\omega_0) = \omega_1$, непрерывно и при малой непрерывной деформации этих площадок меняется непрерывно [⁽⁷⁾, стр. 26]. Поэтому из компактности многообразия следует, что все Q , построенные таким образом, имеют модули непрерывности, не превосходящие одного $\delta(\varepsilon)$ ($\delta(\varepsilon) \rightarrow 0$ при $\varepsilon \rightarrow 0$), где в слоях берется индуцированная метрика.

Пусть теперь $\rho(x, T^n x) < \varepsilon$. Около точки x в сжимающемся слое опишем шар D радиуса $\varepsilon(C+1)$ (C определено перед формулировкой леммы). Если ε меньше некоторого фиксированного, а n достаточно велико, то, по свойству \mathcal{U} , диаметр образа $T^n D$ достаточно мал для того, чтобы было определено отображение Q , переводящее $T^n D$ в сжимающийся слой, проходящий через точку x . Кроме того, при данном ε можно сде-

лать n настолько большими, что $Q(T^n D)$ будет лежать в шаре радиуса ε с центром в точке $[x, T^n x]$ в сжимающемся слое, ибо $Q(T^n x) = [x, T^n x]$. Но шар радиуса ε с центром в точке $[x, T^n x]$ содержится в первоначальном шаре радиуса $(C+1)\varepsilon$ с центром в точке x . Следовательно, по теореме Брауэра в круге радиуса $(C+1)\varepsilon$ с центром в точке x имеется неподвижная точка y отображения $Q \circ T^n$. Мы видим из определения y , что y и $T^n y$ лежат в одном расширяющемся слое и находятся друг от друга на расстоянии, меньшем, чем $C'\varepsilon$ в метрике этого слоя, где C' — некоторая константа. Но на этом слое T^n — сжимающее отображение, поэтому оно имеет неподвижную точку y' , причем $\rho(y, y') < C'' \times \lambda^{-n}\varepsilon$, где $|\lambda| < 1$ — константа. Теперь, используя наличие универсального модуля непрерывности отображений, мы получим, что существует такое $N_{\varepsilon, \delta}$, что диаметр (в многообразии, а не в слое) множества $Q(T^n D)$ есть $\frac{\delta}{2}$ и $\rho(y, y') < \frac{\delta}{2}$ при $n > N_{\varepsilon, \delta}$; отсюда $\rho([x, T^n x], y') < \delta$ и, очевидно, $\rho(T^l x_0, T^l x) < K\varepsilon$ при $1 \leq l \leq n$ (для некоторого K). Теперь берем y' в качестве x_0 и аналогично ищем x'_0 . Подлемма доказана.

Подлемма для потоков доказывается аналогично.

При доказательстве леммы заметим прежде всего, что наше открытое множество U можно считать всюду плотным и относительно инвариантным, поскольку если $f(x, g) = e_T$, то, кроме точки x , это верно и для всей траектории этой точки, поэтому вместо U можно взять $\bigcup_{-\infty}^{\infty} T^n U$, а оно уже всюду плотно, так как наша \mathcal{U} -система имеет всюду плотную траекторию. Рассмотрим случай каскада. Прежде всего мы построим точку x' со всюду плотной траекторией $\{T^k x'\}_0^\infty$, такую, что если для натуральных m и n точка $[T^m x', T^n x']$ определена, то $[T^m x', T^n x'] \in U$. Пусть V_1, \dots, V_n, \dots — последовательность таких открытых множеств из M , что $\text{diam } V_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ и $\bigcup_l M_n$ плотно в M при всех $l > 0$ (она, очевидно, существует). Мы будем пользоваться следующим простым утверждением. Если m и n — натуральные числа и если D — шар с центром в точке x , в котором определено $[T^m y, T^n y]$, то, во-вторых, $f(y)$ непрерывно зависит от y и, во-вторых, $f(D)$ содержит некоторый шар D' с центром в точке $f(x)$. Утверждение это очевидным образом следует из трансверсальности слоев и непрерывной зависимости слоев от начальной точки. Теперь мы построим последовательность вложенных замкнутых шаров $D_n : D_n \subset \subset D_{n-1} \subset M$ указанным далее способом. Именно, множество пар различных натуральных чисел (m, n) можно пересчитать, т. е. указать функцию $(m(k), n(k))$ натурального аргумента k такую, что все значения ее различны и пробегают всевозможные пары различных натуральных чисел. Тогда, задавшись произвольным шаром D_0 , мы будем строить дальнейшие шары индуктивно. Предположим, что шары D_0, D_1, \dots, D_{2k} построены. Могут быть два случая:

1) для любой точки $x \in D_{2k}$ имеем $\rho(T^{m(k+1)}x, T^{n(k+1)}x) \geq \gamma$. Тогда в качестве D_{2k+1} берем любой шар, лежащий в $\text{Int } D_{2k}$;

2) для некоторой точки $x \in \text{Int } D_{2k}$ имеем $\rho(T^{m(k+1)}x, T^{n(k+1)}x) < \gamma$. Тогда функция $f(y) = [T^{m(k+1)}y, T^{n(k+1)}y]$ определена в некотором шаре D' с центром в точке x , причем $f(D')$ содержит некоторый шар. Внутренность последнего имеет непустое пересечение с нашим всюду плотным открытым множеством U . Прообраз этого пересечения при отображении f открыт, так как f непрерывно, и содержит, следовательно, некоторый шар D'' , который мы и возьмем в качестве D_{2k+1} . Пусть теперь шары $D_0, D_1, \dots, D_{2k+1}$ построены. Тогда множество $\bigcup_1^\infty T^{-l}V_k$ открыто и всюду плотно, поэтому $\text{Int } D_{2k+1} \cap \bigcup_1^\infty T^{-l}V_{k+1}$ содержит некоторый шар. Возьмем такой шар и обозначим его D_{2k+2} . Таким образом, шары D_n построены. Последовательность D_n имеет непустое пересечение. Очевидно, что если $x' \in \bigcup_0^\infty D_n$, то траектория x' всюду плотна (из определения V_{2k} и шаров D_{2k}). Из определения же шаров D_{2k+1} не менее очевидным образом следует, что x' удовлетворяет требуемому условию.

Теперь, если учесть проведенную редукцию случая групп Ли к случаю группы с двусторонне инвариантной метрикой и другие ранее проведенные рассуждения, например, в теореме 2, мы увидим, что для достижения желаемого результата достаточно для любых двух точек $T^m x'$ и $T^n x'$ с $\rho(T^m x', T^n x') < \frac{\gamma}{C}$ найти третью $T^S x'$ с $S > \max(m, n)$ такую, что

$$\rho(T^m x', T^S x') < C \times \rho(T^m x', T^n x'),$$

$$\rho(T^S x', T^n x') < C \times \rho(T^m x', T^n x'),$$

причем периодическая точка, соответствующая $T^m x'$ и $T^S x'$ (в смысле подлеммы), и периодическая точка, соответствующая $T^S x'$ и $T^n x'$, должна лежать в U . Действительно, $z = [T^m, x', T^n x'] \in U$ вместе с некоторым кругом с центром z радиуса r . Выберем S таким, чтобы $T^S x'$ было близко к z настолько, чтобы

$$\rho([T^m x', T^S x'], z) < \frac{r}{2} \quad \text{и} \quad \rho([T^S x', T^n x'], z) < \frac{r}{2}.$$

Кроме того, потребуем, чтобы

$$S^{-m} > N_{\rho(T^m x', z) + \frac{r}{2}, \frac{r}{2}} \quad \text{и} \quad S^{-n} > N_{\rho(T^n x', z) + \frac{r}{2}, \frac{r}{2}}.$$

Это можно сделать, вследствие всюду плотности траектории точки x' . Таким образом, точка $T^S x'$ удовлетворяет всем требуемым условиям, что и доказывает нашу лемму.

З а м е ч а н и е. Может возникнуть впечатление, что достаточно ограничиться еще меньшим запасом периодических траекторий, чем даже указано в последней лемме. Мы сейчас приведем, однако, пример глад-

кой функции на многообразии M , где действует транзитивный \mathcal{U} -диффеоморфизм T , которая имеет нулевые суммы по периодическим траекториям, заполняющим всюду плотное множество в M , и тем не менее не когомологичную нулю в $C(M)$.

Пусть $T': N \rightarrow N$ — топологически транзитивный \mathcal{U} -диффеоморфизм класса C^2 многообразия N . В качестве T возьмем $T' \times T': N \times N \rightarrow N \times N$ ($M = N \times N$). Разумеется, T топологически транзитивен (это следует, например, из теории марковских разбиений для \mathcal{U} -диффеоморфизмов — «квадрат» транзитивной топологической цепи Маркова транзитивен). Если теперь f_1 — гладкая функция на N , когомологичная нулю, x, y — точки N такие, что $T'^n x = x$, $T'^m y = y$ с взаимно простыми m и n , то $T^{mn}(x, y) = (x, y)$, причем mn — наименьший период точки (x, y) многообразия M и среди точек $T^j(x, y)$, $1 \leq j \leq mn$, встретятся по одному разу все пары $(T'^k x, T'^l y)$, $1 \leq k \leq n$, $1 \leq l \leq m$. Поэтому для гладкой функции f на M : $f(x, y) = f_1(x)f_1(y)$ имеем

$$\sum_1^{mn} f(T^j(x, y)) = \sum_1^m f_1(T'^l y) \sum_1^n f_1(T'^k x) = 0,$$

так как f_1 когомологична нулю, не периодические точки (x, y) с $(m, n) = 1$ всюду плотны в M . Это тривиальным образом следует из леммы, формулируемой ниже.

ЛЕММА. Если $T': N \rightarrow N$ — топологически транзитивный \mathcal{U} -диффеоморфизм, то для любого $\epsilon > 0$ существует K такое, что при любом $k > K$ точки $x \in N$ такие, что $T'^k x = x$, образуют ϵ -сеть.

Лемма известна и вытекает, например, из теории марковских разбиений.

Построенная функция f и является искомым примером; то, что она не когомологична нулю, легко увидеть, рассматривая периодические траектории, лежащие на диагонали $\{(x, y) : x = y\}$, суммы по которым все, конечно, не могут быть равны нулю, если только f_1 — не тождественный нуль. Легко, разумеется, построить пример транзитивного \mathcal{U} -потока и гладкой функции, не когомологичной нулю, но имеющей нулевые интегралы по всюду плотному множеству периодических траекторий, пользуясь предыдущим примером и известной конструкцией специального потока над построенным диффеоморфизмом по функции, тождественно равной 1. Вместо f при этом берется гладкая функция g такая, что для любой точки базы x :

$$\int_0^1 g(T^t x) dt = f(x).$$

Такая g , конечно, существует.

Перейдем теперь к расширениям и приводимости. Пусть $U(x, y)$ — множество всех непрерывных отображений многообразия X в многооб-

разие Y . Пусть группа G действует на $X(T_g: X \rightarrow X)$, а Γ — на $Y(S_g: Y \rightarrow Y)$. Пара $(X \times Y, \hat{T}_g)$ называется расширением динамической системы (X, T_g) с группой Γ , если при всех $g \in G, x \in X, y \in Y$ верно $\hat{T}_g(x, y) = (T_g x, S_{h(x, g)} y)$, где $h: X \times G \rightarrow \Gamma$ — такое отображение, что \hat{T}_g определяет действие группы G на $X \times Y$. Для этого необходимо и достаточно, чтобы

$$h(T_g x, g_2) \times h(x, g_2) = h(x, g_1 g_2).$$

Расширения $X \times Y, \hat{T}_g^1$ и $(X \times Y, \hat{T}_g^2)$ называются изоморфными, если существует гомеоморфизм $S: X \times Y \rightarrow X \times Y$, $S(x, y) = (x, S_{\varphi(x)} y)$, и $h_2(x, g) = \varphi(T_g x) \times h_1(x, g) \times \varphi^{-1}(x)$, где φ — непрерывное отображение X в Γ [см. (5)].

Рассмотрим важный частный случай. Пусть T^t — поток на многообразии X , определяемый системой дифференциальных уравнений $\dot{x} = \omega(x)$, где $\omega(x)$ — элемент касательного пространства в x .

Рассмотрим две системы дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \dot{y} = A(x)y, \\ \dot{x} = \omega(x) \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} \dot{y} = B(x)y, \\ \dot{x} = \omega(x), \end{cases}$$

где $y: X \rightarrow C^k$ и $A: X \rightarrow GL(k, C); B: X \rightarrow GL(k, C)$.

Две такие системы называются приводимыми одна к другой (5), если существует замена переменных $C: X \rightarrow GL(k, C)$, переводящая одну систему в другую, или, иначе, $A(x) = C^{-1}(x) \times B(x) C(x) - C^{-1}(x) \dot{C}(x)$. Разумеется, система дифференциальных уравнений является расширением динамической системы T^t с группой $GL(k, C)$, где $h(x, t) = Y_x(t)$ — решение соответствующей матричной системы с начальными условиями $Y(0) = E, x(0) = x$.

Приводимость двух систем друг к другу означает изоморфизм соответствующих расширений. Будем теперь считать, что G и Γ снабжены метрикой, а $h \in \text{Lip}^\alpha(X \times G)$.

ТЕОРЕМА 8. 1) Если T^t — Y -поток (T^h — Y -каскад) на многообразии X и $\Gamma \in \text{Diff}$ у хороша, то в Γ существует такая окрестность единицы U , что если $h(x, t) \in U$ при всех x и $t \in [0, 1]$, то для изоморфности расширения тривиальному необходимо и достаточно, чтобы из $T^t x = x$ следовало $h(x, t) = e_\Gamma$.

2) Если Γ — конечномерная группа Ли, то в качестве U можно взять все Γ .

3) Система линейных дифференциальных уравнений приводима к тривиальной ($A=0$) тогда и только тогда, когда она приводима к тривиальной на каждой периодической траектории.

4) Если $R \in \text{Lip}^\alpha(X \times R)$, то $\varphi \in \text{Lip}^\alpha(X)$; если $h \in C^1(X \times R)$, то $\varphi \in C^1(X)$, причем сопоставление $h \rightarrow \varphi$ можно выбрать непрерывным в метрике соответствующего пространства.

Доказательство. Поскольку условие изоморфности расширения тривиальному означает, что $h(x, t) (h(x, n))$ — коцикл, когомологичный нулю, теорема 8 является следствием теорем 2 и 3.

Аналогичным образом можно переформулировать и теоремы для потоков Смейла для применений к теории приводимости.

§ 6. Измеримые коэффициенты

Наряду с изложенным ранее существует другой подход к доказательству необходимого условия теоремы 7, а именно, применение нижеследующей теоремы автора. Доказательство этой теоремы, близкое к нижеприведенному, получил также, как стало известно автору, Д. В. Аносов.

ТЕОРЕМА 9. Пусть $f(\varphi_t)$ — транзитивный U -диффеоморфизм (U -поток) класса C^2 в M , имеющий инвариантную конечную меру μ , совместимую с гладкостью*, $g: M \rightarrow R$ — непрерывная функция и $\int_0^T \frac{\omega g(\rho)}{\rho} < \infty$. Тогда если для функции h , измеримой по μ , почти всюду по μ $g(x) = h(fx) - h(x)$ (при любом $T > 0$ почти всюду $\int_0^T g(\varphi_t x) = h(\varphi_T x) - h(x)$), то существует непрерывная функция h' , почти всюду совпадающая с h .

Доказательство. Сначала рассмотрим случай каскада. Пусть $\mu(M) = 1$. Из теории функций вещественной переменной следует, что существует функция h'' , $\mu\{x | h''(x) \neq h(x)\} = 0$, и замкнутое множество C , $\mu(C) = 1$ такие, что h'' непрерывна на C . Рассмотрим множество

$$M^C = \left\{ x | x \in M : \frac{1}{h} \sum_0^n \chi_C(f^i x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mu(C), \frac{1}{n} \sum_{-n}^0 \chi_C(f^i x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mu(C), g(f^i x) = h''(f^{i+1} x) - h''(f^i x), -\infty < i < +\infty \right\}.$$

Известно, что мера μ эргодична (7), значит, $\mu(M^C) = 1$. Для каждой точки x рассмотрим множества $A_R(x)$ и $B_R(x)$, где R — любое число, большее нуля, $A_R(x)$ — открытый круг в сжимающемся слое радиуса R в индуцированной с M метрике, $B_R(x)$ — открытый круг в расширяющемся слое радиуса R в индуцированной метрике. Пусть μ^C и μ^P — меры на сжимающемся и расширяющемся слоях, индуцированные римановым объемом, а ρ^C и ρ^P — метрики, индуцированные римановой метрикой. Построим последовательность множеств $M_i: M_0 = M^C; M_{n+1} = \{x | x \in M_n, \mu^C(A_R(x) \setminus M_n) = 0, \mu^P(B_R(x) \setminus M_n) = 0\}$ и $M_\infty = \bigcap_0^\infty M_n$. Из абсолютной непрерывности слоев [см. (7)] следует, что $\mu(M_\infty) = 1$ и для любого $x \in M_\infty$ имеем:

$$\mu^C(A_R(x) \setminus M_\infty) = 0, \quad \mu^P(B_R(x) \setminus M_\infty) = 0.$$

* Под этим подразумевается, что она эквивалентна мере, индуцированной римановым объемом.

ЛЕММА. Пусть ρ — риманова метрика в M . Тогда найдутся $K > 0$, $\tau > 0$ такие, что если $\rho(X, Y) < \tau$, $X, Y \in M_\infty$, то найдутся точки $C \in M_\infty$, $D \in M_\infty$, $E \in M_\infty$ такие, что X и C лежат в одном сжимающемся слое, C и D — в одном расширяющемся, D и E — в одном сжимающемся, E и Y — в одном расширяющемся слое и

$$\rho^C(X, C) < K\rho(X, Y), \quad \rho^P(C, D) < K\rho(X, Y);$$

$$\rho^C(D, E) < K\rho(X, Y), \quad \rho^P(E, Y) < K\rho(X, Y).$$

Доказательство. Выберем τ таким, чтобы $A_R(X) \cap B_R(Y) \neq \emptyset$, если $\rho(X, Y) < \tau$. Это можно сделать вследствие трансверсальности слоений и компактности M . Можно выбрать (по непрерывности сжимающегося и расширяющегося слоений и компактности M) константу $K > 0$ такую, что для некоторой точки $H \in A_R(X) \cap B_R(Y)$ (если R с самого начала достаточно мало, то H единственна) имеем:

$$\rho^C(X, H) < K\rho(X, Y), \quad \rho^P(Y, H) < K\rho(X, Y).$$

Если теперь в достаточно малой окрестности точки H зафиксировать в $A_R(X)$ точку C из M_∞ , то выбором точки E в этой окрестности из $M_\infty \cap B_R(Y)$ мы однозначно можем определить D с помощью канонического изоморфизма расширяющихся слоев ⁽⁴⁾. Поскольку канонический изоморфизм абсолютно непрерывен ⁽⁴⁾ и по определению M_∞ мы можем добиться того, чтобы и D и E лежали в M_∞ , а также чтобы выполнялись наши неравенства. Лемма доказана.

Пусть точки U и V из M_∞ лежат в одном сжимающемся слое. Тогда

$$\begin{aligned} h''(U) - h''(V) &= h''(f^n U) - h''(f^n V) + \\ &+ g(V) + g(fV) + \dots + g(f^n V) - (g(U) + g(fU) + \dots + g(f^n U)) = \\ &= h''(f^n U) - h''(f^n V) + g(V) - g(U) + (g(fV) - g(fU)) + \dots \\ &\dots + (g(f^n V) - g(f^n U)). \end{aligned}$$

Расстояния $\rho(f^n U, f^n V)$ убывают как геометрическая прогрессия, по свойству Y , а так как функция g обладает свойством Дини $\left(\int_0^{\omega} \frac{g(\rho)}{\rho} < \infty \right)$, то

$$\sum_0^\infty (g(f^n V) - g(f^n U)) < P(\rho(U, V)) < +\infty,$$

где $P(z) \rightarrow 0$ при $z \rightarrow 0$, $z \in R$. Поэтому, если быть уверенным в том, что найдется бесконечная последовательность $n_k < \infty$ такая, что $h''(f^{n_k} U) - h''(f^{n_k} V) \rightarrow 0$ при $n_k \rightarrow \infty$, то будет очевидным, что

$$h''(U) - h''(V) < P(\rho(U, V)).$$

Но n_k существует по определению M_∞ : ведь $M_\infty \subset M^C$ и $\mu(C) > \frac{1}{2}$. По определению M^C видно также, что можно было считать, что U и V лежат в одном расширяющемся слое. Применяя теперь нашу лемму, мы видим, что h'' равномерно непрерывна на M_∞ с модулем непрерывности, меньшим чем $4K\rho(\rho)$. Но M_∞ всюду плотно в M ($\mu(M_\infty) = 1$), поэтому продолжим h'' на M и получим h' . Очевидно, всюду $g(x) = h'(fx) - h'(x)$. Случай каскадов рассмотрен.

Переходим к случаю потока φ_t . Представляются две возможности (7). Первая — в спектре потока есть дискретная компонента и он специальный над транзитивным \mathcal{Y} -диффеоморфизмом f' на многообразии M' ; вторая — диффеоморфизм $f = \varphi_1$ эргодичен. В обоих случаях найдутся замкнутое множество C , $\mu(C) > \frac{1}{2}$, и функция h'' , непрерывная на C и почти всюду равная h , такие, что если

$M^C = \left\{ x \mid x \in M: \frac{1}{n} \sum_0^n \chi_C(f^i x) \rightarrow \mu(C); \frac{1}{n} \sum_{-n}^0 \chi_C(f^i x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mu(C); \int_n^{n+1} g(\varphi_t x) dt = h''(\varphi_{n+1} x) - h''(\varphi_n x) \text{ при любом целом } n \right\}$, то $\mu(M^C) = 1$ (в случае специального потока берем C' в M' для f' , а в качестве C берем $\bigcup_{t=0}^1 \varphi_t C'$). Рассмотрим μ^m и ρ^m — естественные меры и метрики на траекториях (задаваемые временем) и для каждой точки x множество $C_R(x) = \bigcup_{-R}^R \varphi_t x$. Пусть

$$M_0 = M^C; \quad M_{n+1} = \{x \mid x \in M_n, \mu^C(A_R(x) \setminus M_n) = 0,$$

$$\mu^P(B_R(x) \setminus M_n) = 0, \mu^m(C_R(x) \setminus M_n) = 0\} \quad \text{и} \quad M_\infty = \bigcap_0^\infty M_n.$$

Изменим также формулировку леммы.

ЛЕММА. Пусть ρ — риманова метрика в M . Тогда найдутся $K > 0$, $\tau > 0$ такие, что если $X, Y \in M_\infty$, $\rho(X, Y) < \tau$, то найдутся точки $X' \in M_\infty$, $C \in M_\infty$, $D \in M_\infty$, $E \in M_\infty$ такие, что $X' = \varphi_t X: |t| < K\rho(X, Y)$, X' и C лежат в одном сжимающемся слое, C и D — в одном расширяющемся, D и E — в одном сжимающемся, E и Y — в одном расширяющемся и

$$\rho^C(X^P, C) < K\rho(X, Y), \quad \rho^P(C, D) < K\rho(X, Y),$$

$$\rho^C(D, E) < K\rho(X, Y), \quad \rho^P(E, Y) < K\rho(X, Y).$$

Доказательство леммы и дальнейшее доказательство теоремы проходят так же, как и в случае диффеоморфизма. Теорема 9 доказана.

Из теоремы 9 очевидно вытекает теорема 7: ведь если $g(g_t)$ — якобиан $f(\varphi_t)$ по отношению к риманову объему, то условие теоремы 9 выполнено для функции $\ln g\left(\frac{d}{dt} \ln g_t \Big|_{t=\rho}\right)$.

Автор благодарит Д. В. Аносова за полезные замечания.

Поступило
27.XII.1971

ЛИТЕРАТУРА

- ¹ Лившиц А. Н., Некоторые свойства гомологий \mathcal{U} -систем, Матем. заметки, т. 10, № 5 (1971), 555—564.
 - ² Аносов Д. В., О касательных полях трансверсальных слоений в \mathcal{U} -системах, Матем. заметки, т. 2, № 5 (1967), 539—540.
 - ³ Теория алгебр Ли. Топология групп Ли, М., ИИЛ, 1967.
 - ⁴ Синай Я. Г., Марковские разбиения и \mathcal{U} -диффеоморфизмы, Функциональный анализ, 2: 1 (1968), 64—89.
 - ⁵ Кatok С. Б., Линейные расширения динамических систем и условия приводимости, Матем. заметки, т. 8, № 4 (1970), 451—463.
 - ⁶ Смейл С., Дифференцируемые динамические системы, Успехи матем. наук, т. XXV, вып. 1 (151) (1970), 113—185.
 - ⁷ Аносов Д. В., Геодезические потоки на замкнутых римановых многообразиях отрицательной кривизны, Тр. Мат. ин-та им. В. А. Стеклова АН СССР, XC, 1967.
 - ⁸ Зигмунд А., Тригонометрические ряды, М., «Мир», 1965.
-