Math-Net.Ru

Общероссийский математический портал

От редакции, *Дискрет. матем.*, 2001, том 13, выпуск 2, 159

DOI: <https://doi.org/10.4213/dm288>

Использование Общероссийского математического портала Math-Net.Ru подразумевает, что вы прочитали и согласны с пользовательским соглашением
<http://www.mathnet.ru/rus/agreement>

Параметры загрузки:

IP: 34.227.88.159

26 апреля 2023 г., 12:50:24

От редакции

В статье [1] по вине редакции допущен ряд опечаток. Приводим исправления основных из них. Под знаком суммы в формуле (2) пропущен множитель b_k , в следующей за (2) выносной формуле вместо $1 - \lambda$ должно быть $\lambda - 1$. Последняя сумма в (3) должна иметь вид

$$\sum_{k=1}^p b_k(\mu + 1)\mu^{k-1}.$$

В формуле (4) вместо $P(G, \lambda)$ должно быть $P(G, j)$. В предпоследней выносной формуле статьи вместо $\binom{p+1-i}{j-i}$ должно быть $\binom{p+1-i}{s}$.

Редакция приносит автору статьи и читателям извинения.

Список литературы

1. Воблый А. В., Некоторые необходимые условия хроматичности многочлена. *Дискретная математика* (2001) **13**, №1, 73–77.