Math-Net.Ru

Общероссийский математический портал

От редакции, *Дискрет. матем.*, 2007, том 19, выпуск 3, 160

DOI: <https://doi.org/10.4213/dm973>

Использование Общероссийского математического портала Math-Net.Ru подразумевает, что вы прочитали и согласны с пользовательским соглашением
<http://www.mathnet.ru/rus/agreement>

Параметры загрузки:

IP: 54.92.164.108

26 апреля 2023 г., 13:42:02

От редакции

В статье Р. В. Богонатова «Представления над кольцом Галуа линейной рекуррентной последовательности максимального периода над полем Галуа», 2007, т. 19, №1, определение на с. 144 в 6-й и 7-й строках снизу следует читать: Для целых чисел $k \geq 0$, $q \geq 1$ обозначим через $k \bmod q$ число 0, если $k = 0$, и вычет числа k по модулю q в множестве $\{1, \dots, q\}$, если $k \geq 1$.

Наряду с $\bmod$, в статье используется обычно определяемый mod без черты. По вине редакции это отличие в определении опущено и всюду набрано mod без черты. Черта должна стоять над знаком mod в следующих местах:

- на с. 144 всюду;
- на с. 146 всюду, кроме пунктов (б) и (в) леммы 2;
- на с. 149 в предложении 4 в определении параметра l ;
- на с. 151 в формуле (10) и в формуле для E ;
- на с. 152 в формулах (11) и (13);
- на с. 153 в формуле для l ;
- на с. 155 в формуле для l .

В статье Ю. С. Харина и А. И. Петлицкого «Цепь Маркова s -го порядка с r частичными связями и статистические выводы о ее параметрах», 2007, т. 19, №2, на с. 110 в 6-й строке сверху следует читать: $P = (p_{i_1, \dots, i_s, i_{s+1}})$, $i_1, \dots, i_{s+1} \in A$, $-(s+1)$ -мерная матрица.

Редакция приносит извинения авторам и читателям за ошибки, допущенные по вине редакции.

Статья поступила .