Math-Net.Ru

Общероссийский математический портал

А. В. Романов, О слабой* сходимости операторных средних, *Изв. РАН. Сер. матем.*, 2011, том 75, выпуск 6, 79–98

DOI: <https://doi.org/10.4213/im4406>

Использование Общероссийского математического портала Math-Net.Ru подразумевает, что вы прочитали и согласны с пользовательским соглашением
<http://www.mathnet.ru/rus/agreement>

Параметры загрузки:

IP: 3.93.64.190

26 апреля 2023 г., 16:06:21

УДК 517.98

А. В. Романов

О слабой* сходимости операторных средних

Для линейного оператора U , $\|U^n\| \leq \text{const}$, в пространстве Банаха X обсуждаются условия сходимости соответствующих его сопряженному оператору U^* эргодических операторных сетей T_α в W^* -О-топологии пространства $\text{End } X^*$. Точки накопления всевозможных таких сетей образуют выпуклое компактное множество L в $\text{End } X^*$, представляющее собой ядро полугруппы операторов $G = \overline{\text{co}} \Gamma_0$, где $\Gamma_0 = \{U_n^*, n \geq 0\}$. Показано, что все эргодические сети T_α слабо* сходятся точно тогда, когда ядро L состоит из одного элемента. В случае $X = C(\Omega)$ и оператора сдвига U , порожденного непрерывным преобразованием φ метризуемого компакта Ω , прослеживаются связи эргодических свойств U со структурой полугрупп операторов L , G и $\Gamma = \bar{\Gamma}_0$, а также с динамическими характеристиками полускада (φ, Ω) . В частности, если $\text{card } L = 1$, то: а) при каждом $\omega \in \Omega$ замыкание траектории $\{\varphi^n \omega, n \geq 0\}$ содержит ровно одно минимальное множество m ; б) сужение (φ, m) строго эргодично. Условие а) влечет W^* -О-сходимость любых эргодических последовательностей операторов $T_n \in \text{End } X^*$ при дополнительном предположении о наличии в ядре обволакивающей полугруппы $E(\varphi, \Omega)$ элементов, полученных из “базисного” семейства преобразований $\{\varphi^n, n \geq 0\}$ компакта Ω с помощью некоторой трансфинитной последовательности секвенциальных предельных переходов.

Библиография: 15 наименований.

Ключевые слова: слабая* эргодическая теория, динамическая система, обволакивающая полугруппа, представление Шоке.

Введение

Пусть линейный оператор U в банаховом пространстве X удовлетворяет оценкам $\|U^n\| \leq c$ при всех целых $n \geq 0$. Вопрос о сходимости в подходящих топологиях средних Чезаро

$$U_n = \frac{1}{n}(I + U + \dots + U^{n-1}), \quad n \rightarrow \infty,$$

или иных эргодических (усредняющих) сетей $R_\alpha = R_\alpha(U)$ составляет содержание операторных эргодических теорем. При этом, как правило, рассматривается [1] сходимость R_α в сильной, слабой или равномерной топологиях пространства линейных ограниченных операторов $\text{End } X$. В наиболее естественной постановке задачи рассматривается сильная операторная топология (SO-топология), элементы SO-эргодической сети R_α выбираются из выпуклой оболочки множества операторов $\{U^n, n \geq 0\}$ и удовлетворяют требованию

$R_\alpha(I - U) \xrightarrow{\text{SO}} 0$. Согласно принципу разделения Сайна [1], [2] произвольная SO-эргодическая операторная сеть R_α сходится сильно, если и только если инвариантные векторы оператора U разделяют инвариантные векторы сопряженного оператора U^* . Различные версии этого принципа используются [1], [3] и в более общих ситуациях, связанных со сходимостью операторных средних.

В настоящей работе будут рассматриваться условия сходимости для всех $x \in X$ обобщенных средних $R_\alpha x \rightarrow z$, $z \in X^{**}$, в w^* -топологии второго сопряженного пространства X^{**} , или, что эквивалентно, условия слабой* сходимости (W^* О-сходимости) действующих в первом сопряженном пространстве X^* операторов $T_\alpha = R_\alpha^*$. В частности, вместо w^* -сходимости для $x \in X$ средних $U_n x \rightarrow z$, $z \in X^{**}$, можно говорить о W^* О-сходимости в пространстве $\text{End } X^*$ операторной последовательности

$$V_n = \frac{1}{n}(I + V + \dots + V^{n-1}),$$

где $V = U^*$.

Пусть G_0 – выпуклая оболочка множества операторов $\Gamma_0 = \{V^n, n \geq 0\}$ в $\text{End } X^*$. Сеть операторов T_α в G_0 называем *эргодической*, если выполняется условие $T_\alpha(I - V) \xrightarrow{W^*O} 0$. При этом $T_\alpha = R_\alpha^*$, $R_\alpha \in \text{End } X$, и соответствующую операторную сеть R_α также называем *эргодической*. Как видим, имеет место сходимость в слабой операторной топологии $R_\alpha(I - U) \xrightarrow{WO} 0$. Обозначим через G и Γ полугруппы операторов, полученные W^* О-замыканием G_0 и Γ_0 . Ограниченные (по норме) подмножества пространства $\text{End } X^*$ относительно компактны в W^* О-топологии, поэтому множества G и Γ компактны. Наименьший двусторонний идеал (ядро) L полугруппы G оказывается непустым выпуклым компактным подмножеством в G , состоящим из всех таких операторов $Q \in G$, что $VQ = Q$. Отметим, что элементы идеала L представляют собой действующие в пространстве X^* проекторы с нормой, не превосходящей величины c .

Главная идея настоящей работы состоит в том, чтобы связать эргодические свойства линейных операторов U , V с алгебраической и геометрической структурами полугрупп L , G и Γ . Из результатов С. П. Ллойда [4] с помощью принципа разделения можно получить, что если некоторая SO-эргодическая сеть операторов $R_\alpha \in \text{End } X$ сильно сходится, то ядро L полугруппы G состоит из одного элемента. В развитие этой темы показано (теорема 1.3), что все эргодические сети операторов $T_\alpha \in G_0$ сходятся (к одному и тому же проектору $Q \in L$) в W^* О-топологии точно тогда, когда $L = \{Q\}$. Последнее условие выполняется не всегда, однако непосредственно из определения ядра L следует, что каждый элемент $Q \in L$ есть предел некоторой операторной эргодической сети, т. е. для любого $U \in \text{End } X$, $\|U^n\| \leq \text{const}$, существуют W^* О-сходящиеся эргодические сети операторов $T_\alpha \in G_0$. Тем самым демонстрируется принципиальное различие между сильной и слабой* эргодическими теориями, так как согласно принципу разделения все SO-эргодические операторные сети R_α одновременно сходятся (к одному и тому же проектору $P \in \text{End } X$) или расходятся в SO-топологии пространства $\text{End } X$. Пока нет полной ясности в вопросе о том, при каких условиях тот или иной проектор $Q \in L$ будет преде-

лом в W^* О-топологии некоторой эргодической последовательности операторов $T_n \in G_0$.

В качестве аналога принципа разделения для слабой* сходимости средних Чезаро V_n известен критерий Иваника [5]. Полезные обобщения этого критерия в случае произвольных эргодических сетей получены в теореме 1.5.

Слабая* сходимость эргодических средних представляет интерес прежде всего с точки зрения теории динамических систем. Действительно, всякое непрерывное преобразование φ метризуемого компакта Ω порождает оператор сдвига $U: x(\omega) \rightarrow x(\varphi\omega)$, $\omega \in \Omega$, в пространстве непрерывных скалярных функций $X = C(\Omega)$, и, например, слабая* сходимость средних Чезаро V_n сводится к поточечной сходимости скалярных средних, определенных равенством

$$(U_n x)(\omega) = \frac{1}{n} (x(\omega) + x(\varphi\omega) + \dots + x(\varphi^{n-1}\omega))$$

при любых $x \in X$ и $\omega \in \Omega$. В терминологии Крылова–Боголюбова [6], [7] это означает квазирегулярность всех точек Ω относительно дискретной динамической системы (полукаскада) φ^n , $n \geq 0$. Главные результаты статьи относятся именно к данному случаю, причем их формулировки и доказательства существенно используют понятие обволакивающей полугруппы $E(\varphi, \Omega)$ полукаскада (φ, Ω) , представляющей собой [8] замыкание в топологии прямого произведения Ω^Ω семейства преобразований $\Phi_0 = \{\varphi^n, n \geq 0\}$ компакта Ω .

Пусть $\Lambda(\Omega)$ – совокупность вероятностных борелевских φ -эргодических мер на Ω . Для меры $\mu \in \Lambda(\Omega)$ обозначим через $\Phi_1(\mu)$ класс преобразований $p: \Omega \rightarrow \Omega$, обладающих следующим свойством: найдутся неубывающая система борелевских множеств $h_k \subset \Omega$ и двойная последовательность натуральных чисел $n(k, l)$ такие, что $\mu(h_k) > 1 - k^{-1}$ и $\lim_{l \rightarrow \infty} \varphi^{n(k, l)} \omega = p\omega$ при всех $\omega \in h_k$. Продолжим процедуру перехода от Φ_0 к $\Phi_1(\mu)$ с помощью трансфинитной индукции и обозначим через $\Phi(\mu)$ объединение полученных классов $\Phi_\nu(\mu)$ по всем порядковым числам ν . Пусть Φ – пересечение классов $\Phi(\mu)$ по $\mu \in \Lambda(\Omega)$. Для $\omega \in \Omega$ обозначим через $\bar{o}(\omega)$ замыкание в топологии Ω траектории $\{\varphi^n \omega, n \geq 0\}$.

Основной результат статьи (теорема 3.2) устанавливает связь между следующими утверждениями:

А) ядро $\text{Ker } E(\varphi, \Omega)$ обволакивающей полугруппы $E(\varphi, \Omega)$ содержит хотя бы одно преобразование $p: \Omega \rightarrow \Omega$, принадлежащее классу Φ ;

А₁) носитель любой эргодической меры полукаскада (φ, Ω) есть минимальное множество;

В) для каждого $\omega \in \Omega$ в $\bar{o}(\omega)$ содержится единственное минимальное множество m , причем на m сосредоточена ровно одна вероятностная борелевская φ -инвариантная мера;

В₁) для каждого $\omega \in \Omega$ в $\bar{o}(\omega)$ содержится единственное минимальное множество;

С) ядро L полугруппы G состоит из одного элемента;

Д) все эргодические последовательности операторов $T_n \in G_0$ сходятся в W^* О-топологии пространства $\text{End } X^*$;

Е) все эргодические сети операторов $T_\alpha \in G_0$ сходятся в W^* О-топологии пространства $\text{End } X^*$.

Оказывается, справедливы импликации $A) + B_1) \Rightarrow A_1), A_1) + B) \Rightarrow D), C) \Rightarrow B)$ и $C) \Leftrightarrow E)$. Эквивалентность условий $C)$ и $E)$ следует из упомянутой выше общей теоремы 1.3. Импликация $A_1) + B) \Rightarrow D)$ обобщает тот известный факт [7], что одноэргодичность компактной (дискретной) динамической системы влечет квазирегулярность всех точек ее фазового пространства. Как следует из импликации $C) \Rightarrow B)$, условие $\text{card } L = 1$ налагает жесткие ограничения на динамическую систему (φ, Ω) .

Показано также (теорема 2.4), что условие $A)$ обеспечивает равенство $Z(\Omega) = (M(\Omega))^c$, где $M(\Omega)$ – объединение всех минимальных множеств и $Z(\Omega)$ – минимальный центр притяжения полукаскада (φ, Ω) , а $(\cdot)^c$ – операция замыкания в Ω . Напомним, что в общем случае (см. [6, гл. 5]) включение $(M(\Omega))^c \subset Z(\Omega)$ может быть собственным.

Один из наиболее простых возможных типов поведения динамической системы (φ, Ω) связан с совпадением для нее множества $M(\Omega)$ и совокупности неподвижных точек $N(\Omega) = \{\omega \in \Omega: \varphi\omega = \omega\}$. Чисто алгебраические рассуждения позволяют установить (теорема 3.5) равносильность условий $L \cap \Gamma \neq \emptyset$ и $L \cap \Gamma = \text{Ker } \Gamma$, где $\text{Ker } \Gamma$ – ядро полугруппы Γ . При этом каждое из данных условий обеспечивает равенство $M(\Omega) = N(\Omega)$.

Одним из инструментов исследования в настоящей работе служит интегральное представление Шоке операторов $T \in G$ через операторы $P \in \Gamma$. В этой связи для случая оператора сдвига $U: C(\Omega) \rightarrow C(\Omega)$ описано строение множества крайних точек $\text{ex } G$ выпуклого компактного множества $G \subset \text{End } X^*$. Показано, что всегда $\text{ex } G = \text{ex } \Gamma$. Из определения полугрупп операторов G и Γ следует вложение $\text{ex } G \subset \Gamma$. В то же время согласно предложению 4.4 равенство $\text{ex } G = \Gamma$ оказывается равносильным инъективности эпиморфизма полугрупп $\theta: \Gamma \rightarrow E(\varphi, \Omega)$, действие которого определяется соотношением $P\delta(\omega) = \delta(p\omega)$ для $p = \theta P$ и $\omega \in \Omega$.

§ 1. Линейный оператор в произвольном пространстве

Рассмотрим в этом параграфе эргодические свойства произвольного линейного оператора U в банаховом пространстве X , предполагая лишь выполнение равномерных по $n \geq 0$ оценок $\|U^n\| \leq c$. Обозначим через $\text{Im}(\cdot)$ и $F(\cdot)$ соответственно образ и подпространство неподвижных векторов линейных операторов, а через $\text{End } X$ и $\text{End } X^*$ – алгебры ограниченных операторов, действующих соответственно в X и первом сопряженном X^* . Пусть $V = U^*$ – сопряженный оператор в X^* ; тогда $\|V^n\| \leq c$ для $n \geq 0$. Оснастим алгебру операторов $\text{End } X^*$ локально выпуклой слабой* операторной топологией (W^* О-топологией) и выделим в ней мультипликативные полугруппы $\Gamma_0 = \{V^n, n \geq 0\}$, $G_0 = \text{co } \Gamma_0$.

Положим $G = \overline{\text{co}} \Gamma_0$ и $\Gamma = \overline{\Gamma_0}$, где чертой сверху определена операция W^* О-замыкания множеств нормированного пространства $\text{End } X^*$. Тогда $\Gamma \subset G$ и $\|T\| \leq c$ для $T \in G$. Ограниченные по норме подмножества $\text{End } X^*$ относительно компактны в W^* О-топологии, поэтому множества G и Γ представляют собой хаусдорфовы (вообще говоря, неметризуемые) сепарабельные компакты. Умножение TT_1 в $\text{End } X^*$ непрерывно по T при любом T_1 , однако непрерывно по T_1 лишь в случае $T = R^*$, $R \in \text{End } X$. Вследствие этого полугруппа G и ее

подполугруппа Γ некоммутативны, хотя их элементы и коммутируют с оператором V .

Заметим, что $\text{Im } T \supset F(T) \supset F(V)$ для всех $T \in G$. Следуя [4], рассмотрим непустую совокупность

$$L = \{Q \in G: VQ = Q\}$$

неподвижных точек непрерывного отображения $T \rightarrow VT$ выпуклого компактного множества G в себя. Оператор V непрерывен в w^* -топологии пространства X^* , поэтому множество L замкнуто. Если $Q \in L$, то $V^n Q = Q$ при $n \geq 1$, следовательно, $TQ = Q$ для всех $T \in G$, в частности $Q^2 = Q$. Выпуклое компактное множество L состоит из проекторов $Q \in \text{End } X^*$, $\|Q\| \leq c$. Можно дать альтернативное определение: $L = \{T \in G: \text{Im } T = T(V)\}$. Отсюда видим, что $L = \{0\}$, если $F(V) = \{0\}$. Отметим, кроме того, что $L \cap G_0 = \emptyset$, если предполагать линейную независимость системы операторов $\{U^n, n \geq 0\}$ в пространстве $\text{End } X$.

Для описания алгебраической структуры L , а также для доказательства некоторых утверждений в § 3 потребуются элементарные сведения из общей теории полугрупп (см., например, [9], [10]). Именно, если полугруппа S обладает минимальным левым идеалом, то она обладает и ядром $\text{Ker } S$, представляющим собой непустое пересечение всех двусторонних идеалов. При этом $\text{Ker } S$ совпадает с объединением всех минимальных левых идеалов и каждый левый идеал содержит минимальный. Если левый идеал $I \subset S$ минимален и $u \in S$, то левый идеал Iu также будет минимальным, причем все минимальные левые идеалы полугруппы S получаются таким образом. С понятными поправками все изложенное верно и для правых идеалов.

ЛЕММА 1.1. *Множество L является ядром полугруппы G , состоящим из одноэлементных левых идеалов. Кроме того, L – единственный минимальный правый идеал в G .*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Ясно, что L – правый идеал в G . Если $Q \in L$, то $TQ = Q$ для всех $T \in G$. Таким образом, $\{Q\}$ – одноэлементный минимальный левый идеал в G , поэтому L – двусторонний идеал. Полугруппа G обладает ядром $\text{Ker } G$, представляющим собой объединение всех минимальных левых идеалов, это ядро содержит идеал L , а значит, совпадает с ним. Далее, $QQ_1 = Q_1$ для любых проекторов $Q, Q_1 \in L$, стало быть, правый идеал L является главным, порожденным любым своим элементом. Тем самым, L – минимальный правый идеал. Поскольку $\text{Ker } G$ – объединение всех минимальных правых идеалов, то L – единственный идеал такого рода в полугруппе G и лемма доказана.

Отметим, что каждый односторонний идеал полугруппы G включает в себя минимальный, следовательно, каждый правый идеал содержит ядро L , а каждый левый идеал имеет с L непустое пересечение.

Для произвольной операторной сети T_α в G обозначаем через $\text{cl}(T_\alpha)$ непустое в силу компактности G множество ее обобщенных предельных точек (точек накопления). Называем такую сеть *эргодической*, если все $T_\alpha \in G_0$ и

$$T_\alpha(I - V) \xrightarrow{w^*o} 0. \quad (1.1)$$

Поскольку $T_\alpha \in G_0$, то $T_\alpha \in R_\alpha^*$, где $R_\alpha \in \text{End } X$. При этом операторную сеть R_α также называем эргодической. Последовательность средних Чезаро V_n является эргодической, поскольку $V_n(I - V) = n^{-1}(I - V^n)$ и $\|V_n(I - V)\| \leq (1 + c)n^{-1}$. Если эргодическая сеть T_α сходится в W^* -О-топологии к оператору Q , то $Q \in L$, причем из w^* -сходимости $T_\alpha y \rightarrow y_0$ для $y \in X^*$ следует, что $Vy_0 = y_0$.

Покажем, что условие $\text{card } L = 1$ равносильно одновременной сходимости всех эргодических сетей операторов $T_\alpha \in G_0$ в W^* -О-топологии пространства $\text{End } X^*$.

ЛЕММА 1.2. *Для произвольной сети операторов $T_\alpha \in G$ вложение $\text{cl}(T_\alpha) \subset L$ равносильно соотношению (1.1).*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Если $\text{cl}(T_\alpha) \subset L$, но не выполнено равенство (1.1), то для некоторой окрестности D нуля в $\text{End } X^*$ и каждого индекса α найдется индекс $\beta = \beta(\alpha)$, $\beta \geq \alpha$, такой, что $T_\beta(I - V) \notin D$. Пусть $Q \in \text{cl}(T_\beta)$; тогда $Q \in \text{cl}(T_\alpha) \subset L$ и $Q(I - V) \notin D$. Тем самым, $Q(I - V) \neq 0$, а это противоречит соотношению $Q \in L$.

Обратно, $TV = VT$ для операторов $T \in G$, и функция $T \rightarrow T(I - V)$ непрерывно отображает компактное множество G в $\text{End } X^*$, поэтому $\text{cl}(T_\alpha(I - V)) \supset (I - V)\text{cl}(T_\alpha)$. Если справедливо условие (1.1), то $\text{cl}(T_\alpha(I - V)) = \{0\}$, а значит, $(I - V)\text{cl}(T_\alpha) = \{0\}$, $\text{cl}(T_\alpha) \subset L$ и лемма доказана.

ТЕОРЕМА 1.3. *Все эргодические сети операторов $T_\alpha \in G_0$ сходятся в W^* -О-топологии точно тогда, когда ядро L полугруппы G состоит из единственного элемента Q . При этом $\lim_\alpha T_\alpha = Q$.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Если ядро L одноэлементно, то по лемме 1.2 произвольная эргодическая сеть операторов $T_\alpha \in G_0$ имеет единственную точку накопления $Q \in G$, следовательно, $T_\alpha \rightarrow Q$.

Предположим теперь, что ядро L содержит два различных элемента Q и Q' . Поскольку $L \subset \overline{G_0}$, то $T_\alpha \rightarrow Q$ и $T'_\alpha \rightarrow Q'$, где T_α, T'_α – эргодические сети в G_0 , определяемые системой W^* -О-окрестностей нуля пространства $\text{End } X^*$. Более подробно, пусть $\alpha = (B, B^*, k)$, где k – натуральные числа, а B и B^* – произвольные конечные множества соответственно в X и X^* . На множестве индексов α введем отношение частичного порядка, а именно $\alpha_1 \geq \alpha$, если $B_1 \supset B$, $B_1^* \supset B^*$ и $k_1 \geq k$. При каждом значении α выберем операторы T_α и T'_α в G_0 таким образом, чтобы выполнялись соотношения

$$|(x, (T_\alpha - Q)y)| < k^{-1}, \quad |(x, (T'_\alpha - Q')y)| < k^{-1}$$

для элементов $x \in B$ и $y \in B^*$. Положим $T''_\alpha = T_\alpha$ или $T''_\alpha = T'_\alpha$ в зависимости от четности или нечетности числа k . Как видим, операторная сеть T''_α является эргодической, но не имеет предела в W^* -О-топологии. Теорема доказана.

Обсудим теперь необходимые и достаточные условия сходимости эргодической сети $T_\alpha = R_\alpha^*$ в W^* -О-топологии пространства операторов $\text{End } X^*$, обобщающие известный критерий Иваника [5] для средних Чезаро. Пусть $\text{End}(X, X^{**})$ – банахово пространство ограниченных линейных операторов, действующих из X в X^{**} . Обозначим w^* -топологии в X^* и X^{**} через τ и σ

соответственно. Из тождества $(R_\alpha x, y) = (x, T_\alpha y)$ при $x \in X$ и $y \in X^*$ следует, что слабая* сходимост $T_\alpha \rightarrow T$ в $\text{End } X^*$ эквивалентна σ -сходимости $R_\alpha x \rightarrow Rx$ на X , где $R \in \text{End}(X, X^{**})$. Полезно заметить, что соотношения $(Rx, y) = (x, Ty)$, $R = T^*|_X$ и $T = R^*|_{X^*}$ определяют естественную линейную изометрию пространств $\text{End}(X, X^{**})$ и $\text{End } X^*$.

Пусть $(\cdot)^\sigma$ операция замыкания множеств в σ -топологии. Положим

$$Y = \{y \in X^* : T_\alpha y \xrightarrow{\tau} 0\}, \quad X_0 = \{x \in X : R_\alpha x \xrightarrow{\sigma} z, z \in X^{**}\}.$$

Тогда $z = R_0 x$, где $R_0 \in \text{End}(X_0, X^{**})$. Положим, кроме того, $X_1 = \text{Im } R_0$ и отметим, что $Y \cap F(V) = \{0\}$. Поскольку $R_\alpha x = x$ и $R_0 x = x$ при $x \in F(U)$, то $F(U) \subset X_1$. Для множества $(\cdot)$ в X^{**} или X^* обозначаем через $(\cdot)^\perp$ его аннулятор (ортогональное дополнение) соответственно в X^* или X^{**} . Как следует из условия эргодичности (1.1), $T_\alpha y \xrightarrow{\tau} 0$ на $\text{Im}(I - V) \subset X^*$, а поскольку $(R_\alpha x, y) = (x, T_\alpha y)$ для всех $x \in X$, $y \in X^*$, то и $R_\alpha x \xrightarrow{\sigma} 0$ на $\text{Im}(I - U) \subset X$. Таким образом, $X_0 \supset \text{Im}(I - U)$, а значит, $X_0^\perp \subset \text{Im}(I - U)^\perp = F(V)$.

ЛЕММА 1.4. *Для каждой эргодической сети операторов $T_\alpha \in G_0$ имеют место соотношения:*

- а) $X_1^\sigma \subset Y^\perp \subset F(V^*)$ и $X_1^\perp \supset Y$;
- б) $X_0^\perp = X_1^\perp \cap F(V)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Отметим вложения $Y \supset \text{Im}(I - V)$ и $Y^\perp \subset \text{Im}(I - V)^\perp = F(V^*)$, где $V^* = U^{**}$. Пусть $x \in X_0$, $y \in X^*$ и $z = R_0 x$; тогда $z \in X_1$ и

$$(z, y) = \lim_\alpha (R_\alpha x, y) = \lim_\alpha (x, T_\alpha y). \quad (1.2)$$

Как видим, $(z, y) = 0$ для всех $y \in Y$, поэтому $X_1 \subset Y^\perp$ и $X_1^\sigma \subset Y^\perp$. Из соотношений $(X_1^\sigma)^\perp = X_1^\perp$, $Y^{\perp\perp} = Y$ выводим вложение $X_1^\perp \supset Y$. Следовательно, п. а) леммы установлен. Далее, для функционалов $y \in F(V)$ справедливы равенства $T_\alpha y = y$. Отсюда находим, что $(R_\alpha x, y) = (R_0 x, y) = (x, y)$ при всех $x \in X_0$. Это означает, что для таких y условия $y \in X_0^\perp$ и $y \in X_1^\perp$ равносильны. Однако $X_0^\perp \subset F(V)$, стало быть, $X_0^\perp = X_1^\perp \cap F(V)$. Лемма доказана.

Отметим, что требование W^* -сходимости эргодической сети T_α эквивалентно любому из двух соотношений: $X_0 = X$ или $X^* = F(V) \oplus Y$. Скажем, что X_1 разделяет $F(V)$, если для любых различных векторов $y_1, y_2 \in F(V)$ найдется такой вектор $x \in X_1$, что $(x, y_1) \neq (x, y_2)$.

ТЕОРЕМА 1.5. *Для каждой эргодической сети операторов $T_\alpha \in G_0$ следующие три условия попарно равносильны:*

- а) X_1 разделяет $F(V)$;
- б) $X_0 = X$;
- в) $X_1^\perp = Y$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Подпространство X_1 разделяет $F(V)$ точно тогда, когда $X_1^\perp \cap F(V) = \{0\}$. Из условия а) по лемме 1.4, б) имеем $X_0^\perp = \{0\}$, т. е. $X_0 = X$. Пусть теперь $X_0 = X$. Если $x \in X_0$, $z = R_0 x$ и $y \in X_1^\perp$, то $(z, y) = 0$, а из соотношений (1.2) выводим, что $T_\alpha y \xrightarrow{\tau} \bar{y}$ и вектор $\bar{y}$ ортогонален X . Таким

образом, $\bar{y} = 0$ при всех $y \in X_1^\perp$, или, другими словами, $X_1^\perp \subset Y$. Обратное вложение всегда верно по лемме 1.4, а), и импликация б) $\Rightarrow$ в) установлена. Наконец, импликацию в) $\Rightarrow$ а) получаем из того факта, что $Y \cap F(V) = \{0\}$, и доказательство теоремы завершено.

Для случая средних Чезаро V_n эквивалентность условий а) и б) теоремы 1.5 установлена в [5]. Отметим, что условие в) теоремы 1.5 равносильно соотношению $X_1^\sigma = Y^\perp$.

ЗАМЕЧАНИЕ 1.6. Подпространства X_0 , Y и линейал X_1 зависят от выбора операторной эргодической сети T_α . Если все такие сети сходятся, то согласно теореме 1.3 ядро L состоит из одного элемента Q и подпространство Y , совпадающее с ядром проектора Q , не зависит от выбора сети T_α . При этом линейалы $X_1 \subset X^{**}$ могут быть разными для разных сетей T_α , хотя и имеющими одинаковые σ -замыкания, так как в этом случае $X_1^\sigma = Y^\perp$.

Непрерывное действие $P \rightarrow VP$ порождает полукаскад (V, Γ) на W^* -компакте $\Gamma \subset \text{End } X^*$. Будем придерживаться следующих обозначений: $A(\Gamma)$ – компактное (в w^* -топологии пространства $C^*(\Gamma)$) выпуклое множество вероятностных борелевских мер на Γ ; $\text{Ai}(\Gamma)$ – замкнутое выпуклое подмножество V -инвариантных мер в $A(\Gamma)$; $\Lambda(\Gamma)$ – подмножество эргодических мер в $\text{Ai}(\Gamma)$. По одному из эквивалентных определений [11, гл. 10] множество эргодических мер совпадает с совокупностью крайних точек $\text{ex Ai}(\Gamma)$.

Поскольку $G = \overline{\text{co}} \Gamma_0$ и $\Gamma = \overline{\Gamma}_0$, то $\text{ex } G \subset \Gamma$ согласно [11, гл. 1], а так как разность $G \setminus \Gamma$ является бэровским множеством, то [11, гл. 4] каждому оператору $T \subset G$ соответствует мера $\lambda \in A(\Gamma)$, реализующая представление Шоке

$$T = \int_{\Gamma} P\lambda(dP). \quad (1.3)$$

Интегрирование здесь можно понимать в том смысле, что

$$(x, Ty) = \int_{\Gamma} (x, Py)\lambda(dP)$$

при всех $x \in X$ и $y \in X^*$. Будем называть меру λ *представляющей* и иногда использовать запись $T = T_\lambda$. Формула (1.3) определяет непрерывную сюръекцию $A(\Gamma) \rightarrow G$, однако представляющая мера не обязательно единственна.

ЛЕММА 1.7. Если $\lambda \in \text{Ai}(\Gamma)$, то $T_\lambda \in L$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Из V -инвариантности меры λ следует, что

$$VT_\lambda = \int_{\Gamma} VP\lambda(dP) = \int_{\Gamma} P\lambda(dP) = T_\lambda, \quad T_\lambda \in L.$$

§ 2. Сдвиг в $C(\Omega)$: предварительные сведения

Всюду до конца статьи будут рассматриваться эргодические свойства оператора сдвига U в пространстве скалярных непрерывных функций $X = C(\Omega)$ на метризуемом компакте Ω . Таким образом, $(Ux)(\omega) = x(\varphi\omega)$ для $x \in C(\Omega)$ и

$\omega \in \Omega$, где φ – некоторое непрерывное (не обязательно обратимое) преобразование Ω . Обозначим через $A(\Omega)$ и $K(\Omega)$ множества вероятностных борелевских мер и мер Дирака на Ω . Пусть $\Lambda(\Omega)$ – класс эргодических мер полускада (φ, Ω) , т.е. таких φ -инвариантных мер $\lambda \in A(\Omega)$, что $\lambda(h)$ равно 0 или 1 для всякого борелевского множества $h \subset \Omega$ со свойством $\varphi^{-1}h = h$. Кроме того, обозначим через $M(\Omega)$ и $Z(\Omega)$ объединение всех минимальных множеств и минимальный центр притяжения полускада (φ, Ω) . Напомним, что $Z(\Omega)$ совпадает с замыканием объединения носителей всех эргодических мер. Множество $A(\Omega)$ выпукло, компактно и метризуемо в w^* -топологии сопряженного пространства X^* , а $K(\Omega)$ представляет собой его замкнутое подмножество. Как известно, $(M(\Omega))^c \subset Z(\Omega)$, где $(\cdot)^c$ – операция замыкания в Ω , и это вложение может быть собственным.

Пусть Σ_μ – сигма-алгебра множеств $h \subset \Omega$, измеримых относительно лебегова продолжения борелевской меры $\mu \in A(\Omega)$. Тогда Σ_μ включает в себя сигма-алгебру Σ_b борелевских подмножеств Ω . Отображение $p: \Omega \rightarrow \Omega$ назовем μ -измеримым, если $p^{-1}\Sigma_b \subset \Sigma_\mu$. Совокупность таких отображений будем обозначать через Π_μ и положим

$$\Pi_A = \bigcap_{\mu \in A(\Omega)} \Pi_\mu.$$

Класс Π_A состоит из всех универсально измеримых преобразований компакта Ω .

Важную роль в дальнейших рассмотрениях будет играть понятие *обволакивающей полугруппы* динамической системы. Обволакивающая полугруппа $E(\varphi, \Omega)$ полускада (φ, Ω) представляет собой [8] замыкание семейства $\Phi_0 = \{\varphi^n, n \geq 0\}$ в топологии t поточечной сходимости пространства Π всевозможных отображений $p: \Omega \rightarrow \Omega$. Эта топология отделима и совпадает с топологией прямого произведения Ω^Ω . По теореме Тихонова пространство Π компактно, а значит, компактно (но в общем случае неметризуемо) и множество $E(\varphi, \Omega)$. Полугруппа $E(\varphi, \Omega)$, вообще говоря, некоммукативна, и ее центр содержит подполугруппу Φ_0 . Любая обволакивающая полугруппа сепарабельна (как топологическое пространство) и обладает непустым ядром.

Действующий в пространстве мер $X^* = C^*(\Omega)$ сопряженный оператор $V = U^*$ сохраняет конус положительных борелевских мер на Ω , стало быть, этим же свойством обладает (как W^* -О-предел выпуклых комбинаций степеней V^n) и любой оператор $T \in G$. Если $\mu \in A(\Omega)$, то $(1, V^n \mu) = (U^n 1, \mu) = (1, \mu) = 1$ при $n \geq 0$, следовательно, $(1, T\mu) = 1$ и $T: A(\Omega) \rightarrow A(\Omega)$ для всех $T \in G$. В частности, $P: A(\Omega) \rightarrow A(\Omega)$ для $P \in \Gamma$.

Итак, оператор V порождает полускад (V, A) на компакте $A = A(\Omega)$, и операторы $P \in \Gamma$ действуют на $A(\Omega)$ как элементы обволакивающей полугруппы $E(V, A)$ этого полускада. Данная полугруппа представляет собой замыкание последовательности непрерывных преобразований $\{V^n, n \geq 0\}$ компакта $A(\Omega)$ в топологии прямого произведения A^A . Более того, для операторов из $\text{End } X^*$ топология w^* -сходимости на мерах $\mu \in A(\Omega)$ совпадает (с формально более сильной) W^* -О-топологией. Таким образом, полугруппу операторов Γ можно отождествить с обволакивающей полугруппой $E(V, A)$.

Далее, $V\delta(\omega) = \delta(\varphi\omega)$ для точек $\omega \in \Omega$, и множество мер Дирака $K = K(\Omega)$ замкнуто в $A(\Omega)$, поэтому $VK \subset K$ и $PK \subset K$ для всех операторов $P \in \Gamma$. Соответствие $V \rightarrow \varphi$ порождает непрерывный алгебраический гомоморфизм $\theta: P \rightarrow p$ полугруппы Γ в полугруппу $E(\varphi, \Omega)$, действие которого определяется из соотношения

$$P\delta(\omega) = \delta(p\omega), \quad \omega \in \Omega. \quad (2.1)$$

Поскольку множество Γ компактно, $\varphi^n = \theta(V^n)$ и семейство преобразований $\Phi_0 = \{\varphi^n, n \geq 0\}$ плотно в $E(\varphi, \Omega)$, то $\theta(\Gamma) = E(\varphi, \Omega)$ и функция θ является эпиморфизмом.

Постараемся (хотя бы частично) охарактеризовать класс отображений $p \in \Pi$, удовлетворяющих тем же условиям, что и “базисные” преобразования $\varphi^n \in \Phi_0$:

- i) $p \in \Pi_A$;
- ii) $\mu(p^{-1}h) = \mu(h)$ для $\mu \in \Lambda(\Omega)$ и $h \in \Sigma_b$.

Для меры $\mu \in A(\Omega)$ и множества $B \subset \Pi$ определим класс $\mathcal{F}_\mu(B)$ отображений $p: \Omega \rightarrow \Omega$ следующим образом: $p \in \mathcal{F}_\mu(B)$, если найдутся неубывающая (зависящая от B) счетная система множеств $h_k \in \Sigma_b$ и двойная последовательность элементов $p_{kl} \in B$ такие, что $\mu(h_k) > 1 - k^{-1}$ и $\lim_{l \rightarrow \infty} p_{kl}\omega = p\omega$ при всех $\omega \in h_k$. При этом $\mu(H) = 1$, где $H = \bigcup_{k=1}^{\infty} h_k$, и $B \subset \mathcal{F}_\mu(B)$. Обозначим классы скалярных борелевских или μ -измеримых функций на метризуемом компакте Ω через X_b или X_μ соответственно.

ЛЕММА 2.1. *Если $\mu \in A(\Omega)$, то операция $B \rightarrow \mathcal{F}_\mu(B)$ сохраняет свойство $B \subset \Pi_\mu$. Если $\mu \in \Lambda(\Omega)$ и $\mu(q^{-1}h) = \mu(h)$ для элементов $q \in B$ и $h \in \Sigma_b$, то этим же свойством обладают и элементы $p \in \mathcal{F}_\mu(B)$.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Покажем сначала, что преобразования $p \in \mathcal{F}_\mu(B)$ измеримы относительно меры μ , если это верно для всех $q \in B$. Пусть $x \in C(\Omega)$ и $g(\omega) = x(p\omega)$, а $\{h_k\}$ – соответствующая преобразованию p возрастающая система множеств. Обозначим через $\chi_k(\omega)$ и $\bar{\chi}_k(\omega)$ индикаторы множеств h_k и H . Если $p_{kl} \in B$ и $x_{kl}(\omega) = x(p_{kl}\omega)$, то $x_{kl} \in X_\mu$ и $x_{kl}(\omega) \xrightarrow{l} g(\omega)$ на h_k , т.е. $x_{kl}(\omega)\chi_k(\omega) \xrightarrow{l} g(\omega)\chi_k(\omega)$ на Ω . Таким образом, $g\chi_k \in X_\mu$, а поскольку $g(\omega)\chi_k(\omega) \xrightarrow{k} g(\omega)\bar{\chi}(\omega)$ при всех $\omega \in H$, то и $g\bar{\chi} \in X_\mu$. Однако $\mu(H) = \mu(\Omega)$, следовательно, μ -почти всюду $g(\omega)\bar{\chi}(\omega) = g(\omega)$.

Итак, $x(p\omega) \in X_\mu$ для любой непрерывной функции $x(\omega)$. Согласно теории классов Бэра [12, § 39] функции $\psi \in X_b$ получаются из непрерывных с помощью трансфинитной последовательности секвенциальных поточечных предельных переходов. Тем самым, μ -измеримыми оказываются все функции вида $\psi(p\omega)$, где $\psi \in X_b$. В частности, если $\chi(\omega)$ – индикатор произвольного борелевского множества $h \subset \Omega$, то $\chi(p\omega) \in X_\mu$ и $p^{-1}h \in \Sigma_\mu$. Отсюда следует включение $p \in \Pi_\mu$.

Далее, пусть $\mu \in \Lambda(\Omega)$, $h \in \Sigma_b$ и $p \in \mathcal{F}_\mu(B)$. Пусть также $f(\omega) = \chi(p\omega)$, где $\chi(\omega)$ – индикатор множества h . По предположению леммы $\mu(p_{kl}^{-1}h) = \mu(h)$ для преобразований $p_{kl} \in B$, или, другими словами, $(\chi, \mu) = (\chi_{kl}, \mu)$, если положить, кроме того, $\chi_{kl}(\omega) = \chi(p_{kl}\omega)$. Поскольку $\mu(h_k) > 1 - k^{-1}$, то

$$\left| (\chi, \mu) - \int_{h_k} \chi_{kl}(\omega) \mu(d\omega) \right| < \frac{1}{k}.$$

Учитывая, что $\chi_{kl}(\omega) \rightarrow f(\omega)$ на h_k при $l \rightarrow \infty$, получаем с помощью теоремы Лебега оценку

$$\left| (\chi, \mu) - \int_{h_k} f(\omega) \mu(d\omega) \right| \leq \frac{1}{k}.$$

Переходя здесь к пределу по $k \rightarrow \infty$, приходим к равенству

$$\int_{\Omega} \chi(\omega) \mu(d\omega) = \int_H f(\omega) \mu(d\omega).$$

Поскольку $\mu(H) = \mu(\Omega)$, то $(\chi, \mu) = (f, \mu)$ или $\mu(h) = \mu(p^{-1}h)$. Лемма доказана полностью.

Пусть теперь $\mu \in \Lambda(\Omega)$ и $\Phi_1(\mu) = \mathcal{F}_{\mu}(\Phi_0)$. Построим неубывающую трансфинитную последовательность классов преобразований $\Phi_{\nu}(\mu)$, полагая $\Phi_{\nu}(\mu) = \bigcup_{\eta < \nu} \Phi_{\eta}(\mu)$ или $\Phi_{\nu}(\mu) = \mathcal{F}_{\mu}(\Phi_{\nu-1}(\mu))$ в зависимости от того, является ли ν предельным порядковым числом или не является таковым. Обозначим через $\Phi(\mu)$ объединение $\Phi_{\nu}(\mu)$ по всем порядковым числам ν . Согласно лемме 2.1 элементы $p \in \Phi_{\nu}(\mu)$ наследуют свойства элементов $q \in \Phi_{\nu-1}(\mu)$, определяемые соотношениями $q \subset \Pi_{\mu}$ и $\mu(q^{-1}h) = \mu(h)$ для $h \in \Sigma_b$. Отсюда с помощью трансфинитной индукции находим, что теми же свойствами обладают и все $p \in \Phi(\mu)$.

Положим

$$\Phi = \bigcap_{\mu \in \Lambda(\Omega)} \Phi(\mu);$$

тогда фактически доказано

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2.2. *Преобразования $p \in \Phi$ удовлетворяют условиям i), ii).*

В общем случае Φ не является частью $E(\varphi, \Omega)$. С другой стороны, Φ содержит в себе секвенциальное замыкание $E_0(\varphi, \Omega)$ семейства преобразований Φ_0 в t -топологии пространства Π . Другими словами, $E_0(\varphi, \Omega)$ получается из семейства Φ_0 с помощью трансфинитной последовательности секвенциальных t -предельных переходов. Таким образом, $E_0(\varphi, \Omega) \subset E(\varphi, \Omega)$, и $E_0(\varphi, \Omega)$ состоит из борелевских преобразований компакта Ω . Оказывается, принадлежность классу Φ какого-либо преобразования $p \in \text{Ker } E(\varphi, \Omega)$, где $\text{Ker } E(\varphi, \Omega)$ – ядро полугруппы $E(\varphi, \Omega)$, налагает определенные ограничения на исходную динамическую систему. Отметим в этой связи одно элементарное общее свойство обволакивающих полугрупп в формулировке, удобной для дальнейших ссылок. Обозначаем здесь и далее через $M(A)$ объединение минимальных множеств полускада (V, A) на компакте $A = A(\Omega)$.

ЛЕММА 2.3. *Если $p \in \text{Ker } E(\varphi, \Omega)$, то $p\Omega \subset M(\Omega)$. Если же $P \in \text{Ker } \Gamma$, то $PA \subset M(A)$.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Как известно [8, предложение 3.5], любой элемент $p \in \text{Ker } E(\varphi, \Omega)$ можно представить в виде $p = \pi r$ с некоторым идемпотентом $\pi \in \text{Ker } E(\varphi, \Omega)$. При этом из [8, предложение 3.7] следует вложение $\pi\Omega \subset M(\Omega)$, а тем самым, и вложение $p\Omega \subset M(\Omega)$. Второе утверждение леммы аналогично первому согласно тому, что $\Gamma \simeq E(V, A)$.

Отметим, что в книге [8] рассматриваются обратимые динамические системы. Тем не менее, как нетрудно проверить непосредственно, цитированные здесь и ниже результаты из этой работы справедливы также и в необратимом случае.

ТЕОРЕМА 2.4. *Если ядро $\text{Ker } E(\varphi, \Omega)$ содержит элемент $p \in \Phi$, то $Z(\Omega) = (M(\Omega))^c$.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Поскольку $p \in \text{Ker } E(\varphi, \Omega)$, то лемма 2.3 гарантирует вложение $p\Omega \subset M(\Omega)$. Замкнутое множество $M^c = (M(\Omega))^c$ принадлежит сигма-алгебре Σ_b , и по лемме 2.1

$$\mu(M^c) = \mu(p^{-1}M^c) = \mu(\Omega) = 1$$

для любой меры $\mu \in \Lambda(\Omega)$. Тем самым, $\mu(M^c) = 1$ и $\text{supp } \mu \subset M^c$, а так как

$$Z(\Omega) = \left(\bigcup_{\mu \in \Lambda(\Omega)} \text{supp } \mu \right)^c,$$

то $Z(\Omega) \subset (M(\Omega))^c$. Обратное включение верно всегда (см., например, [6, гл. 5, § 7]). Теорема доказана.

Если вложение $(M(\Omega))^c \subset Z(\Omega)$ собственно, то $\text{Ker } E(\varphi, \Omega) \cap \Phi = \emptyset$.

§ 3. Сдвиг в $C(\Omega)$: основные результаты

Пусть, как и ранее, $X = C(\Omega)$ и U – оператор сдвига в X , порожденный непрерывным преобразованием φ компакта Ω .

Для точки $\omega \in \Omega$ обозначим через $\bar{o}(\omega)$ замыкание в Ω траектории $\{\varphi^n \omega, n \geq 0\}$ и отметим, что это множество полуинвариантно, т. е. $\varphi \bar{o}(\omega) \subset \bar{o}(\omega)$. Как известно, всякое замкнутое полуинвариантное множество компактной динамической системы содержит в себе минимальное множество t с теми же свойствами. При этом $\varphi t = t$ и любая траектория плотна в t . Заметим, что $p \bar{o}(\omega) \subset \bar{o}(\omega)$ для всех преобразований $p \in E(\varphi, \Omega)$.

Установим связь между минимальными множествами полукаскада (φ, Ω) и минимальными левыми идеалами обволакивающей полугруппы $E = E(\varphi, \Omega)$. Согласно [8, гл. 2] каждый такой идеал является минимальным множеством дискретной динамической системы (φ, Ω) , порожденной непрерывным преобразованием $p \rightarrow \varphi p$ компакта $E(\varphi, \Omega)$, а потому замкнут в тихоновской топологии $E(\varphi, \Omega)$.

ЛЕММА 3.1. *Для любого $\omega \in \Omega$ и произвольного минимального левого идеала $I \subset E(\varphi, \Omega)$ множество $I\omega \subset \bar{o}(\omega)$ минимально. Обратно, для каждого минимального множества $t \subset \bar{o}(\omega)$ найдется такой минимальный левый идеал $I \subset E(\varphi, \Omega)$, что $I\omega = t$.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Левый идеал I минимален, и $\varphi p = p\varphi$ для всех $p \in E(\varphi, \Omega)$, поэтому $I\varphi = \varphi I = I$. При фиксированном $\omega \in \Omega$ функция $\gamma: p \rightarrow p\omega$ действует непрерывно из $E(\varphi, \Omega)$ в Ω , так что множество $I\omega$ замкнуто и

$\varphi I\omega = I\omega$, следовательно, $I\omega$ содержит в себе минимальное множество m полукаскада (φ, Ω) . Функция $\gamma = \gamma_\omega$ отображает замкнутый идеал I на $I\omega$, значит, подмножество $\gamma^{-1}m \cap I$ полугруппы $E(\varphi, \Omega)$ замкнуто и полуинвариантно относительно полукаскада (φ, E) , но тогда $\gamma^{-1}m = I$ и $m = I\omega$.

Пусть теперь $m \subset \bar{o}(\omega)$ и $\xi \in m$; тогда $\varphi^{n(k)}\omega \rightarrow \xi$ для некоторой последовательности натуральных чисел $n(k)$, $k \geq 1$. Последовательность преобразований $\varphi^{n(k)}$ в компактном хаусдорфовом пространстве $E(\varphi, \Omega)$ обладает точкой накопления q . При этом $q\omega = \xi$, множество

$$I_{\omega, m} = \{p \in E(\varphi, \Omega) : p\omega \in m\}$$

не пусто (так как содержит q) и представляет собой левый идеал в $E(\varphi, \Omega)$. Данный идеал необходимо содержит в себе некоторый минимальный левый идеал I , причем $I\omega \subset m$. Поскольку $\varphi I\omega = I\omega$ и множество m минимально, то $I\omega = m$ и лемма доказана.

Как уже отмечалось в § 2, полугруппу операторов Γ можно интерпретировать как обволакивающую полугруппу $E(V, A)$ полукаскада (V, A) на метризуемом компакте $A = A(\Omega)$. Согласно общим представлениям [8] минимальные левые идеалы $J \subset \Gamma$ – это в точности минимальные множества динамической системы (V, Γ) на компакте Γ . Отметим, что действующий по правилу (2.1) непрерывный алгебраический эпиморфизм $\Gamma \xrightarrow{\theta} E(\varphi, \Omega)$ сохраняет классы левых, правых и двусторонних идеалов в полугруппах Γ и $E(\varphi, \Omega)$. То же верно и для операции перехода к полному прообразу θ^{-1} .

Сформулируем теперь главный результат настоящей работы. Заметим, что носитель $\text{supp } \mu$ эргодической меры $\mu \in \Lambda(\Omega)$ представляет собой замкнутое полуинвариантное множество. Рассмотрим следующие утверждения:

А) ядро $\text{Ker } E(\varphi, \Omega)$ обволакивающей полугруппы $E(\varphi, \Omega)$ имеет непустое пересечение с классом преобразований $\Phi \subset \Pi$;

А₁) носитель каждой эргодической меры $\mu \in \Lambda(\Omega)$ есть минимальное множество;

В) при любом $\omega \in \Omega$ замыкание траектории $\bar{o}(\omega)$ содержит единственное минимальное множество m , причем на m сосредоточена ровно одна вероятностная φ -инвариантная мера;

В₁) при любом $\omega \in \Omega$ замыкание траектории $\bar{o}(\omega)$ содержит единственное минимальное множество;

С) ядро L полугруппы G состоит из одного элемента;

Д) все эргодические последовательности операторов $T_n \in G_0$ сходятся в W^* -топологии пространства $\text{End } X^*$;

Е) все эргодические сети операторов $T_\alpha \in G_0$ сходятся в W^* -топологии пространства $\text{End } X^*$.

Понятно, что В) $\Rightarrow$ В₁) и Е) $\Rightarrow$ Д). В рассматриваемой ситуации $X = C(\Omega)$ из W^* -сходимости эргодической сети операторов $T_\alpha \in R_\alpha^*$ в $\text{End } X^*$ следует сходимость скалярных сетей $(R_\alpha x)(\omega)$ для любых $x \in X$ и $\omega \in \Omega$. Для эргодических последовательностей T_n обратное утверждение следует из теоремы Лебега о предельном переходе под знаком интеграла, тогда как в общем случае это неверно.

ТЕОРЕМА 3.2. *Имеют место импликации: $A) + B_1) \Rightarrow A_1), A_1) + B) \Rightarrow D), C) \Rightarrow B), C) \Leftrightarrow E)$.*

Совокупность условий $A_1) + B)$ означает, что для каждой точки $\omega \in \Omega$ динамическая система $(\varphi, \bar{o}(\omega))$ одноэргодична, т. е. обладает единственной вероятностной инвариантной борелевской мерой. Эквивалентность условий $C)$ и $E)$ представляет собой частный случай теоремы 1.3. Логический переход $A_1) + B) \Rightarrow D)$ слегка обобщает известное утверждение (см. [7, теорема 5.2]), согласно которому одноэргодичность полускада $(\varphi, \bar{o}(\omega))$ влечет квазирегулярность всех точек множества $\bar{o}(\omega)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 3.2. *Импликация $A) + B_1) \Rightarrow A_1)$.* Носитель $s_\mu = \text{supp } \mu$ любой эргодической меры $\mu \in \Lambda(\Omega)$ топологически транзитивен [13, § 4.1], т. е. $\bar{o}(\omega) = s_\mu$ для некоторой точки $\omega \in s_\mu$. С учетом предположения $B_1)$ отсюда следует, что в s_μ содержится единственное минимальное множество m . Поскольку $\theta\Gamma = E(\varphi, \Omega)$, где θ – эпиморфизм (2.1), для $p \in \text{Ker } E(\varphi, \Omega) \cap \Phi$ в полугруппе операторов Γ найдется элемент $P \in \theta^{-1}p$. Согласно лемме 2.3 имеем $ps_\mu \subset s_\mu \cap M(\Omega)$, но $s_\mu \cap M(\Omega) = m$, а потому $ps_\mu \subset m$ и $p^{-1}m \supset s_\mu$. Так как $p \in \Phi$, то предположение 2.2 обеспечивает соотношения

$$p^{-1}m \subset \Sigma_\mu, \quad \mu(m) = \mu(p^{-1}m) = \mu(s_\mu)$$

для замкнутого множества $m \subset s_\mu$. Из определения носителя меры теперь следует равенство $m = \text{supp } \mu$, что и требовалось доказать.

Импликация $A_1) + B) \Rightarrow D)$. Пусть R_n – произвольная эргодическая последовательность операторов в $\text{End } X$ и $\omega \in \Omega$. По предположению теоремы динамическая система $(\varphi, \bar{o}(\omega))$ обладает единственной (вероятностной) инвариантной мерой μ . Поскольку постоянные функции φ -инвариантны на компакте $\bar{o}(\omega)$ и $(1, \mu) \neq (2, \mu)$, по теореме 1.5 для любой непрерывной функции $x \in X$ скалярная последовательность $(R_n x)(\xi)$ сходится при каждом $\xi \in \bar{o}(\omega)$. Отсюда видим, что последовательность функций $R_n x$ сходится поточечно на Ω , следовательно, эргодическая последовательность операторов $T_n = R_n^*$ сходится в W^* -топологии пространства операторов $\text{End } X^*$. Таким образом, слабо* сходится любая эргодическая операторная последовательность $T_n \in G_0$, и доказательство данного пункта завершено.

Импликация $C) \Rightarrow B)$. Согласно теореме 1.3 при условии $C)$ имеет место поточечная сходимост средних Чезаро $U_n x$ для произвольной непрерывной функции $x \in X$, поэтому [7, теорема 5.4] на каждом минимальном множестве $m \subset \Omega$ сосредоточена ровно одна вероятностная борелевская инвариантная мера. Покажем теперь, что замыкание каждой траектории динамической системы (φ, Ω) содержит единственное минимальное множество. Если $\omega \in \Omega$ и $m \subset \bar{o}(\omega)$, то по лемме 3.1 в обволакивающей полугруппе $E(\varphi, \Omega)$ найдется минимальный левый идеал I такой, что $I\omega = m$. Допустим, что при каком-то ω в $\bar{o}(\omega)$ содержатся два разных минимальных множества m_1 и m_2 . Тогда $I_k \omega = m_k$ при $k = 1, 2$ для некоторых минимальных левых идеалов $I_k \subset E(\varphi, \Omega)$. Если $\theta: \Gamma \rightarrow E(\varphi, \Omega)$ – канонический эпиморфизм полугрупп $\Gamma \simeq E(V, A)$ и $E(\varphi, \Omega)$, то полные прообразы $\theta^{-1}I_1$ и $\theta^{-1}I_2$ представляют собой левые идеалы в Γ , необходимо содержащие в себе минимальные

левые идеалы J_1 и J_2 . При этом левые идеалы θJ_k принадлежат I_k , а значит, $\theta J_k = I_k$, $k = 1, 2$. Поскольку идеалы J_k представляют собой минимальные множества полускада (V, Γ) , найдутся сосредоточенные на J_k эргодические меры $\lambda_k \in \Lambda(\Gamma)$. Положим

$$Q_k = \int_{\Gamma} P \lambda_k(dP);$$

тогда с учетом равенств $P\delta(\omega) = \delta(p\omega)$, $p = \theta P$ имеем соотношения

$$Q_k \delta(\omega) = \int_{\Gamma} \delta(p\omega) \lambda_k(dP).$$

Поскольку меры λ_k инвариантны относительно (V, Γ) , согласно лемме 1.7 имеем $Q_k \in L$. Так как $\text{supp } \lambda_k = J_k$ и $\theta J_k \omega = m_k$, то $p\omega \in m_k$ для каждого оператора $P \subset J_k$ и $p = \theta P$. Интеграл в представлении Шоке (1.3) понимается в смысле W^* О-сходимости, поэтому меры $Q_k \delta(\omega)$ сосредоточены на множествах m_k . Таким образом, $Q_1 \neq Q_2$, и полученное противоречие завершает вывод логического перехода $C) \Rightarrow B)$. Теорема доказана полностью.

Вывод импликации $A) + B_1) \Rightarrow A_1)$ теоремы 3.2 реально опирается лишь на свойство ii) преобразования $p \in \text{Ker } E(\varphi, \Omega)$, ибо μ -измеримость множества $p^{-1}m$ следует просто из соотношений $p^{-1}m \supset s_\mu$ и $\mu(s_\mu) = 1$. Это же замечание справедливо и в связи с доказательством теоремы 2.4. Оба утверждения остаются в силе при условии, что ядро $\text{Ker } E(\varphi, \Omega)$ содержит преобразование $p: \Omega \rightarrow \Omega$ со следующим свойством: для каждой эргодической меры $\mu \in \Lambda(\Omega)$ равенство $\mu(p^{-1}h) = \mu(h)$ справедливо в случае, если множество h замкнуто и $p^{-1}h \subset \Sigma_\mu$.

Применительно к W^* О-сходимости средних Чезаро V_n имеем

СЛЕДСТВИЕ 3.3. *Если $\text{Ker } E(\varphi, \Omega) \cap \Phi \neq \emptyset$, то условие B) влечет квазирегулярность всех точек $\omega \in \Omega$.*

Действительно, из теоремы 3.2 следует импликация $A) + B) \Rightarrow D)$, т. е. в данном случае слабо* сходятся все операторные эргодические последовательности T_n в $\text{End } X^*$ и в том числе средние V_n .

Цитированный выше результат Окстоби [7, теорема 5.4] можно сформулировать в усиленной форме: *если некоторая эргодическая последовательность операторов $T_n \in G_0$ сходится в W^* О-топологии, то на каждом минимальном множестве $m \subset \Omega$ сосредоточена ровно одна вероятностная борелевская инвариантная мера.*

Отсюда следует неожиданный вывод: если на каком-то минимальном множестве полускада (φ, Ω) сосредоточена более чем одна эргодическая мера, то в W^* О-топологии все эргодические последовательности операторов $T_n \in G_0$ расходятся, хотя среди эргодических сетей операторов $T_\alpha \in G_0$ непременно найдутся сходящиеся. Другими словами, в этом случае ядро L полугруппы G не имеет общих элементов с совокупностью секвенциальных слабых* пределов элементов выпуклого множества операторов $G_0 \subset \text{End } X^*$.

Выясним теперь, при каких условиях ядро L полугруппы G имеет непустое пересечение с подполугруппой Γ . Заметим, что полугруппа Γ содержит единицу, а именно тождественный оператор в пространстве X^* . Напомним также, что ядро любой обволакивающей полугруппы не пусто и представляет собой объединение всех ее минимальных левых идеалов.

ЛЕММА 3.4. *Функция $\theta: \Gamma \rightarrow E(\varphi, \Omega)$ отображает $\text{Ker } \Gamma$ на $\text{Ker } E(\varphi, \Omega)$.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Эпиморфизм θ (как и переход к полному прообразу θ^{-1}) сохраняет классы односторонних идеалов в полугруппах Γ и $E = E(\varphi, \Omega)$. Поскольку $\theta(\text{Ker } \Gamma)$ – двусторонний идеал, то $\theta(\text{Ker } \Gamma) \supset \text{Ker } E$. Установим обратное вложение. Пусть $p \in \theta(\text{Ker } \Gamma)$; тогда $p = \theta P$ для некоторого элемента $P \in \text{Ker } \Gamma$. Если I – некоторый минимальный левый идеал в $E(\varphi, \Omega)$ и $J = \theta^{-1}I$, то J – левый идеал в Γ . Поскольку $\theta J = I$ и $\theta P = p$, то $\theta JP = Ip$ и $JP \subset \theta^{-1}(Ip)$. Далее, $P \in \text{Ker } \Gamma$ и Γ – полугруппа с единицей, следовательно, главный идеал ΓP минимален и содержит в себе P . Из соотношения $JP \subset \Gamma P$ находим, что $JP = \Gamma P$ и $P \in JP$. Таким образом, $P \subset \theta^{-1}(Ip)$, а потому $p \in Ip$. Минимальный левый идеал Ip принадлежит ядру полугруппы $E(\varphi, \Omega)$, значит, $p \in \text{Ker } E$, и доказательство завершено.

Пусть $N(\Omega)$ и $N(A)$ – множества неподвижных точек полускадов (φ, Ω) и (V, A) на компактах Ω и $A = A(\Omega)$. Как и ранее, обозначаем через $M(\Omega)$ и $M(A)$ объединения всех минимальных множеств соответствующих динамических систем.

ТЕОРЕМА 3.5. *Следующие три условия попарно эквивалентны:*

- а) $L \cap \Gamma \neq \emptyset$;
- б) $L \cap \Gamma = \text{Ker } \Gamma$;
- в) $M(A) = N(A)$.

Кроме того, каждое из условий а)–в) влечет равенство $M(\Omega) = N(\Omega)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Импликация а) $\Rightarrow$ б). Поскольку $L = \text{Ker } G$ и Γ – подполугруппа G , в предположении а) множество $L \cap \Gamma$ представляет собой непустой двусторонний идеал полугруппы Γ . По лемме 1.1 данное множество состоит из одноэлементных минимальных левых идеалов полугруппы G . Отсюда видим, что $L \cap \Gamma \subset \text{Ker } \Gamma$, а потому $L \cap \Gamma = \text{Ker } \Gamma$.

Импликация б) $\Rightarrow$ в). Ясно, что $M(A) \supset N(A)$. Поскольку $\Gamma \simeq E(V, A)$, согласно [8, с. 20] для произвольного элемента (меры) $\mu \in M(A)$ найдется оператор $Q \in \text{Ker } \Gamma$ такой, что $\mu \in QA$. В предположении б) имеем $Q \in L$ и $VQ = Q$, следовательно, $V\mu = \mu$ при всех $\mu \in M(A)$ и $M(A) = N(A)$.

Импликация в) $\Rightarrow$ а). По лемме 2.3 для элементов $Q \in \text{Ker } \Gamma$ справедливо соотношение $QA \subset M(A)$. Тем самым, предположение в) приводит к равенству $VQ = Q$, а значит, и к вложению $L \cap \Gamma \supset \text{Ker } \Gamma$.

Наконец, вновь пользуясь цитированным выше результатом [8], находим, что для любой точки $\omega \in M(\Omega)$ существует элемент $\pi \in \text{Ker } E(\varphi, \Omega)$ со свойством $\omega \in \pi\Omega$. По лемме 3.4 имеем $\pi = \theta Q$, где Q – некоторый оператор из $\text{Ker } \Gamma$. Если $L \cap \Gamma = \text{Ker } \Gamma$, то $VQ = Q$. Поскольку θ – гомоморфизм полугрупп и $\theta V = \varphi$, то $\theta VQ = \theta Q = \varphi\theta Q$, а значит, $\varphi\pi = \pi$. Если $\omega = \pi\xi$ для некоторого $\xi \in \Omega$, то

$\varphi\omega = \omega$ и $\omega \in N(\Omega)$. Как видим, условие б) влечет соотношение $M(\Omega) \subset N(\Omega)$. Обратное вложение тривиально, и теорема доказана полностью.

§ 4. Сдвиг в $C(\Omega)$: структура $\text{ex } G$

Перейдем к обсуждению структуры множества крайних точек $\text{ex } G$ выпуклого множества $G \subset \text{End } X^*$ все в той же ситуации, когда $X = C(\Omega)$ и оператор сдвига $U \in \text{End } X$ соответствует непрерывному преобразованию φ компакта Ω .

Ранее уже отмечалось соотношение $\text{ex } G \subset \Gamma$. Кроме того, покажем, что инъ-ективность определенного правилом (2.1) эпиморфизма $\theta: \Gamma \rightarrow E(\varphi, \Omega)$ равно-сильна равенству $\text{ex } G = \Gamma$. Напомним, что через $K = K(\Omega)$ обозначена сово-купность мер Дирака на множестве Ω , а через $A(\Omega)$ – выпуклое компактное множество всех вероятностных борелевских мер на Ω . Как известно [11, гл. 1], $K(\Omega) = \text{ex } A(\Omega)$.

ЛЕММА 4.1. *Для элементов $T \in G$ условия $T \in \Gamma$ и $TK \subset K$ эквивалентны.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Полугруппа Γ представляет собой замыкание счетной совокупности операторов $\{V^n, n \geq 0\}$ в W^* О-топологии пространства $\text{End } X^*$. Множество точечных мер $K(\Omega)$ замкнуто в $A(\Omega)$, и $V^n \delta(\omega) = \delta(\varphi^n \omega)$ при всех $\omega \in \Omega$, поэтому $TK \subset K$, если $T \in \Gamma$.

Предположим теперь, что $T \in G$ и $TK \subset K$. Пусть $\lambda \in A(\Gamma)$ – одна из представляющих мер для оператора T в интегральной формуле (1.3); тогда для заданной точки $\omega \in \Omega$ имеем

$$T\delta(\omega) = \int_{\Gamma} \delta(p\omega) \lambda(dP) = \delta(\xi),$$

где $p = \theta P$ и $\xi \in \Omega$. Положим

$$H(\omega, T) = \{P \in \Gamma: P\delta(\omega) = T\delta(\omega)\},$$

или в другой записи $H(\omega, T) = \{P \in \Gamma: p\omega = \xi\}$. Как видим, $H(\omega, T)$ пред-ставляет собой замкнутое выпуклое подмножество компакта $\Gamma \subset G$. Покажем, что $\text{supp } \lambda \subset H(\omega, T)$. Борелевская мера $\lambda \in A(\Gamma)$ регулярна, так что в пред-положении противного найдется не задевающее $H(\omega, T)$ замкнутое множество $s \subset \text{supp } \lambda$ такое, что $\lambda(s) > 0$. Взяв при этом функцию $g \in C(\Omega)$ со свойствами $0 \leq g \leq 1$, $g(\xi) = 0$ и $g = 1$ на замкнутом (не содержащем точку ξ) множе-стве $(\theta s)\omega$, приходим к взаимоисключающим соотношениям $(g, T\delta(\omega)) = 0$ и $(g, T\delta(\omega)) \geq \lambda(s)$. Точка $\omega \in \Omega$ выбрана произвольно, поэтому $\text{supp } \lambda \subset H(T)$, если положить

$$H(T) = \bigcap_{\omega \in \Omega} H(\omega, T),$$

или в иной записи

$$H(T) = \{P \in \Gamma: P|_K = T|_K\}.$$

Множество операторов $H(T) \subset \Gamma$ замкнуто, выпукло, и, фактически,

$$T = \int_{H(T)} P \lambda(dP). \quad (4.1)$$

Отсюда следует, что $T \in \mathbf{H}(T)$, а значит, $T \in \Gamma$, и лемма доказана.

Таким образом, интегральное представление (1.3) для операторов $T \in \Gamma$ можно записать в виде (4.1). Если при этом $\mathbf{H}(T) = \{T\}$, то однозначно $\lambda = \delta(T)$.

Отметим (на примере подмножеств G) общее свойство крайних точек: если $B \subset G$, то $\text{ex } B \supset B \cap \text{ex } G$.

ЛЕММА 4.2. *Условия $P \in \text{ex } G$ и $P \in \text{ex } \mathbf{H}(P)$ эквивалентны.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Для оператора $P \in \text{ex } G$ с учетом соотношений $P \in \Gamma$, $P \in \mathbf{H}(P)$ и $\text{ex } \mathbf{H}(P) \supset \mathbf{H}(P) \cap \text{ex } G$ находим, что $P \in \text{ex } \mathbf{H}(P)$. Установим обратную связь. Пусть $P \in \text{ex } \mathbf{H}(P)$ и $p = \theta P$. Если $2P = T_1 + T_2$, где $T_i \in G$ при $i = 1, 2$, то $2\delta(p\omega) = T_1\delta(\omega) + T_2\delta(\omega)$ для всех $\omega \in \Omega$. С учетом равенства $\text{ex } A(\Omega) = K(\Omega)$ отсюда вытекает, что $T_i\delta(\omega) = \delta(p\omega)$. По лемме 4.1 имеем $T_i \in \Gamma$, а поскольку $T_i|_K = P|_K$, то $T_i \in \mathbf{H}(P)$. Как видим, $T_i = P$ и $P \in \text{ex } G$. Лемма доказана.

Из включений $\Gamma \subset G$ и $\text{ex } G \subset \Gamma$ следует, что $\text{ex } \Gamma \supset \Gamma \cap \text{ex } G$ и $\text{ex } \Gamma \supset \text{ex } G$. С другой стороны, для произвольного элемента $P \in \Gamma$ имеют место соотношения $P \in \mathbf{H}(P) \subset \Gamma$ и $\text{ex } \mathbf{H}(P) \supset \mathbf{H}(P) \cap \text{ex } \Gamma$. Тем самым, если $P \in \text{ex } \Gamma$, то $P \in \text{ex } \mathbf{H}(P)$. По лемме 4.2 имеем $\text{ex } \mathbf{H}(P) \subset \text{ex } G$, значит, $P \in \text{ex } G$. Итак, $\text{ex } \Gamma \subset \text{ex } G$, и справедливо

СЛЕДСТВИЕ 4.3. *Имеет место равенство $\text{ex } G = \text{ex } \Gamma$.*

Лемма 4.2 позволяет описать крайние точки множества G следующим образом:

$$\text{ex } G = \bigcup_{P \in \Gamma} \text{ex } \mathbf{H}(P). \quad (4.2)$$

Теперь можно сформулировать основное утверждение настоящего параграфа.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 4.4. *Равенство $\text{ex } G = \Gamma$ равносильно инъективности эпиморфизма $\theta: \Gamma \rightarrow E(\varphi, \Omega)$.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $P \in \Gamma$. Из инъективности функции θ следует, что $\mathbf{H}(P) = \{P\}$ и $P \in \text{ex } G$ согласно соотношению (4.2). Таким образом, $\Gamma \subset \text{ex } G$, и поскольку обратное включение верно всегда, то $\text{ex } G = \Gamma$. Если же изначально $\text{ex } G = \Gamma$, то любой элемент $P \in \Gamma$ является крайней точкой выпуклого множества $\mathbf{H}(P) \subset \Gamma$. Тем самым, $\mathbf{H}(P)$ целиком состоит из крайних точек, а значит, $\mathbf{H}(P) = \{P\}$, и функция θ инъективна. Предложение доказано.

§ 5. Некоторые дополнения

Важную роль в предыдущих рассмотренных играх играло условие

$$\text{Ker } E(\varphi, \Omega) \cap \Phi \neq \emptyset, \quad (5.1)$$

означающее, что ядро обволакивающей полугруппы $E(\varphi, \Omega)$ содержит хотя бы одно “достаточно регулярное” отображение $p: \Omega \rightarrow \Omega$. Данное требование желательно переформулировать в более конструктивных терминах пусть даже

ценой его усиления. С этой точки зрения представляет интерес ряд свойств обволакивающих полугрупп динамических систем, описанных в обзоре [14]. Рассмотрим два предположения:

- а) компактное пространство $E(\varphi, \Omega)$ метризуемо;
- б) каждое замкнутое φ -инвариантное множество $\Theta \subset \Omega$ содержит траекторию, устойчивую по Ляпунову относительно полускада (φ, Θ) .

Здесь, как и ранее, рассматриваются односторонние траектории дискретных динамических систем. Слегка изменив авторскую терминологию, можно сформулировать на основе результатов из работы [14] следующее утверждение.

ЛЕММА 5.1. *Условия а) и б) равносильны, причем любое из них влечет совпадение компакта $E(\varphi, \Omega)$ с множеством всевозможных секвенциальных поточечных пределов элементов базисного семейства преобразований $\Phi_0 = \{\varphi^n, n \geq 0\}$.*

Поскольку класс преобразований Φ содержит в себе секвенциальное замыкание семейства Φ_0 , каждое из условий а), б) гарантирует (с большим запасом) справедливость соотношения (5.1). Более того [14], [15], данные условия обеспечивают также инъективность заданного правилом (2.1) эпиморфизма $\theta: \Gamma \rightarrow E(\varphi, \Omega)$, а значит, согласно предложению 4.4 и равенство $\text{ex } G = \Gamma$. Отметим, что полугруппа операторов $\Gamma \subset \text{End}(C(\Omega))^*$ и ее связь с обволакивающей полугруппой $E(\varphi, \Omega)$ впервые рассматривались именно в статье [15]. Известен пример [14, с. 2356] минимального дистального каскада на двумерном торе, для которого функция θ не инъективна.

Импликация $A) + B_1) \Rightarrow A_1)$ теоремы 3.2 в сочетании с леммой 5.1 приводит к следующему результату.

ТЕОРЕМА 5.2. *Допустим, что справедливо условие б) и замыкание каждой траектории полускада (φ, Ω) содержит ровно одно минимальное множество. Тогда все φ – эргодические меры $\mu \in \Lambda(\Omega)$ – сосредоточены на минимальных множествах.*

В работе [14] и цитированных в ней статьях можно найти еще несколько условий, эквивалентных предположению б), характеризующему в определенном смысле “не хаотичные” динамические системы.

Список литературы

1. U. Krengel, *Ergodic theorems*, de Gruyter Stud. Math., **6**, de Gruyter, Berlin–New York, 1985.
2. R. Sine, “A mean ergodic theorem”, *Proc. Amer. Math. Soc.*, **24**:3 (1970), 438–439.
3. E. Yu. Emel'ynov, N. Erkursun, “Generalization of Eberlein's and Sine's ergodic theorems to LR -nets”, *Владикавказ. матем. журн.*, **9**:3 (2007), 22–26.
4. S. P. Lloyd, “On the mean ergodic theorem of Sine”, *Proc. Amer. Math. Soc.*, **56** (1976), 121–126.
5. A. Iwanik, “On pointwise convergence of Cesàro means and separation properties for Markov operators on $C(X)$ ”, *Bull. Acad. Polon. Sci. Sér. Sci. Math.*, **29**:9–10 (1981), 515–520.

6. В. В. Немыцкий, В. В. Степанов, *Качественная теория дифференциальных уравнений*, 3-е изд., УРСС, М., 2004; англ. пер. 1-го изд.: V.V. Nemytskii, V.V. Stepanov, *Qualitative theory of differential equations*, Princeton Univ. Press, Princeton, NJ, 1960.
7. Д. Окстоби, “Эргодические множества”, *УМН*, **8:3** (1953), 75–97; пер. с англ.: J. C. Oxtoby, “Ergodic sets”, *Bull. Amer. Math. Soc.*, **58:3** (1952), 116–136.
8. R. Ellis, *Lectures on topological dynamics*, Benjamin, New York, 1969.
9. А. Клиффорд, Г. Престон, *Алгебраическая теория полугрупп*, т. 1, Мир, М., 1972; пер. с англ.: A. H. Clifford, G. B. Preston, *The algebraic theory of semigroups*, v. 1, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1961.
10. Е. С. Ляпин, *Полугруппы*, Наука, М., 1960; англ. пер.: E. S. Lyapun, *Semigroups*, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1963.
11. Р. Фелпс, *Лекции о теореме Шоке*, Мир, М., 1968; пер. с англ.: R. R. Phelps, *Lectures on Choquet’s theorem*, Van Nostrand, Princeton–Toronto–New York–London, 1966.
12. Ф. Хаусдорф, *Теория множеств*, 4-е изд., УРСС, М., 2007; пер. с нем.: F. Hausdorff, *Mengenlehre*, de Gruyter, Berlin–Leipzig, 1927.
13. А. В. Каток, Б. Хасселблат, *Введение в современную теорию динамических систем*, Факториал, М., 1999; пер. с англ.: A. Katok, B. Hasselblatt, *Introduction to the modern theory of dynamical systems*, Encyclopedia Math. Appl., **54**, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1995.
14. E. Glasner, “Enveloping semigroups in topological dynamics”, *Topology Appl.*, **154**:11 (2007), 2344–2363.
15. A. Köhler, “Enveloping semigroups for flows”, *Proc. Roy. Irish Acad. Sect. A*, **95**:2 (1995), 179–191.

А. В. РОМАНОВ (A. V. ROMANOV)
Московский государственный институт электроники и
математики (технический университет)
E-mail: vitkar48@inbox.ru

Поступило в редакцию
08.02.2010
22.03.2010