Math-Net.Ru

Общероссийский математический портал

В. В. Гончаров, С. А. Тимошин, Письмо в редакцию, *Матем. заметки*, 2002, том 71, выпуск 2, 320

DOI: <https://doi.org/10.4213/mzm645>

Использование Общероссийского математического портала Math-Net.Ru подразумевает, что вы прочитали и согласны с пользовательским соглашением
<http://www.mathnet.ru/rus/agreement>

Параметры загрузки:

IP: 54.197.130.99

26 апреля 2023 г., 12:42:00

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В. В. Гончаров, С. А. Тимошин

После представления нашей статьи “Об одном классе эволюционных уравнений: существование решений с функциональными краевыми условиями” (Матем. заметки, т. 65 (1999), № 1, с. 48–60) в журнал в ней была замечена некорректность. Речь идет о краевой задаче для дифференциально-операторного уравнения, рассмотренной в п. 5 как приложение основного результата (теорема 1). На самом деле, если X – пространство всех непрерывных числовых функций на $\overline{\Omega}$, то множество $D(\mathbf{A}_C)$ не будет плотным в X , что является необходимым условием сильной непрерывности полугруппы $\{S_C(t), t \geq 0\}$. Поэтому под X следует понимать подпространство $C_0(\overline{\Omega})$ непрерывных функций $u: \overline{\Omega} \rightarrow \mathbb{R}$ таких, что $u(x) = 0$ на $\partial\Omega$. В этом случае оператор $\mathbf{A}_C$, $(\mathbf{A}_C u)(x) := \Delta u(x)$, определен на плотном множестве $D(\mathbf{A}_C) := \{u \in X : \Delta u \in X\}$ и действительно порождает аналитическую c_0 -полугруппу. В связи с этим в теореме 3 необходимо дополнительно предположить, что отображение ψ переводит границу $\partial\Omega$ в себя. Тогда оператор $\varphi: \mathcal{K}^* \rightarrow K$ (см. формулу (19)) будет корректно определен.

Авторы благодарят проф. G. Dal Maso, который указал на имеющийся недостаток.

Иркутский ВЦ СО РАН
E-mail: goncha@icc.ru

Поступило
06.10.2001