Math-Net.Ru

Общероссийский математический портал

Хианглин Вей, Венхуа Лан, Рен Динг, Письмо в редакцию, *Матем. заметки*, 2009, том 86, выпуск 6, 954

DOI: <https://doi.org/10.4213/mzm8531>

Использование Общероссийского математического портала Math-Net.Ru подразумевает, что вы прочитали и согласны с пользовательским соглашением
<http://www.mathnet.ru/rus/agreement>

Параметры загрузки:

IP: 35.173.219.12

26 апреля 2023 г., 16:12:30

Письмо в редакцию**Хианглин Вей, Венхуа Лан, Рен Динг**

В работе [1] должны быть сделаны следующие поправки.

- Теорема 1 должна формулироваться следующим образом.

ТЕОРЕМА 1. Пусть P – множество R_7 минус одна точка. Тогда существует два выпуклых 4-равнобедренных семиточечных множества, содержащих P .

- На с. 798 в 15-ой строке сверху часть предложения

“Если x лежит на $\widehat{ab}$ (за исключением конечной точки b), то множество $\{3, 5, 6, x\}$ не является 4-равнобедренным;”

должна быть заменена на

“Если x лежит на $\widehat{ab}$ (за исключением конечной точки b), то оно должно быть точкой q такой, что $d(1, q) = d(6, q)$, так как в противном случае множество $\{3, 5, 6, x\}$ не будет 4-равнобедренным, и легко видеть, что $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, q\}$ – 4-равнобедренное множество;”

- Подпись к рис. 1 должна быть следующей:

“Выпуклые 4-равнобедренные семиточечные множества содержащие множество R_7 минус одна точка”.

- Предпоследний абзац в доказательстве теоремы 1 должен быть заменен на

“Итак, существует два выпуклых 4-равнобедренных семиточечных множества, содержащие множество R_7 минус одна точка.”

СПИСОК ЦИТИРОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Хианглин Вей, Венхуа Лан, Рен Динг, “О выпуклых 4-равнобедренных семиточечных множествах”, *Матем. заметки*, **85**:5 (2009), 797–800.

Хианглин Вей

Университет науки и техники провинции Хебей, КНР

E-mail: wxlhebtu@126.com**Венхуа Лан**

Университет естественных наук провинции Хебей, КНР

E-mail: lanandshuo@126.com**Рен Динг**

Университет естественных наук провинции Хебей, КНР

E-mail: rending@hebtu.edu.cn

Поступило

21.06.2009