Math-Net.Ru

Общероссийский математический портал

С. Ю. Оревков, Сильная положительность в правоинвариантном порядке на группе кос и квазиположительность, *Матем. заметки*, 2000, том 68, выпуск 5, 692–698

DOI: <https://doi.org/10.4213/mzm990>

Использование Общероссийского математического портала Math-Net.Ru подразумевает, что вы прочитали и согласны с пользовательским соглашением
<http://www.mathnet.ru/rus/agreement>

Параметры загрузки:

IP: 54.84.234.179

26 апреля 2023 г., 13:48:27

УДК 515

СИЛЬНАЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОСТЬ В ПРАВО-ИНВАРИАНТНОМ ПОРЯДКЕ НА ГРУППЕ КОС И КВАЗИПОЛОЖИТЕЛЬНОСТЬ

С. Ю. Оревков

Деорнуа построил право-инвариантный порядок на группе кос B_n , однозначно определяемый тем, что $\beta_0 \sigma_i \beta_1 > 1$, если β_0, β_1 – слова, составленные из $\sigma_{i+1}^{\pm 1}, \dots, \sigma_{n-1}^{\pm 1}$. Коса называется *сильно положительной*, если $\alpha \beta \alpha^{-1} > 1$ для всех $\alpha \in B_n$. В заметке доказано, что коса $\beta_0 (\sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_{n-1}) (\sigma_{n-1} \sigma_{n-2} \dots \sigma_1)$ сильно положительна, если слово β_0 не содержит $\sigma_1^{\pm 1}$. Дано также геометрическое доказательство результата Баркера и Лавера о том, что стандартные образующие группы кос сильно положительны. Наконец, обсуждается связь право-инвариантного порядка с квазиположительностью.

Библиография: 10 названий.

Пусть B_n – группа кос из n нитей:

$$B_n = \langle \sigma_1, \dots, \sigma_{n-1} \mid \sigma_i \sigma_j = \sigma_j \sigma_i \text{ при } |i - j| > 1, \sigma_i \sigma_j \sigma_i = \sigma_j \sigma_i \sigma_j \text{ при } |i - j| = 1 \rangle.$$

Деорнуа [1]–[3] доказал, что существует полный право-инвариантный порядок на элементах группы B_n (право-инвариантный значит $\alpha < \beta \implies \alpha \gamma < \beta \gamma \ \forall \alpha, \beta, \gamma$), однозначно определяемый условием

$$\beta_0 \sigma_i \beta_1 > 1, \text{ если } \beta_0, \beta_1 \text{ – слова, составленные из } \sigma_{i+1}^{\pm 1}, \dots, \sigma_{n-1}^{\pm 1}.$$

Он дал также эффективный на практике алгоритм, определяющий, является ли данная коса положительной, тривиальной или отрицательной (коса β называется *положительной*, если $\beta > 1$). Недавно авторы статьи [4] дали красивую геометрическую интерпретацию право-инвариантного порядка (см. п. 2 ниже) и другие алгоритмы сравнения кос, про один из которых доказана квадратичность по времени.

Будем говорить, что коса $\beta \in B_n$ *сильно положительна*, если $\alpha \beta \alpha^{-1} > 1$ для любого $\alpha \in B_n$. Ясно, что сильно положительные косы образуют полугруппу, инвариантную относительно сопряжения. Коса $\beta = \sigma_1^2 \sigma_2^{-2}$ является примером положительной, но не сильно положительной косы, потому что $\alpha \beta \alpha^{-1} < 1$ для $\alpha = \sigma_2 \sigma_1^2 \sigma_2$ (см. [4]). В настоящей заметке мы обсуждаем некоторые классы сильно положительных кос.

ТЕОРЕМА А (Баркел [5], Лавер [6]). *Образующие σ_k сильно положительны.*

Доказательства, приведенные в [5], [6], – алгебраические. Недавно Вист [7] дал геометрическое доказательство, основанное на идеях и результатах статьи [4]. В п. 3 мы

Автор благодарит институт им. Макса Планка за финансовую поддержку и гостеприимство.

даем еще одно доказательство. В нем мы получаем теорему А как непосредственное следствие из основного результата работы [4].

Коса $\beta \in B_n$ называется *квазиположительной*, если $\beta = (\gamma_1 \sigma_1 \gamma_1^{-1}) \cdots (\gamma_s \sigma_1 \gamma_s^{-1})$ при некоторых $\gamma_1, \dots, \gamma_s \in B_n$. Это понятие было введено Рудольфом [8], [9]; он показал, что коса квазиположительна тогда и только тогда, когда она является граничной косой алгебраической функции $w(z)$, неявно заданной в диске уравнением $w^n + a_1(z)w^{n-1} + \dots + a_n(z) = 0$, $a_i \in \mathbb{C}[z]$. Вопрос о квазиположительности косы естественно возникает в топологии плоских вещественных алгебраических кривых [10]. Алгоритм распознавания квазиположительных кос известен лишь при $n = 3$. Некоторые необходимые условия для квазиположительности имеются в [9], [10]. Теорема А дает еще одно необходимое условие для квазиположительности косы, поскольку она, очевидно, эквивалентна утверждению о том, что *квазиположительная коса положительна в право-инвариантном порядке*.

Обозначим через Q_n (соответственно P_n) множество квазиположительных (соответственно сильно положительных) кос в B_n . В этих обозначениях теорему А можно переформулировать как $Q_n \subset P_n$. Обозначим

$$\pi_n := (\sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_{n-1}) \cdot (\sigma_{n-1} \sigma_{n-2} \dots \sigma_1) \in B_n.$$

ТЕОРЕМА В. Если β_0 – слово, составленное из $\sigma_2^{\pm 1}, \dots, \sigma_{n-1}^{\pm 1}$, то коса $\beta = \beta_0 \pi_n$ сильно положительна.

Это показывает, что $P_n \neq Q_n$. Действительно, для косы $\beta = \prod_j \sigma_{i_j}^{k_j}$ обозначим $e(\beta) = \sum_j k_j$. Тогда теорема В влечет

СЛЕДСТВИЕ. Если β_0 – слово, составленное из $\sigma_2^{\pm 1}, \dots, \sigma_{n-1}^{\pm 1}$, и $e(\beta_0) < 2 - 2n$ (например $\beta_0 = \sigma_2^{-2n}$), то $\beta_0 \pi_n \in P_n \setminus Q_n$.

Пусть $\beta \in B_n$ – коса и L – соответствующее зацепление (замыкание косы β). Пусть $L_1, \dots, L_k$ – компоненты L . Пусть $n_1, \dots, n_k$ – любые положительные целые числа и $\beta_1, \dots, \beta_k$ – любые косы, $\beta_j \in B_{n_j}$. Тогда $(\beta_1, \dots, \beta_k)$ -обмотка косы β определяется как коса, для которой соответствующее зацепление получено из L заменой каждого L_j на зацепление в трубчатой окрестности зацепления L_j , задаваемое косой β_j . Например, коса β из теоремы В есть $(\beta_0, 1)$ -обмотка косы $\sigma_1^2 \in B_2$. Будем говорить, что коса i -положительна, если она является произведением кос вида $\beta_0 \sigma_i \beta_1$, где β_0, β_1 – слова, составленные из $\sigma_{i+1}^{\pm 1}, \dots, \sigma_{n-1}^{\pm 1}$. Тогда представляется правдоподобным, что теорема В есть частный случай следующего более общего факта.

ГИПОТЕЗА. Если любая коса, сопряженная косе β , 1-положительна и β' – обмотка косы β , то любая коса, сопряженная косе β' , 1-положительна.

1. Доказательство теоремы В. Пусть $D \subset \mathbb{C}$ – замкнутый единичный диск и $X_n = \{x_0, \dots, x_{n+1}\}$, где $-1 = x_0 < x_1 < \dots < x_n < x_{n+1} = 1$ – вещественные в D . *Геометрическая коса* – это набор из n гладких непересекающихся кривых (называемых *нитями*) в цилиндре $D \times [0, 1]$ таких, что проекция каждой нити на $[0, 1]$ есть диффеоморфизм и множество концов всех нитей совпадает с $X_n \times \{0, 1\}$. *Косой* называется класс эквивалентности геометрических кос относительно изотопий цилиндра $D \times [0, 1]$, неподвижных на $D \times \{0, 1\}$.

Пусть p – проекция $(z, t) \mapsto (\operatorname{Re} z, t)$. Геометрическая коса находится в *общем положении*, если проекции нитей трансверсальны между собой и t -координаты их пересечений различны. Стандартная образующая $\sigma_i \in B_n$ и обратный к ней элемент изображены на рис. 1. Рисунок для $\alpha \cdot \beta$, где $\alpha, \beta \in B_n$, получается, если рисунок косы β приставить сверху к рисунку косы α . Таким образом, геометрическая коса B в общем положении определяет слово из стандартных образующих $\sigma_1^{\pm 1}, \dots, \sigma_{n-1}^{\pm 1}$, в котором каждая буква отвечает двойной точке множества $p(B)$.

Рис. 1

Пусть β_0, β – косы из теоремы В. Тогда геометрическая коса B , представляющая косу β , обладает следующим свойством. Существует гладкая поверхность $C \subset (D \times [0, 1]) \setminus B$, расслоенная на гладкие окружности $C_t \subset \operatorname{Int} D \times \{t\}$, $t \in [0, 1]$, такая, что точки $x_2, \dots, x_n$ лежат внутри C_0 , точка x_1 лежит вне C_0 и окружность C_0 отображается на C_1 при диффеоморфизме $D \times \{0\} \rightarrow D \times \{1\}$, $(z, 0) \mapsto (z, 1)$.

Обозначим через T полноторие, полученное из $D \times [0, 1]$ отождествлением $D \times \{0\}$ и $D \times \{1\}$. Мы будем одинаково обозначать подмножества в $D \times [0, 1]$ и их образы в T . Пусть S – компонента геометрической косы B , соответствующая первой нити, т.е. компонента, проходящая через точку $(x_1, 0)$. Тогда образ поверхности C в T есть замкнутая поверхность, гомеоморфная тору, охватывающая $B \setminus S$, причем S имеет индекс зацепления $+1$ с тором C в следующем смысле. Пусть $A \subset T$ – кольцо такое, что одна компонента края ∂A изотопна на ∂T отрезку $y \times [0, 1]$, $y \in \partial D$, а другая компонента края ∂A лежит на C . Тогда индекс зацепления S и C определяется как индекс пересечения S и A (здесь и далее мы оставляем читателю заботиться об ориентациях).

Пусть α – любая коса, и положим $\beta' = \alpha\beta\alpha^{-1}$. Нам надо доказать, что $\beta' > 1$ в право-инвариантном порядке. Согласно результатам Деорнуа [1]–[3] каноническая форма любой неположительной косы – это слово из $\sigma_1^{\pm 1}, \dots, \sigma_{n-1}^{\pm 1}$, не содержащее $\sigma_1^{\pm 1}$. Таким образом, чтобы доказать, что $\beta' > 1$, достаточно убедиться в том, что каждое слово, представляющее γ , содержит $\sigma_1^{\pm 1}$. Рассмотрим произвольное слово w , представляющее β' , и пусть B' – соответствующая геометрическая коса в общем положении. B' получена из B изотопией полнотория T , так как β' и β сопряжены. Обозначим через C' и S' образы C и S при этой изотопии. Индекс зацепления не меняется при изотопиях, поэтому индекс зацепления S' и C' в вышеуказанном смысле равен $+1$.

Будем предполагать, что поверхность C' минимальна: мы представляем себе это так, что B' сделано из жесткой проволоки, а C' – резиновая пленка, отделяющая S' от $B' \setminus S'$. Более формально это означает следующее. При $t \in [0, 1]$ обозначим через D_t диск $D \times \{t\}$, и пусть B'_t (соответственно S'_t, C'_t) – пересечение B' (соответственно S', C')

с D_t . После того, как геометрическая коса B' зафиксирована, мы выберем $\varepsilon > 0$. Если ε достаточно мало, то при любом $t \in [0, 1]$ можно предполагать, что C'_t является C^1 -гладкой окружностью в D_t , удовлетворяющей тому условию, что $(C'_t \cup B'_t) \cap U_\varepsilon(z)$ является связным подмножеством кривой C'_t при всех $z \in C'_t$, где $U_\varepsilon(z)$ обозначает открытый диск радиуса ε с центром z . Мы можем также предполагать, что C'_t при всех t имеет минимальную длину среди всех замкнутых кривых своего гомотопического класса, удовлетворяющих этому условию. Тогда каждая кривая C'_t есть объединение отрезков прямых и дуг окружностей радиусов $\varepsilon, 2\varepsilon, \dots$ с центрами в точках множества B'_t .

При каждом $t \in [0, 1]$ положим $x_t = \min\{\operatorname{Re} z \mid (z, t) \in B'_t \setminus S'_t\}$, $L_t = \{(z, t) \in D_t \mid \operatorname{Re} z = x_t\}$ и обозначим через A_t нижнюю компоненту связности множества $L_t \setminus (C'_t \cap L_t)$. Пусть A° – замыкание множества $\bigcup_{t \in [0, 1]} A_t$. Тогда $p|_{A^\circ}$ является локально-тривиальным расслоением всюду, кроме конечного множества точек $t_1, \dots, t_k$, каждая из которых расположена вблизи от двойной точки проекции $p(B' \setminus S')$, отвечающей вхождению $\sigma_1^{\pm 1}$ в слово w . Поведение слоев проекции $p|_{A^\circ}$ возле точки $t_j, j = 1, \dots, k$, изображено на рис. 2, где $\delta > 0$ (соответственно $\delta < 0$) отвечает вхождению σ_1^{+1} (соответственно σ_1^{-1}).

Рис. 2

Обозначим через a_j отрезок $(A^\circ \cap D_{t_j}) \setminus A_{t_j}$ (изображенный пунктиром на рис. 2). Обозначим через A_j^* ту компоненту множества $D_{t_j} \setminus (C'_{t_j} \cup a_j)$, которая расположена справа от a_j (заштрихована на рис. 2), и пусть $A = A^\circ \cup A^*$, где $A^* = A_1^* \cup \dots \cup A_k^*$.

Вычислим индекс зацепления S' и C' . Он равен индексу пересечения S' и A . Мы имеем $S' \cap A = (S' \cap A^\circ) \cup (S' \cap A^*)$. Точки из $S' \cap A^\circ$ отвечают тем вхождениям $\sigma_1^s, s = \pm 1$, в слово w , для которых соответствующая двойная точка проекции $p(B')$ является точкой пересечения кривых $p(S')$ и $p(B' \setminus S')$. Точки из $S' \cap A^*$ отвечают тем вхождениям $\sigma_1^s, s = \pm 1$, в слово w , которые соответствуют двойным точкам проекции $p(B' \setminus S')$ (замечим, что каждое A_j^* должно содержать точку из $S' \cap D_{t_j}$, потому что C' минимальна). В обоих случаях вклад точки пересечения в индекс зацепления равен s . Поскольку индекс зацепления равен $+1$, мы видим, что любое слово, представляющее β' , должно включать в себя σ_1^{+1} . Теорема В доказана.

2. Геометрическая интерпретация право-инвариантного порядка. Все отображения, рассматриваемые ниже, будут кусочно гладкими. Пусть D и $X_n = \{x_0, x_1, \dots, x_{n+1}\}$ – обозначают то же, что и в п. 1. Группу кос B_n можно естественно отождествить с группой классов отображений пары (D, X_n) , которая по определению есть

группа гомеоморфизмов $(D, X_n) \rightarrow (D, X_n)$, тождественных на ∂D с точностью до гомеоморфизмов, изотопных тождественному отображению. Класс $[\gamma] \in B_n$ гомеоморфизма γ однозначно определен кривой $\Gamma := \gamma([-1, 1])$. Следуя [4], назовем Γ *криволинейной диаграммой* (curve diagram) косы $[\gamma]$. Криволинейная диаграмма косы σ_i имеет вид $[-1, x_{i-1}] \cup \Gamma_+ \cup [x_i, x_{i+1}] \cup \Gamma_- \cup [x_{i+2}, 1]$, где Γ_+ – путь из x_{i-1} в x_{i+1} по верхнему полудиску и Γ_- – путь из x_i в x_{i+2} по нижнему полудиску. Соглашение о порядке умножения проиллюстрировано на рис. 3 (мы воспроизводим его из [4]).

Рис. 3. Криволинейные диаграммы кос 1 , σ_1 и $\sigma_1\sigma_2^{-1}$

Пусть $\Gamma = \gamma([-1, 1])$ – криволинейная диаграмма. Обозначим $\gamma([x_i, x_{i+1}])$ через Γ_i . Будем говорить, что криволинейная диаграмма Δ *трансверсальна* к Γ , если для каждой Γ_i либо $\Gamma_i \subset \Delta$, либо Γ_i трансверсальна к Δ .

Пусть Δ трансверсальна к Γ . Компонента множества $D \setminus (\Gamma \cup \Delta)$ называется *двуугольником между Γ и Δ* , если она гомеоморфна открытому диску и ограничена одним открытым отрезком кривой $\Gamma \setminus X_n$, одним открытым отрезком кривой $\Delta \setminus X_n$ и двумя точками. Будем говорить, что пара (Γ, Δ) *редуцирована*, если нет двуугольников между Γ и Δ .

Рис. 4

Любую пару криволинейных диаграмм (Γ, Δ) можно редуцировать за конечное число элементарных преобразований, изображенных на рис. 4, где Γ изображена сплошной линией, а Δ – пунктирной. Каждое элементарное преобразование уменьшает на 1 число двуугольников.

Право-инвариантный порядок на группе кос можно описать в терминах криволинейных диаграмм следующим образом (см. [4]). Пусть косы γ, δ заданы трансверсальными друг другу криволинейными диаграммами Γ, Δ . Предположим, что (Γ, Δ) редуцирована. Множество $D \setminus \Gamma$ состоит из двух компонент. Та компонента, которая содержит $\sqrt{-1}$, называется *верхней*. Предположим, что Γ и Δ совпадают на дуге, идущей из -1 в x_i (возможно, $i = 0$), и не совпадают после x_i . Пусть a – компонента множества $\Delta \setminus (\Delta \cap \Gamma)$, начинающаяся в x_i . Тогда $\delta > \gamma$, если и только если a лежит в верхней части $D \setminus \Gamma$. Это значит, что двигаясь вдоль Δ из -1 в 1 , мы идем вдоль Γ до точки x_i , а затем сворачиваем влево.

3. Доказательство теоремы А. Поскольку все образующие сопряжены между собой, достаточно доказать, что $\gamma\sigma_1\gamma^{-1} > 1$ для всех $\gamma \in B_n$. В силу право-инвариантности это равносильно тому, что $\gamma\sigma_1 > \gamma$.

Пусть γ – произвольная коса из B_n . Нам надо доказать, что $\delta > \gamma$, где $\delta = \gamma\sigma_1$. Пусть Γ – криволинейная диаграмма косы γ . Пусть $I = [-1, 1]$, это криволинейная диаграмма единичной косы. Предположим, что Γ трансверсальна к I и пара (Γ, I) редуцирована. Обозначим ε -окрестность отрезка $[x_1, x_2]$ через D_ε . Поскольку (Γ, I) редуцирована, при достаточно малом ε пара $(D_\varepsilon, D_\varepsilon \cap \Gamma)$ изотопна одной из нарисованных на рис. 5 и выполнено следующее условие:

(*) если две точки из $\Gamma \cap \partial D_\varepsilon$ соседние в смысле циклического порядка вдоль окружности ∂D_ε , то их нельзя соединить дугой из $\Gamma \setminus D_\varepsilon$, не содержащей точек из X_n .

Рис. 5

Рис. 6

Кривые $D_\varepsilon \cap \Gamma$ на рис. 5 можно продеформировать в кривые, изображенные сплошной линией на рис. 6. Криволинейная диаграмма Δ_ε косы $\delta := \gamma\sigma_1$ получается из Γ заменой фрагмента $D_\varepsilon \cap \Gamma$ на кривые, изображенные на рис. 6 пунктиром. Диаграмма Δ_ε еще не трансверсальна к Γ . Пусть Δ получена из Δ_ε применением преобразования, показанного на рис. 7, в каждой из тех компонент множества $\Gamma \setminus (D_\varepsilon \cup X_n)$, у которых один из концов лежит на ∂D_ε . Диаграмма Δ уже трансверсальна к Γ .

Рис. 7

Если имеет место случай, показанный на рис. 5.А, то (Γ, Δ) редуцирована и требуемое неравенство $\delta > \gamma$ непосредственно вытекает из результата [4], сформулированного в п. 1. Поэтому мы будем предполагать, что имеет место один из случаев рис. 5.В_k.

$\Gamma \cup \Delta$ разбивает D_ε на несколько криволинейных многоугольников. Среди них $2k + 2$ треугольников и $2k + 2$ пятиугольников (четырехугольников при $k = 0$) примыкают к окружности ∂D_ε . Обозначим их соответственно через $T_i, P_i, i = 1, \dots, 2k + 2$. Скажем,

что треугольник T_i *плохой*, если он получился из треугольника на рис. 6, у которого стороны, лежащие на ∂D_ε , соединены вне D_ε дугой диаграммы Γ . По (*) эта дуга должна содержать точку из X_n . Присоединяя область, ограниченную этой дугой, к плохому треугольнику, мы получаем двуугольник между Γ и Δ , причем все двуугольники между Γ и Δ получаются таким способом.

Рис. 8

Пусть Δ' получена из Δ применением преобразования, показанного на рис. 8, к каждому плохому треугольнику. Поскольку плохие треугольники не могут быть соседними, эти преобразования независимы. Покажем, что (Γ, Δ') редуцирована. Действительно, при $k = 0$ это очевидно (см. рис. 8). При $k > 0$ появляется только три новых многоугольника: Q' , P'_2 , и $P_1 \cup T_2$ (см. рис. 8). Ни один из них не может содержаться в двуугольнике между Γ и Δ' .

Мы видим на рис. 8, что Δ' была получена из Δ изменением только тех отрезков Δ , у которых оба конца лежат в D_ε . Однако точка x_i , в которой Δ' впервые расходится с Γ , лежит на отрезке, начинающемся в x_0 и не входящем в D_ε . Следовательно, Δ' совпадает с Δ возле x_i . Но возле x_i кривая Δ расположена относительно Γ , как на рис. 7. Значит, $\delta > \gamma$ согласно п. 1. Теорема А доказана.

СПИСОК ЦИТИРОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Dehornoy P. Braid groups and left distributive operations // Trans. Amer. Math. Soc. 1994. V. 343. P. 115–150.
- [2] Dehornoy P. From large cardinals to braids via distributive algebra // J. Knot Theory and Its Ramifications. 1995. V. 4. P. 33–79.
- [3] Dehornoy P. A fast method of comparing braids // Adv. in Math. 1997. V. 125. P. 200–235.
- [4] Fenn R., Greene M. T., Rolfsen D., Rourke C., Wiest B. Ordering the braid group // Pacific J. Math. 1999. V. 191. P. 49–74.
- [5] Burckel S. The well-ordering on positive braids // J. Pure Appl. Algebra. 1997. V. 120. P. 1–17.
- [6] Laver R. Braid group actions on left distributive structures and well-orderings in the braid groups // J. Pure Appl. Algebra. 1996. V. 108. P. 81–98.
- [7] Wiest B. Dehornoy's ordering of the braid groups extends the subword ordering // Pacific J. Math. 1999. V. 191. P. 183–188.
- [8] Rudolph L. Algebraic functions and closed braids // Topology. 1983. V. 22. P. 191–202.
- [9] Rudolph L. Some knot theory of complex plane curves // Noeuds, Tresses et Singularités. Mono. № 31, L'Ens. Math., 1983. P. 99–122.
- [10] Orevkov S. Yu. Link theory and oval arrangements of real algebraic curves // Topology. 1999. V. 38. P. 779–810.