Math-Net.Ru

Общероссийский математический портал

И. Я. Новиков, С. Б. Стечкин, Основы теории всплесков, *УМН*, 1998, том 53, выпуск 6, 53–128

DOI: <https://doi.org/10.4213/rm89>

Использование Общероссийского математического портала Math-Net.Ru подразумевает, что вы прочитали и согласны с пользовательским соглашением

<http://www.mathnet.ru/rus/agreement>

Параметры загрузки:

IP: 54.197.217.227

26 апреля 2023 г., 12:50:06

УДК 517.5

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВСПЛЕСКОВ

И. Я. Новиков, С. Б. Стечкин

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	54
2. Обозначения и определения	54
3. Прототипы всплесков в работах Лузина и Кальдерона	57
4. Преобразование Габора	59
5. Оконное преобразование Фурье	61
6. Интегральное всплесковое преобразование	62
7. Двоичные всплески и формулы обращения	65
8. Фреймы	67
9. Всплесковые ряды	69
10. Система Хаара на прямой	71
11. Кратномасштабный анализ в $L^2(\mathbb{R})$	74
12. Система Уиттакера–Шеннона–Котельникова	80
13. Константы неопределенности	81
14. Всплески Мейера	81
15. Всплески Лемари–Бэтла и Стремберга	83
16. Ортогональные всплески с компактным носителем	86
17. Быстрые алгоритмы	89
18. Полуортогональные сплайн-всплески с компактным носителем	92
19. Регулярные КМА в $L^2(\mathbb{R}^n)$	94
20. Неравенства Бернштейна	96
21. Регулярные КМА и полиномы	98
22. КМА в пространствах Соболева	104
23. Операторы $Q_j = P_{j+1} - P_j$	107
24. Пространства Бесова	111
25. Проекторы P_j и псевдодифференциальные операторы	112
26. Всплесковая характеристика пространств Гёльдера $\mathbb{C}^s$, Соболева W_2^s и Бесова $B_p^{s,q}$	115
27. Всплесковая характеристика пространств $H^1(\mathbb{R}^n)$ и ВМО	117
28. Всплесковая характеристика пространств $L^p(\mathbb{R}^n)$ и $W_p^s(\mathbb{R}^n)$	121
29. Периодические всплески	123
Список литературы	127

1. Введение. Всплеском, в самом общем виде, называют определенную на числовой оси функцию ψ , имеющую нулевое среднее и достаточно быстрое убывание на бесконечности. Термин “всплеск” предложен К. И. Осколковым в качестве эквивалента английского термина wavelet (фр. – ondelette), что буквально переводится как маленькая (имеется в виду продолжительность) волна, волночка. Термин “всплеск” лучше отражает суть дела, так как упомянутые выше свойства означают, что функция ψ представляет собой затухающее колебание. Всплески используются или в качестве ядра интегрального преобразования

$$(1.1) \quad (W_\psi f)(a, b) = \frac{1}{\sqrt{a}} \int_{\mathbb{R}} f(t) \psi\left(\frac{t-b}{a}\right) dt, \quad a, b \in \mathbb{R}, \quad a > 0;$$

или в качестве генерирующей функции для построения базиса при помощи дилатаций, т.е. сжатий с сохранением нормы в $L^2(\mathbb{R})$: $\psi_j(t) := \psi_{j0}(t) := 2^{j/2} \psi(2^j t)$, $j \in \mathbb{Z}$, и сдвигов $\psi_{jk}(t) := \psi_j(t - k2^{-j}) = 2^{j/2} \psi(2^j t - k)$, $k \in \mathbb{Z}$.

Теория всплесков лежит на пересечении чистой математики, вычислительной математики, преобразования сигналов и изображений. Всплесковый анализ находит все более широкое применение в различных областях науки, так как он дает более подробную информацию о сигнале, изображении или операторе, чем стандартный анализ Фурье. Интегральное всплесковое преобразование дает одновременно локальную информацию о функции и о ее преобразовании Фурье, причем для анализа высокочастотных составляющих функции – локализация более сильная (для повышения точности), а для низкочастотных – локализация более слабая (для получения полной информации). Всплесковые ряды очень удобны для приближенных вычислений, поскольку количество операций, необходимых для вычисления коэффициентов разложения, так же как и количество операций для восстановления функции по ее всплесковым коэффициентам, пропорционально количеству отсчетов функции. Перечисленные особенности всплесков делают их очень популярными в самых различных приложениях: при анализе свойств сейсмических и акустических сигналов (именно здесь впервые возник термин wavelet [1]); при обработке и синтезе различных сигналов, например речевых; при анализе изображений; для изучения турбулентных полей; для сжатия больших объемов информации и т. д.

Основными монографиями о всплесках являются [2]–[4].

На русском языке литературы по всплескам крайне мало. Отметим недавний обзор Н. М. Астафьевой [5] и предыдущую статью авторов [6].

2. Обозначения и определения.

$\|f\|_p = \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^p dx \right)^{1/p}$ – норма в пространстве $L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p < \infty$.

κ_e – характеристическая функция множества e .

$|e|$ – мера Лебега множества $e \subset \mathbb{R}^n$.

Модули непрерывности: $\omega(h, f) := \sup_{|x-y|<h} |f(x) - f(y)|$;
для $l \in \mathbb{N}$ l -й модуль непрерывности определяется формулой:

$$\omega_l(h, f) := \sup_{|y|<h} \sup_x |\Delta_y^l(x)|,$$

где $\Delta_y^l(x, f) := \sum_{j=0}^l (-1)^{l-j} \binom{l}{j} f(x + jy)$.

$\langle f, g \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} f(t) \overline{g(t)} dt$ – скалярное произведение.

$\mathbb{R}_+^{n+1} := \{(x, t) : x \in \mathbb{R}^n, t > 0\}$ – верхнее полупространство.

$[x_k]_k$ – замыкание линейной оболочки $\{x_k\}_k$ в рассматриваемом пространстве.

ОНБ – ортонормированный базис.

$C(A)$ – пространство функций, непрерывных на A .

$C^m(A)$ – пространство функций, m раз непрерывно дифференцируемых на A .

$D(\mathbb{R}^n)$ – пространство бесконечно дифференцируемых функций с компактным носителем.

$S(\mathbb{R}^n)$ – пространство Шварца бесконечно дифференцируемых быстро убывающих на бесконечности функций.

Преобразование Фурье функции $f \in S(\mathbb{R}^n)$ определяется формулой

$$(2.1) \quad \widehat{f}(\omega) := \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i\langle x, \omega \rangle} f(x) dx, \quad \omega \in \mathbb{R}^n,$$

где $\langle x, \omega \rangle := \sum_1^n x_k \omega_k$. Тогда

$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} e^{i\langle x, \omega \rangle} \widehat{f}(\omega) d\omega, \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

и

$$(2\pi)^n \int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{f}(\omega)|^2 d\omega = \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^2 dx \quad (\text{тождество Планшереля}).$$

Для мультииндекса $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ $\partial^\alpha := (\partial/\partial x_1)^{\alpha_1} + \dots + (\partial/\partial x_n)^{\alpha_n}$ и $|\alpha| := \alpha_1 + \dots + \alpha_n$.

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \dots + \frac{\partial^2}{\partial x_n^2}.$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.1. Пусть $z := x + it$, где $(x, t) \in \mathbb{R}_+^2$. Функция $f(z)$ принадлежит пространству Харди $\mathbb{H}^p(\mathbb{R}_+^2)$, $0 < p < \infty$, если она голоморфна на $\mathbb{R}_+^2$ и

$$(2.2) \quad \sup_{t>0} \left(\int_{\mathbb{R}} |f(x + it)|^p dx \right)^{1/p} < \infty.$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.2. Ядро Пуассона на $\mathbb{R}_+^{n+1}$ определяется формулой

$$p_a(x) := \pi^{-(n+1)/2} \Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right) \frac{a}{(|x|^2 + a^2)^{(n+1)/2}}, \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad a > 0.$$

Интегралом Пуассона называют свертку функции f с ядром p_a :

$$F(x, a) := \int_{\mathbb{R}^n} p_a(x - y) f(y) dy, \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad a > 0.$$

Функция F является гармонической на $\mathbb{R}_+^{n+1}$ и совпадает на границе $\mathbb{R}_+^{n+1}$ с f .

Некасательная максимальная функция равна $F^*(x) := \sup_{\gamma(x)} |F(y, a)|$, где $\gamma(x) := \{(y, a) \in \mathbb{R}_+^n : a > |y - x|\}$ – конус Лузина.

Вещественные классы Харди $H^p(\mathbb{R}^n)$, $p > 0$, состоят из локально интегрируемых функций f , для которых $\int_{\mathbb{R}^n} \frac{|f(x)| dx}{1 + |x|^{n+1}} < \infty$ и некасательная максимальная функция F^* принадлежит $L^p(\mathbb{R}^n)$, $\|f\|_{H^p(\mathbb{R}^n)} = \|F^*\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.3. Функция $f \in L^2_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ принадлежит пространству $\text{BMO}(\mathbb{R}^n)$, если она имеет ограниченные средние осцилляции (Bounded Mean Oscillations)

$$\sup_B \left(\frac{1}{|B|} \int_B |f(x) - f_B|^2 dx \right)^{1/2} = \|f\|_{\text{BMO}} < \infty,$$

где $\sup$ берется по всем шарам $B \subset \mathbb{R}^n$ и $f_B := \frac{1}{|B|} \int_B f(x) dx$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.4. Преобразованием Гильберта Hu действительной функции u называют действительную функцию v такую, что функция $u(x) + iv(x)$ является следом на $\mathbb{R}$ голоморфной функции $f(x + iy)$. В терминах преобразования Фурье это эквивалентно тому, что $\widehat{v}(\xi) = -i \operatorname{sign}(\xi) \widehat{u}(\xi)$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.5. Линейный оператор, определенный и ограниченный в $L^2(\mathbb{R}^n)$, называется оператором Кальдерона–Зигмунда, если существует функция $K(x, y)$, определенная при $x, y \in \mathbb{R}^n$, $x \neq y$, такая, что для некоторого $\alpha > 0$

$$\begin{aligned} |K(x, y)| &\leq \frac{C}{|x - y|^n}; \\ |K(x, y) - K(x, y')| &\leq C \frac{|y - y'|^\alpha}{|x - y|^{n+\alpha}}, \quad |y - y'| \leq \frac{1}{2}|x - y|; \\ |K(x, y) - K(x', y)| &\leq C \frac{|x - x'|^\alpha}{|x - y|^{n+\alpha}}, \quad |x - x'| \leq \frac{1}{2}|x - y|; \end{aligned}$$

и для любой функции $f \in D(\mathbb{R}^n)$ и для любого $x \notin \operatorname{supp} f$ $Tf(x) = \int_{\mathbb{R}^n} K(x, y)f(y) dy$.

ТЕОРЕМА 2.1. Пусть T – оператор Кальдерона–Зигмунда. Тогда при $1 < p < \infty$ $\|Tf\|_p \leq C_p \|T\| \|f\|_p$, где $\|T\| := \|T\|_2 + \inf C$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.6. Если $s = 0$, то пространство Соболева $W_2^s(\mathbb{R}^n)$ совпадает с $L_2(\mathbb{R}^n)$. Для $s \in \mathbb{N}$ функция f принадлежит $W_2^s(\mathbb{R}^n)$, если она принадлежит $L_2(\mathbb{R}^n)$ вместе со всеми своими производными $\partial^\alpha f$ (в смысле обобщенных функций) с $|\alpha| \leq s$.

Известно, что последнее эквивалентно $\int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\omega|^2)^s |\widehat{f}(\omega)|^2 d\omega < \infty$, что принимается в качестве определения при произвольном $s \geq 0$.

Пространств $W_2^s(\mathbb{R}^n)$ для $s < 0$ определяется как двойственное к $W_2^{-s}(\mathbb{R}^n)$. Применяя тождество Парсеваля, легко получить, что умеренное распределение S принадлежит $W_2^s(\mathbb{R}^n)$ тогда и только тогда, когда его преобразование Фурье $\widehat{S}$ принадлежит $L^2_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ и удовлетворяет условию $\int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{S}(\omega)|^2 (1 + |\omega|^2)^s d\omega < \infty$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7. Пусть $1 \leq p \leq \infty$. Если $s \geq 0$ и s – целое, то пространство W_p^s состоит из функций f таких, что f и все ее производные $\partial^\alpha f$ с $|\alpha| \leq s$ принадлежат $L^p(\mathbb{R}^n)$. Это эквивалентно условию $(I - \Delta)^{s/2} f \in L^p(\mathbb{R}^n)$. Последнее условие определяет W_p^s для произвольного действительного s .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.8. Пусть $1 \leq p, q \leq \infty$, $s > 0$ и $s < m \in \mathbb{N}$. Функция f принадлежит пространству Бесова $B_p^{s,q}$, если $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ и существуют последовательность положительных чисел ε_j из $l^q(\mathbb{N})$ и последовательность функций f_j из $L^p(\mathbb{R}^n)$ такие, что

$$(2.3) \quad \|f - f_j\|_p \leq \varepsilon_j 2^{-js}, \quad j \in \mathbb{N},$$

и

$$(2.4) \quad \|\partial^\alpha f_j\|_p \leq \varepsilon_j 2^{(m-s)j}$$

для любого мультииндекса $\alpha \in \mathbb{N}^n$ с $|\alpha| = m$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2.9. При $0 < s < 1$ пространство Гёльдера $\mathbb{C}^s(\mathbb{R}^n)$ состоит из функций $f \in C(\mathbb{R}^n)$ таких, что $\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |f(x)| < \infty$ и $\sup_{h>0} \omega(h)/h^s < \infty$.

$\mathbb{C}^1(\mathbb{R}^n)$ – это класс Зигмунда:

$$\mathbb{C}^1(\mathbb{R}^n) := \left\{ f \in C(\mathbb{R}^n) : \sup_{x \in \mathbb{R}^n} |f(x)| < \infty, \sup_{h>0} \frac{\omega_2(h, f)}{h} < \infty \right\}.$$

Для $s \in (m, m+1]$, $m \in \mathbb{N}$,

$$\mathbb{C}^s(\mathbb{R}^n) := \{f \in C^m(\mathbb{R}^n) : \forall |\alpha| \leq m \quad \partial^\alpha f \in \mathbb{C}^{s-m}\}.$$

3. Прототипы всплесков в работах Лузина и Кальдерона. Одно из первых появлений всплесков в математическом анализе относится к тридцатым годам. Хорошо известная характеристика пространств $\mathbb{H}^p$ в терминах интеграла площадей или функции Лузина [7] содержит прототипы всплесков (см. [8]).

Работа Н. Н. Лузина [7] посвящена анализу и синтезу функций из $\mathbb{H}^p(\mathbb{R}_+^2)$ при помощи интегрального представления

$$(3.1) \quad f(x) = \frac{2i}{\pi} \iint_{\mathbb{R}_+^2} t f'(y+it) \frac{dy dt}{(x-y+it)^2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Представлению (3.1) можно придать всплесковый вид (1.1). Рассмотрим функцию $\psi(t) := (t+i)^{-2}$, $t \in \mathbb{R}$, которая осциллирует (т.е. $\int_{\mathbb{R}} \psi(t) dt = 0$), регулярна и локализована. Благодаря этим свойствам родоначальники всплесков А. Гроссман (A. Grossman) и Ж. Морле (J. Morlet) [1] назвали ψ – wavelet, буквально маленькая (имеется в виду продолжительность) волна.

Рис. 1. График $\text{Re}(\psi(t))$

Рис. 2. График $\text{Im}(\psi(t))$

Рассмотрим $\psi_{a,b}(t) := a^{-1/2}\psi(\frac{t-b}{a}) = a^{3/2}(t-b+ia)^{-2}$ для $a > 0, b \in \mathbb{R}$. Определим

$$(3.2) \quad (W_\psi f)(a, b) := \langle f, \psi_{a,b} \rangle = 2\pi i a^{3/2} f'(b+ia).$$

В силу (3.1) функция f представима в виде суперпозиции всплесков $\psi_{a,b}(t)$ с коэффициентами $(W_\psi f)(a, b)$. Для любой функции $f \in \mathbb{H}^2(\mathbb{R}_+^2)$ имеем

$$(3.3) \quad \begin{aligned} f(x) &= \frac{2i}{\pi} \iint_{\mathbb{R}_+^2} a f'(b+ia) \frac{db da}{(x-b+ia)^2} \\ &= \frac{1}{\pi^2} \int_0^\infty \left[\int_{\mathbb{R}} (W_\psi f)(a, b) \psi_{a,b}(x) db \right] \frac{da}{a^2}. \end{aligned}$$

Представление (3.1) позволяет охарактеризовать функции из $\mathbb{H}^p(\mathbb{R}_+^2)$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3.1. Интегралом площадей или функцией Лузина называется

$$(3.4) \quad (Sf)(x) = \left(\iint_{\gamma(x)} |f'(y+it)|^2 dy dt \right)^{1/2}, \quad x \in \mathbb{R},$$

где $\gamma(x) = \{(y, t) \in \mathbb{R}^2 : t > |y - x|\}$ – конус Лузина.

ТЕОРЕМА 3.1. Пусть $0 < p < \infty$. Тогда $f \in \mathbb{H}^p(\mathbb{R}_+^2)$, если и только если $Sf \in L^p(\mathbb{R})$.

Для $1 < p < \infty$ это классический результат (см. [9], [10]). Для $0 < p \leq 1$ это результат А. Кальдерона [11].

Рассмотренные формулы обобщаются в тождестве Кальдерона [12].

Пусть $\psi \in L^1(\mathbb{R}^n)$, $\int_{\mathbb{R}^n} \psi(x) dx = 0$ и преобразование Фурье $\widehat{\psi}(\omega)$, $\omega \in \mathbb{R}^n$, удовлетворяет условию

$$(3.5) \quad \int_0^\infty |\widehat{\psi}(t\omega)|^2 \frac{dt}{t} = 1 \quad \text{для любых } \omega \neq 0.$$

Например, если ψ достаточно регулярна, локализована, имеет нулевое среднее и радиальна, то существует константа $c > 0$ такая, что $c\psi(x)$ удовлетворяет (3.5).

Положим $\psi_a(x) = a^{-n/2}\psi(\frac{x}{a})$ и $\psi_{a,b}(x) = a^{-n/2}\psi(\frac{x-b}{a})$. Следуя [1], определим

$$(3.6) \quad (W_\psi f)(a, b) := \langle f, \psi_{a,b} \rangle.$$

Тогда имеет место следующая формула восстановления:

$$(3.7) \quad f(x) = \int_0^\infty \left[\int_{\mathbb{R}^n} (W_\psi f)(a, b) \psi_{a,b}(x) db \right] \frac{da}{a^{n+1}}.$$

Эквивалентная формулировка для (3.7) имеет вид

$$(3.8) \quad I = \int_0^\infty Q_a Q_a^* \frac{da}{a^{n+1}},$$

где I – тождественный оператор, $Q_a(f) = f * \psi_a$ – оператор свертки, а Q_a^* – сопряженный к Q_a оператор. Тожество Кальдерона (3.8) имеет важные приложения в анализе классических функциональных пространств посредством условий, использующих модуль градиента гармонического продолжения (см. [9]). Например, для полугруппы Пуассона $P_a f(x) := F(x, a)$ (определение 2.2) оператор Q_a имеет вид $Q_a = -a(\partial/\partial a)P_a$.

В формулах (3.6) и (3.7) функции $\psi_{a,b}$, $b \in \mathbb{R}^n$, $a > 0$, используются так, как будто они образуют ортонормированный базис в $L^2(\mathbb{R}^n)$: коэффициенты разложения вычисляются по формуле (3.6), а представление функции f в терминах этих коэффициентов дается (3.7).

Можно заменить избыточное множество функций $\psi_{a,b}$, $b \in \mathbb{R}^n$, $a > 0$, на ортогональный базис ψ_λ , $\lambda \in \Lambda$, который конструируется по тем же алгебраическим правилам (путем сжатий и сдвигов). Ортонормированный базис ψ_λ , $\lambda \in \Lambda$, оказывается универсальным безусловным базисом для классических пространств функций и распределений.

4. Преобразование Габора. Другим предшественником всплесковых преобразований является преобразование Габора. Пусть функция f принадлежит $L^2(\mathbb{R})$ и $\hat{f}$ – ее преобразование Фурье (2.1). Для вычисления $\hat{f}(\omega)$ в любой точке ω в равной степени используются все значения f , поэтому $\hat{f}$ не отражает изменений частотных характеристик f по времени t . Кроме того, изменение функции f в сколь угодно малой окрестности произвольной точки t_0 приводит к изменению всего спектра.

Для исправления этих недостатков Л. Габор рассмотрел в [13] следующее преобразование. Пусть

$$(4.1) \quad g_\alpha(t) := \frac{1}{2\sqrt{\pi\alpha}} e^{-\frac{t^2}{4\alpha}},$$

где α – фиксированный параметр.

Рис. 3. График g_α , $\alpha = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$

Функция g_α используется в качестве так называемого временного окна. Преобразование Габора функции $f \in L^2(\mathbb{R})$ определяется формулой

$$(4.2) \quad (\Gamma_b^\alpha f)(\omega) := \int_{\mathbb{R}} (e^{-i\omega t} f(t)) g_\alpha(t - b) dt.$$

Ясно, что $(\Gamma_b^\alpha)(\omega)$ локализует преобразование Фурье вокруг точки $t = b$.

Так как $\int_{\mathbb{R}} g_\alpha(t - b) db = \int_{\mathbb{R}} g_\alpha(x) dx = 1$, то $\int_{\mathbb{R}} (\Gamma_b^\alpha f)(\omega) db = \widehat{f}(\omega)$, $\omega \in \mathbb{R}$. Таким образом, преобразование Габора разлагает преобразование Фурье на локальную спектральную информацию.

Приведем общее определение оконной функции. Функцию w называют оконной, если $w \in L^2(\mathbb{R})$ и $xw(x) \in L^2(\mathbb{R})$. Для количественной характеристики локализованности функции w используются следующие величины:

$$t^* := \frac{1}{\|w\|_2^2} \int_{\mathbb{R}} x |w(x)|^2 dx - \text{центр};$$

$$\Delta_w := \frac{1}{\|w\|_2^2} \left\{ \int_{\mathbb{R}} (x - t^*)^2 |w(x)|^2 dx \right\}^{1/2} - \text{радиус}.$$

Ширина функции w полагается равной двум радиусам. Легко вычислить, что $\Delta g_\alpha = \sqrt{\alpha}$.

Преобразование Габора можно интерпретировать следующим образом. Пусть $G_{b,\omega}^\alpha(t) := e^{i\omega t} g_\alpha(t - b)$.

Рис. 4. График $\text{Re}(G_{0,2\pi}^{0.5}(t))$

Рис. 5. График $\text{Im}(G_{0,2\pi}^{0.5}(t))$

Тогда

$$(4.3) \quad (\Gamma_b^\alpha f)(\omega) = \int_{\mathbb{R}} f(t) \overline{G_{b,\omega}^\alpha(t)} dt.$$

Преимущество (4.3) состоит в возможности применить тождество Планшереля. Действительно, $\widehat{G_{b,\omega}^\alpha}(\eta) = e^{-ib(\eta-\omega)} e^{-\alpha(\eta-\omega)^2}$. Поэтому

$$\begin{aligned} (\Gamma_b^\alpha f)(\omega) &= \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(\eta) e^{ib(\eta-\omega)} e^{-\alpha(\eta-\omega)^2} d\eta \\ &= \frac{e^{-ib\omega}}{2\sqrt{\pi\alpha}} \int_{\mathbb{R}} (e^{ib\eta} \widehat{f}(\eta)) g_{1/(4\alpha)}(\eta - \omega) d\eta = \frac{e^{-ib\omega}}{2\sqrt{\pi\alpha}} (\Gamma_\omega^{1/(4\alpha)} \widehat{f})(-b). \end{aligned}$$

Таким образом, преобразование Габора функции f с оконной функцией g_α в точке $t = b$ с точностью до множителя совпадает с преобразованием Габора функции $\widehat{f}$ с оконной функцией $g_{1/(4\alpha)}$ в точке $\eta = \omega$. Произведение ширины окна g_α на ширину окна $g_{1/(4\alpha)}$ равно 2. Декартово произведение $[b - \sqrt{\alpha}, b + \sqrt{\alpha}] \times [\omega - \frac{1}{2\sqrt{\alpha}}, \omega + \frac{1}{2\sqrt{\alpha}}]$ этих двух окон называют прямоугольным время-частотным окном. Ширина $2\sqrt{\alpha}$ временного окна называется шириной время-частотного окна, а ширина $1/\sqrt{\alpha}$ частотного окна называется высотой время-частотного окна. Отметим, что ширина время-частотного окна в преобразовании Габора не изменяется при наблюдении спектра на всех частотах.

Рис. 6. Окна Габора

5. Оконное преобразование Фурье. Преобразование Габора можно обобщить. Пусть

$$(5.1) \quad w \in L^2(\mathbb{R}) \text{ и } tw(t) \in L^2(\mathbb{R}).$$

Оконным преобразованием Фурье называется

$$(\widetilde{\Gamma}_b)(\omega) := \int_{\mathbb{R}} (e^{-i\omega t} f(t)) \overline{w(t-b)} dt.$$

Полагая

$$\begin{aligned} W_{b,\omega}(t) &:= e^{i\omega t} w(t-b), \\ V_{b,\omega}(\eta) &:= \frac{1}{2\pi} \widehat{W}_{b,\omega}(\eta) = \frac{e^{ib\omega}}{2\pi} e^{-ib\eta} \widehat{w}(\eta - \omega), \end{aligned}$$

имеем

$$(\widetilde{\Gamma_b})(\omega) := \int_{\mathbb{R}} f(t) \overline{W_{b,\omega}(t)} dt = \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(\eta) \overline{V_{b,\omega}(\eta)} d\eta.$$

Таким образом, оконное преобразование дает локальную информацию о f во временном окне $[t^* + b - \Delta_w, t^* + b + \Delta_w]$ и локальную информацию о $\widehat{f}$ в частотном окне $[\omega^* + \omega - \Delta_{\widehat{w}}, \omega^* + \omega + \Delta_{\widehat{w}}]$, где ω^* – центр $\widehat{w}$. Если w и $\widehat{w}$ удовлетворяют (5.1), то время-частотное окно $[t^* + b - \Delta_w, t^* + b + \Delta_w] \times [\omega^* + \omega - \Delta_{\widehat{w}}, \omega^* + \omega + \Delta_{\widehat{w}}]$ имеет постоянную ширину $2\Delta_w$ и постоянную площадь $4\Delta_w \Delta_{\widehat{w}}$.

Произведение $\Delta_w \Delta_{\widehat{w}}$ характеризует время-частотную локализацию w и называется константой неопределенности w . Напомним принцип неопределенности (см., например, [14]).

ТЕОРЕМА 5.1. Пусть $w \in L^2(\mathbb{R})$ удовлетворяет (5.1) вместе с $\widehat{w}$. Тогда $\Delta_w \Delta_{\widehat{w}} \geq \frac{1}{2}$. Более того, равенство достигается тогда и только тогда, когда $w(t) = ce^{iat} g_\alpha(t - b)$, где $c \neq 0$, $\alpha > 0$; $a, b \in \mathbb{R}$.

Таким образом, преобразование Габора имеет наименьшее время-частотное окно. В некоторых приложениях приходится использовать большие окна для получения дополнительных свойств, например, легкости вычислений.

Приведем формулу обращения для оконных преобразований Фурье.

ТЕОРЕМА 5.2. Пусть $w \in L^2(\mathbb{R})$, $\|w\|_2 = 1$, w и $\widehat{w}$ удовлетворяют (5.1). Тогда

$$\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \langle f, W_{b,\omega} \rangle \overline{\langle g, W_{b,\omega} \rangle} db d\omega = 2\pi \langle f, g \rangle.$$

Если x – точка непрерывности f , то

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} [e^{i\omega x} (\widetilde{\Gamma_b f})(\omega)] w(x - b) d\omega db.$$

Как уже отмечалось выше, в оконном преобразовании Фурье ширина окна не изменяется при изучении любой частотной полосы. Однако, частота прямо пропорциональна числу периодов в единицу времени, поэтому для локализации высокочастотных изменений естественно брать более узкое окно для увеличения точности вычислений, а для низкочастотных – более широкое для получения полной информации. Таким образом, оконное преобразование Фурье не применимо к изучению сигналов, содержащих как очень высокие, так и очень низкие частоты.

Данный недостаток исправляется в интегральном всплесковом преобразовании, время-частотное окно которого автоматически сужается при наблюдении высокочастотных изменений и расширяется для изучения низкочастотных.

6. Интегральное всплесковое преобразование.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6.1. Функцию $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ называют базовым всплеском, если она удовлетворяет условию:

$$C_\psi := \int_{\mathbb{R}} \frac{|\widehat{\psi}(\omega)|^2}{|\omega|} d\omega < \infty.$$

При помощи базового всплеска определяется интегральное всплесковое преобразование (ИВП) на $L^2(\mathbb{R})$:

$$(W_\psi f)(b, a) := |a|^{-1/2} \int_{\mathbb{R}} f(t) \overline{\psi\left(\frac{t-b}{a}\right)} dt, \quad f \in L^2(\mathbb{R}),$$

где $a, b \in \mathbb{R}$ с $a \neq 0$.

Полагая

$$(6.1) \quad \psi_{b,a}(t) := |a|^{-1/2} \psi\left(\frac{t-b}{a}\right),$$

имеем

$$(6.2) \quad (W_\psi f)(b, a) = \langle f, \psi_{b,a} \rangle.$$

В дальнейшем будем считать, что и ψ , и $\widehat{\psi}$ удовлетворяют (5.1). Тогда если центр и радиус ψ равны t^* и Δ_ψ соответственно, то функция $\psi_{b,a}$ является оконной с центром в $b + at^*$ и радиусом $a\Delta_\psi$. Значит, ИВП дает локальную информацию о функции f с временным окном $[b + at^* - a\Delta_\psi, b + at^* + a\Delta_\psi]$. Это окно сужается при малых значениях a и расширяется при больших.

Рассмотрим теперь

$$(6.3) \quad \frac{1}{2\pi} \widehat{\psi}_{b,a}(\omega) = \frac{|a|^{-1/2}}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-i\omega t} \psi\left(\frac{t-b}{a}\right) dt = \frac{a|a|^{-1/2}}{2\pi} e^{-ib\omega} \widehat{\psi}(a\omega)$$

и предположим, что центр и радиус функции $\widehat{\psi}$ равны ω^* и $\Delta_{\widehat{\psi}}$ соответственно. Полагая $\eta(\omega) := \widehat{\psi}(\omega + \omega^*)$, получаем оконную функцию η с центром в нуле и радиусом $\Delta_{\widehat{\psi}}$. Применяя тождество Планшереля к (6.2), имеем

$$(W_\psi f)(b, a) = \frac{a|a|^{-1/2}}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(\omega) e^{ib\omega} \overline{\eta\left(a\left(\omega - \frac{\omega^*}{a}\right)\right)} d\omega.$$

Ясно, что оконная функция $\eta(a(\omega - \frac{\omega^*}{a})) = \eta(a\omega - \omega^*) = \widehat{\psi}(a\omega)$ имеет радиус $\frac{1}{a}\Delta_{\widehat{\psi}}$.

Поэтому, с точностью до множителя $\frac{a|a|^{-1/2}}{2\pi}$ и линейного фазового сдвига $e^{ib\omega}$, ИВП $W_\psi f$ дает локальную информацию о $\widehat{f}$ с частотным окном

$$(6.4) \quad \left[\frac{\omega^*}{a} - \frac{1}{a}\Delta_{\widehat{\psi}}, \frac{\omega^*}{a} + \frac{1}{a}\Delta_{\widehat{\psi}} \right].$$

В дальнейшем будем считать центр ω^* функции $\widehat{\psi}$ положительным. Тогда окно (6.4) является частотной полосой (или октавой) с центральной частотой ω^*/a и шириной полосы $2\Delta_{\widehat{\psi}}/a$. Важно, что отношение

$$\frac{\text{центральная частота}}{\text{ширина}} = \frac{\omega^*/a}{2\Delta_{\widehat{\psi}}/a} = \frac{\omega^*}{2\Delta_{\widehat{\psi}}}$$

Рис. 7. Окона ИВП

не зависит от масштаба a .

Итак, для ИВП имеем прямоугольное время-частотное окно

$$[b + at^* - a\Delta_\psi, b + at^* + a\Delta_\psi] \times \left[\frac{\omega^*}{a} - \frac{1}{a}\Delta_{\widehat{\psi}}, \frac{\omega^*}{a} + \frac{1}{a}\Delta_{\widehat{\psi}} \right].$$

Отметим еще раз, что окно сужается для выявления высокочастотных явлений и расширяется для исследования низкочастотных.

Следующий результат показывает, как восстановить функцию по ее ИВП.

ТЕОРЕМА 6.1. Пусть ψ – базовый всплеск. Тогда для любых $f, g \in L^2(\mathbb{R})$

$$\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} [(W_\psi f)(b, a) \overline{(W_\psi g)(b, a)}] \frac{da}{a^2} db = C_\psi \langle f, g \rangle.$$

Более того, для любой $f \in L^2(\mathbb{R})$ и любой точки x , в которой f непрерывна,

$$f(x) = \frac{1}{C_\psi} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} [(W_\psi f)(b, a)] \psi_{b,a}(x) \frac{da}{a^2} db,$$

где $\psi_{b,a}$ определены в (6.1).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. В силу (6.3) и тождества Планшереля

$$(W_\psi f)(b, a) = \langle f, \psi_{b,a} \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(\omega) a |a|^{-1/2} e^{-ib\omega} \widehat{\psi}(a\omega) d\omega = \frac{1}{2\pi} \widehat{F}_a(b),$$

где $F_a(\omega) := a |a|^{-1/2} \widehat{f}(\omega) \widehat{\psi}(a\omega)$. Поэтому, опять используя тождество Планшереля, имеем

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} [(W_\psi f)(b, a) \overline{(W_\psi g)(b, a)}] \frac{da}{a^2} db &= \frac{1}{4\pi^2} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} \widehat{F}_a(b) \overline{\widehat{G}_a(b)} db \frac{da}{a^2} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \left\{ \widehat{f}(\omega) \overline{\widehat{g}(\omega)} \int_{\mathbb{R}} \frac{|\widehat{\psi}(a\omega)|^2}{|a|} da \right\} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} C_\psi \langle \widehat{f}, \widehat{g} \rangle = C_\psi \langle f, g \rangle. \end{aligned}$$

Второе утверждение теоремы следует из первого, если взять в качестве функций g гауссовские функции $g_\alpha(\cdot - x)$ (см. (4.1)) и устремить α к нулю.

ЗАМЕЧАНИЕ 6.1. Во всплесковых преобразованиях основную роль играет коммутативная локально компактная группа отображений $\mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ вида $g(x) = ax + b$, $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, $b \in \mathbb{R}$, $x \in \mathbb{R}$, с мерой Хаара $a^{-2} da db$. Т.П. Лукашенко [15] обобщил теорему 6.1 на произвольную коммутативную локально компактную группу.

При анализе физических сигналов рассматриваются только положительные частоты. Так как частота обратно пропорциональна параметру сжатия a : $\omega = \omega^*/a$, то в этом случае необходимо рассматривать только положительные a и восстанавливать сигнал по значениям $(W_\psi f)(b, a)$, $a > 0$. Для этого на базовый всплеск надо наложить дополнительное требование:

$$(6.5) \quad \int_0^\infty \frac{|\widehat{\psi}(\omega)|^2}{\omega} d\omega = \int_0^\infty \frac{|\widehat{\psi}(w)|^2}{w} dw = \frac{1}{2} C_\psi < \infty.$$

ТЕОРЕМА 6.2. Пусть базовый всплеск ψ удовлетворяет (6.5). Тогда для любых $f, g \in L^2(\mathbb{R})$

$$\int_0^\infty \left[\int_{-\infty}^\infty (W_\psi f)(b, a) \overline{(W_\psi g)(b, a)} db \right] \frac{da}{a^2} = \frac{1}{2} C_\psi \langle f, g \rangle.$$

Более того, для любой $f \in L^2(\mathbb{R})$ и любой точки x , в которой f непрерывна,

$$f(x) = \frac{2}{C_\psi} \int_0^\infty \left[\int_{\mathbb{R}} (W_\psi f)(b, a) \psi_{b,a}(x) db \right] \frac{da}{a^2},$$

где $\psi_{b,a}$ определены в (6.1).

7. Двоичные всплески и формулы обращения. При анализе сигналов частотную ось часто разбивают на дизъюнктные частотные полосы (или октавы). Рассмотрим двоичное разбиение: $(0, \infty) = \bigcup_{j=-\infty}^\infty (2^j \Delta_{\widehat{\psi}}, 2^{j+1} \Delta_{\widehat{\psi}}]$, где $\Delta_{\widehat{\psi}} > 0$ – радиус преобразования Фурье $\widehat{\psi}$ базового всплеска ψ . Мы, как обычно, предполагаем, что $\widehat{\psi}$ удовлетворяет (5.1). Заметим, что, не ограничивая общности, можно считать $\omega^* = 3\Delta_{\widehat{\psi}}$ (достаточно применить к ψ соответствующий фазовый сдвиг: $\psi^0(t) := e^{i\alpha t} \psi(t)$). Тогда при $a_j := 2^{-j}$ имеем

$$\left(\frac{\omega^*}{a_j} - \frac{1}{a_j} \Delta_{\widehat{\psi}}, \frac{\omega^*}{a_j} + \frac{1}{a_j} \Delta_{\widehat{\psi}} \right] = (2^{j+1} \Delta_{\widehat{\psi}}, 2^{j+2} \Delta_{\widehat{\psi}}].$$

Центральная частота этой полосы равна $\omega_j := \frac{\omega^*}{a_j} = 3 \times 2^j \Delta_{\widehat{\psi}}$.

При дополнительных предположениях на базовый всплеск ψ оказывается возможным восстановить функцию, используя значения ИВП $(W_\psi f)(b, a)$ только на дискретном множестве частот $\{\omega_j = 3 \times 2^j \Delta_{\widehat{\psi}}\}_{j \in \mathbb{Z}}$ (т.е. $a = a_j$, $j \in \mathbb{Z}$).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7.1. Функция $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ называется двоичным всплеском, если существуют две положительные константы A и B , $0 < A \leq B < \infty$, такие, что почти всюду (п.в.)

$$(7.1) \quad A \leq \sum_{j \in \mathbb{Z}} |\widehat{\psi}(2^{-j}\omega)|^2 \leq B.$$

Условие (7.1) называют условием устойчивости.

Пусть $f^-(x) := f(-x)$. Определим нормированное ИВП

$$(W_j^\psi f)(b) := 2^{j/2} (W_\psi f)(b, 2^{-j}) = 2^j (f * \overline{\psi^-(2^j \cdot)})(b).$$

Используя тождество Планшереля, легко показать, что (7.1) эквивалентно

$$A \|f\|_2^2 \leq \sum_{j \in \mathbb{Z}} \|W_j^\psi f\|_2^2 \leq B \|f\|_2^2, \quad f \in L^2(\mathbb{R}).$$

Следующий результат показывает, что двоичный всплеск всегда является базовым.

ТЕОРЕМА 7.1. Пусть ψ удовлетворяет (7.1). Тогда ψ является базовым всплеском и

$$A \ln 2 \leq \int_0^\infty \frac{|\widehat{\psi}(\omega)|^2}{\omega} d\omega, \quad \int_0^\infty \frac{|\widehat{\psi}(-\omega)|^2}{\omega} \leq B \ln 2.$$

Более того, если $A = B$, то

$$C_\psi := \int_{\mathbb{R}} \frac{|\widehat{\psi}(\omega)|^2}{|\omega|} d\omega = 2A \ln 2.$$

Для восстановления $f \in L^2(\mathbb{R})$ по значениям ИВП $(W_j^\psi f)(b, 2^{-j})$, $j \in \mathbb{Z}$, легче всего использовать другой двоичный всплеск ψ^* , определяемый в образах Фурье следующим образом:

$$\widehat{\psi^*}(\omega) := \frac{\widehat{\psi}(\omega)}{\sum_{k \in \mathbb{Z}} |\widehat{\psi}(2^{-k}\omega)|^2}.$$

Тогда

$$(7.2) \quad \begin{aligned} & \sum_{j \in \mathbb{Z}} \int_{\mathbb{R}} (W_j^\psi f)(b) \{2^j \psi^*(2^j(x-b))\} db \\ &= \sum_{j \in \mathbb{Z}} \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \widehat{(W_j^\psi f)}(\omega) \widehat{\psi^*}(2^{-j}\omega) e^{ix\omega} d\omega \\ &= \sum_{j \in \mathbb{Z}} \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(\omega) \overline{\widehat{\psi}(2^{-j}\omega)} \widehat{\psi^*}(2^{-j}\omega) e^{ix\omega} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(\omega) e^{ix\omega} d\omega = f(x). \end{aligned}$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 7.2. Функция $\tilde{\psi} \in L^2(\mathbb{R})$ называется двоично-двойственной к двоичному всплеску ψ , если каждая функция $f \in L^2(\mathbb{R})$ может быть представлена в виде

$$\begin{aligned} f(x) &= \sum_{j \in \mathbb{Z}} \int_{\mathbb{R}} (W_j^\psi f)(b) \{2^j \tilde{\psi}(2^j(x-b))\} db \\ &= \sum_{j \in \mathbb{Z}} 2^{3j/2} \int_{\mathbb{R}} (W_\psi f)\left(b, \frac{1}{2^j}\right) \tilde{\psi}(2^j(x-b)) db. \end{aligned}$$

В силу (7.2) функция ψ^* является двоично-двойственной к ψ . Кроме того, ψ^* является двоичным всплеском:

$$\frac{1}{B} \leq \sum_{j \in \mathbb{Z}} |\widehat{\psi^*}(2^{-j}\omega)|^2 \leq \frac{1}{A}.$$

Отметим, что двоично-двойственный всплеск к данному всплеску ψ не единственен.

ТЕОРЕМА 7.2. Пусть ψ – двоичный всплеск и $\tilde{\psi}$ – произвольная функция из $L^2(\mathbb{R})$, удовлетворяющая условию

$$\operatorname{ess\,sup}_{x \in \mathbb{R}} \sum_{j \in \mathbb{Z}} |\widehat{\tilde{\psi}}(2^{-j}x)|^2 < \infty.$$

Функция $\tilde{\psi}$ является двоично-двойственной к ψ тогда и только тогда, когда

$$\sum_{j \in \mathbb{Z}} \overline{\widehat{\tilde{\psi}}(2^{-j}\omega)} \widehat{\tilde{\psi}}(2^{-j}\omega) = 1 \quad \text{п.в.}$$

8. Фреймы. Для вычислительной эффективности можно дискретизировать и параметр сдвига b , рассматривая только дискретное множество значений: $b_{j,k} := \frac{k}{2^j}b_0$, $j, k \in \mathbb{Z}$, где $b_0 > 0$ – фиксированная константа, называемая темпом измерений. Обозначим

$$\psi_{b_0,j,k}(t) := \psi_{b_{j,k},a_j}(t) = 2^{j/2} \psi(2^j t - kb_0).$$

Будем рассматривать только следующие значения ИВП:

$$(8.1) \quad (W_\psi f)(b_{j,k}, a_j) = \langle f, \psi_{b_0,j,k} \rangle, \quad j, k \in \mathbb{Z}.$$

Если существуют константы A и B , $0 < A \leq B < \infty$, такие, что

$$(8.2) \quad A \|f\|_2^2 \leq \sum_{j,k \in \mathbb{Z}} |\langle f, \psi_{b_0,j,k} \rangle|^2 \leq B \|f\|_2^2, \quad f \in L^2(\mathbb{R}),$$

то функцию $f \in L^2(\mathbb{R})$ можно восстановить по значениям ИВП из (8.1).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.1. Говорят, что функция $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ порождает фрейм в $L^2(\mathbb{R})$ с темпом измерений $b_0 > 0$, если выполняется (8.2) с константами A и B , которые называются границами фрейма. Если $A = B$, то фрейм называют жестким (естественно называть жесткий фрейм обобщенной системой Парсеваля).

Рассмотрим линейный оператор T на $L^2(\mathbb{R})$:

$$Tf := \sum_{j,k \in \mathbb{Z}} \langle f, \psi_{b_0,j,k} \rangle \psi_{b_0,j,k}, \quad f \in L^2(\mathbb{R}).$$

Из (8.2) следует, что T является взаимно-однозначным. Действительно,

$$\langle Tf, f \rangle = \sum_{j,k \in \mathbb{Z}} |\langle f, \psi_{b_0,j,k} \rangle|^2.$$

Поэтому для $g = Tf$ имеем

$$A\|T^{-1}g\|_2^2 = A\|f\|_2^2 \leq \langle Tf, f \rangle = \langle g, T^{-1}g \rangle \leq \|g\|_2 \|T^{-1}g\|_2.$$

Откуда $\|T^{-1}g\|_2 \leq \frac{1}{A}\|g\|_2$ или $\|T^{-1}\| \leq A^{-1}$.

Таким образом, любую функцию $f \in L^2(\mathbb{R})$ можно восстановить по значениям ИВП из (8.1), применяя формулу

$$(8.3) \quad f = T^{-1}Tf = \sum_{j,k \in \mathbb{Z}} \langle f, \psi_{b_0,j,k} \rangle T^{-1}\psi_{b_0,j,k}.$$

Полагая $\psi_{b_0}^{j,k} := T^{-1}\psi_{b_0,j,k}$, $j, k \in \mathbb{Z}$, можно переписать формулу (8.3) следующим образом: для любых $f, g \in L^2(\mathbb{R})$

$$\begin{aligned} \langle f, g \rangle &= \sum_{j,k \in \mathbb{Z}} \langle f, \psi_{b_0,j,k} \rangle \langle \psi_{b_0}^{j,k}, g \rangle; \\ f &= \sum_{j,k \in \mathbb{Z}} \langle f, \psi_{b_0,j,k} \rangle \psi_{b_0}^{j,k}. \end{aligned}$$

Естественно называть $\{\psi_{b_0}^{j,k}\}$ двойственным фреймом к фрейму $\{\psi_{b_0,j,k}\}$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 8.2. Говорят, что функция $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ порождает базис Рисса (или безусловный базис) $\{\psi_{b_0,j,k}\}$ с темпом измерений b_0 , если выполнены следующие два условия:

- (i) линейная оболочка $\{\psi_{b_0,j,k}\}_{j,k \in \mathbb{Z}}$ плотна в $L^2(\mathbb{R})$;
- (ii) существуют положительные константы A и B , $0 < A \leq B < \infty$, такие, что для любых $\{c_{j,k}\} \in l^2(\mathbb{Z}^2)$

$$A\|\{c_{j,k}\}\|_{l^2}^2 \leq \left\| \sum_{j,k \in \mathbb{Z}} c_{j,k} \psi_{b_0,j,k} \right\|_2^2 \leq B\|\{c_{j,k}\}\|_{l^2}^2.$$

Константы A и B называют константами Рисса для $\{\psi_{b_0,j,k}\}$. Если $b_0 = 1$, то функция ψ называется R -функцией.

В дальнейшем будем использовать обозначение

$$\psi_{j,k}(x) := \psi_{1,j,k}(x) = 2^{j/2} \psi(2^j x - k),$$

которое не надо путать с $\psi_{b,a}$ из (6.1).

Следующий результат показывает разницу между фреймом и базисом Рисса.

ТЕОРЕМА 8.1. Пусть $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ и $b_0 > 0$. Тогда следующие утверждения эквивалентны:

- (i) $\{\psi_{b_0,j,k}\}$ – базис Рисса в $L^2(\mathbb{R})$;
- (ii) $\{\psi_{b_0,j,k}\}$ – фрейм в $L^2(\mathbb{R})$ и l^2 -линейно независимое семейство, т.е. если $\sum c_{j,k} \psi_{b_0,j,k} = 0$ и $\{c_{j,k}\} \in l^2$, то $c_{j,k} = 0$.

Более того, константы Рисса совпадают с границами фрейма.

Функция, порождающая фрейм, всегда является двоичным всплеском.

ТЕОРЕМА 8.2. Пусть $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ порождает фрейм $\{\psi_{b_0,j,k}\}$ в $L^2(\mathbb{R})$ с границами A , B и темпом измерений $b_0 > 0$. Тогда

$$b_0 A \leq \sum_{j \in \mathbb{Z}} |\widehat{\psi}(2^{-j}\omega)|^2 \leq b_0 B \quad \text{н.в.}$$

9. Всплесковые ряды. В дальнейшем будем предполагать темп измерений $b_0 = 1$. Пусть ψ – R -функция, $\{\psi_{j,k}\}$ – базис Рисса, $\{\psi^{j,k} = T^{-1}\psi_{j,k}\}$ – двойственный фрейм (см. (8.3)).

В классе R -функций выделяют два важных подмножества.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.1. Пусть $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ есть R -функция. Тогда

- (i) ψ называют ортогональным всплеском, если $\psi_{j,k}$ удовлетворяют условию ортогональности:

$$\langle \psi_{j,k}, \psi_{l,m} \rangle = \delta_{j,l} \delta_{k,m}, \quad j, k, l, m \in \mathbb{Z};$$

- (ii) ψ называют полуортогональным всплеском, если $\psi_{j,k}$ удовлетворяют условию:

$$\langle \psi_{j,k}, \psi_{l,m} \rangle = 0, \quad j \neq l; \quad j, k, l, m \in \mathbb{Z}.$$

Очевидно, что ортогональные всплески являются самодвойственными: $\psi^{j,k} = \psi_{j,k}$, $j, k \in \mathbb{Z}$.

Для того чтобы указать двойственный фрейм в полуортогональном случае, приведем следующий критерий ортогональности.

ТЕОРЕМА 9.1. Для любой функции $\phi \in L^2(\mathbb{R})$ следующие утверждения эквивалентны.

(i) $\{\phi(x - k) : k \in \mathbb{Z}\}$ – ортонормированное семейство:

$$\langle \phi(\cdot - k), \phi(\cdot - l) \rangle = \delta_{k,l}, \quad k, l \in \mathbb{Z}.$$

(ii) Преобразование Фурье $\widehat{\phi}$ удовлетворяет условию:

$$\frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{-ijx} |\widehat{\phi}(x)|^2 dx = \delta_{j,0}, \quad j \in \mathbb{Z}.$$

(iii) Для почти всех x

$$\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\widehat{\phi}(x + 2\pi k)|^2 = 1.$$

Более слабым, чем условие ортогональности, является условие Рисса, или условие безусловности.

ТЕОРЕМА 9.2. Для любой функции ϕ и констант $0 < A \leq B < \infty$ следующие утверждения эквивалентны.

(i) $\{\phi(\cdot - k) : k \in \mathbb{Z}\}$ удовлетворяет условию Рисса с константами A и B , т.е. для любых $\{c_k\} \in l^2$

$$A \|\{c_k\}\|_{l^2}^2 \leq \left\| \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k \phi(\cdot - k) \right\|_2^2 \leq B \|\{c_k\}\|_{l^2}^2.$$

(ii) Преобразование Фурье $\widehat{\phi}$ удовлетворяет п.в. условию

$$A \leq \sum_{k \in \mathbb{Z}} |\widehat{\phi}(x + 2\pi k)|^2 \leq B.$$

ТЕОРЕМА 9.3. Пусть $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ – полуортogonalный всплеск. Определим $\widetilde{\psi}$ в образах Фурье

$$\widehat{\widetilde{\psi}}(\omega) := \frac{\widehat{\psi}(\omega)}{\sum_{k \in \mathbb{Z}} |\widehat{\psi}(\omega + 2\pi k)|^2}.$$

Тогда функция $\widetilde{\psi}$ двойственна к ψ , т.е.

$$(9.1) \quad \langle \psi_{j,k}, \widetilde{\psi}_{l,m} \rangle = \delta_{j,l} \delta_{k,m}, \quad j, k, l, m \in \mathbb{Z},$$

где $\widetilde{\psi}_{l,m}(x) := 2^{l/2} \widetilde{\psi}(2^l x - m)$. Таким образом, двойственный фрейм к $\{\psi_{j,k}\}$ – это $\{\psi^{j,k} = \widetilde{\psi}_{j,k}\}$.

Эта теорема указывает, как исправить полуортogonalный всплеск в ортogonalный. Действительно, полагая

$$(9.2) \quad \widehat{\psi^\perp}(\omega) := \frac{\widehat{\psi}(\omega)}{(\sum_{k \in \mathbb{Z}} |\widehat{\psi}(\omega + 2\pi k)|^2)^{1/2}},$$

получаем, что

$$\widehat{\psi^\perp}(\omega) = \frac{\widehat{\psi^\perp}(\omega)}{\sum_{k \in \mathbb{Z}} |\widehat{\psi^\perp}(\omega + 2\pi k)|^2} = \widehat{\psi^\perp}(\omega).$$

Таким образом, $\widehat{\psi^\perp} = \psi^\perp$, т.е. $\psi^\perp$ – самодвойственен.

Существуют R -функции, у которых нет двойственных, т.е. двойственный базис $\{\psi^{j,k}\}$ к базису Рисса $\{\psi_{j,k}\}$ не имеет вида $\{\psi_{j,k}\}$ ни для какой функции $\psi \in L^2(\mathbb{R})$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 9.2. R -функция $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ называется всплеском, если существует двойственная функция $\tilde{\psi} \in L^2(\mathbb{R})$ такая, что $\{\psi_{j,k}\}$ и $\{\tilde{\psi}_{j,k}\}$ удовлетворяют (9.1).

Очевидно, что $\tilde{\tilde{\psi}}$ – тоже всплеск с двойственным ψ .

Если ψ – всплеск с двойственным $\tilde{\psi}$, то любую функцию $f \in L^2(\mathbb{R})$ можно разложить в ряды:

$$(9.3) \quad f(x) = \sum_{j,k \in \mathbb{Z}} c_{j,k} \psi_{j,k} = \sum_{j,k \in \mathbb{Z}} d_{j,k} \tilde{\psi}_{j,k}.$$

Оба этих ряда называются всплесковыми. В силу (9.1)

$$c_{j,k} = \langle f, \tilde{\psi}_{j,k} \rangle; \quad d_{j,k} = \langle f, \psi_{j,k} \rangle.$$

ТЕОРЕМА 9.4. Пусть ψ – всплеск с двойственным $\tilde{\psi}$. Для произвольной функции $f \in L^2(\mathbb{R})$ вычислим ИВП с ψ и $\tilde{\psi}$ в точках $(b, a) = (\frac{k}{2^j}, \frac{1}{2^j})$, $j, k \in \mathbb{Z}$:

$$d_{j,k} = \langle f, \psi_{j,k} \rangle = (W_\psi f)\left(\frac{k}{2^j}, \frac{1}{2^j}\right); \quad c_{j,k} = \langle f, \tilde{\psi}_{j,k} \rangle = (W_{\tilde{\psi}} f)\left(\frac{k}{2^j}, \frac{1}{2^j}\right).$$

Тогда f можно восстановить или по $\{d_{j,k}\}$, или по $\{c_{j,k}\}$, используя ряды (9.3). Более того, скалярное произведение любых двух функций из $L^2(\mathbb{R})$ можно также вычислить при помощи дискретных значений ИВП:

$$\langle f, g \rangle = \sum_{j,k} \langle f, \psi_{j,k} \rangle \langle \tilde{\psi}_{j,k}, g \rangle.$$

10. Система Хаара на прямой. Система Хаара на всей прямой является самым простым, но вместе с тем и одним из самых модельных примеров ортогональных всплесков. Мы расскажем о ней с современных позиций теории всплесков, подготавливая читателей к пониманию общей схемы построения всплесков, так называемому кратномасштабному анализу (multiresolution analysis).

Пусть $\varphi^H(t) = \kappa_{[0,1]}(t)$ (в современной терминологии, это – масштабирующая функция Хаара). Рассмотрим замыкание по норме $L^2(\mathbb{R})$ линейной оболочки целочисленных сдвигов функции φ^H :

$$V_0 := [\varphi_{0k}^H(\cdot) := \varphi^H(\cdot - k)]_{k \in \mathbb{Z}} = \left\{ \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_{0k} \varphi_{0k}^H : \sum_{k \in \mathbb{Z}} |c_{0k}|^2 < \infty \right\}.$$

Естественно назвать это подпространство подпространством функций масштаба 1. Для анализа функций из $L^2(\mathbb{R})$ нужны подпространства функций с различными масштабами. Определим последовательность подпространств $\{V_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$: $V_j := [\varphi_{jk}^H(t) := 2^{j/2} \varphi^H(2^j t - k)]_{k \in \mathbb{Z}}$ (V_j – подпространство функций масштаба 2^{-j}). Отметим, что последовательность $\{\varphi_{jk}^H\}_{k \in \mathbb{Z}}$ образует ортонормированный базис в V_j . Очевидно, что

$$(10.1) \quad \bigcap_{j \in \mathbb{Z}} V_j = \{0\}$$

и

$$(10.2) \quad \overline{\bigcup_{j \in \mathbb{Z}} V_j} = L^2(\mathbb{R}).$$

Здесь $\overline{X}$ обозначает замыкание подпространства X по норме $L^2(\mathbb{R})$.

Последнее свойство наталкивает на мысль получить ортонормированный базис в $L^2(\mathbb{R})$, используя совокупность ортонормированных базисов в V_j . На этом пути есть небольшое препятствие. Несмотря на вложение $V_j \subseteq V_{j+1}$, ортонормированный базис $\{\varphi_{jk}^H\}_{k \in \mathbb{Z}}$ в V_j не является частью ортонормированного базиса $\{\varphi_{j+1,k}^H\}_{k \in \mathbb{Z}}$ в V_{j+1} . Поэтому необходимо рассуждать следующим образом. Пусть W_0 – это ортогональное дополнение V_0 до V_1 : $V_0 \oplus W_0 = V_1$. Базис пространства V_0 состоит из целочисленных сдвигов функции φ_{00}^H . Базис пространства V_1 состоит из сдвигов на $k/2$ ($k \in \mathbb{Z}$) функции $\varphi_1^H(t) = \sqrt{2}\varphi(2t)$: $\varphi_{1,k}^H(t) = \varphi_1^H(t - k/2)$. В силу этих фактов естественно попытаться найти функцию ψ , целочисленные сдвиги которой образуют ортонормированный базис в W_0 . Таким свойством обладает функция

$$\psi^H(t) = \begin{cases} 1, & t \in (0, \frac{1}{2}); \\ -1, & t \in (\frac{1}{2}, 1); \\ 0 & \text{в остальных случаях.} \end{cases}$$

Это и есть всплеск Хаара.

Рис. 8. Масштабирующая функция Хаара

Рис. 9. Всплеск Хаара

Итак, $W_0 = [\psi_{0k}^H(\cdot) := \psi^H(\cdot - k)]_{k \in \mathbb{Z}}$. Если определить $W_j := [\psi_{jk}^H(t) := 2^{j/2} \psi^H(2^j t - k)]_{k \in \mathbb{Z}}$, то очевидно, что

$$(10.3) \quad V_j \oplus W_j = V_{j+1}.$$

Из (10.1)–(10.3) следует, что

$$(10.4) \quad L^2(\mathbb{R}) = \bigoplus_{j=-\infty}^{\infty} W_j.$$

Поскольку пространства W_j взаимно ортогональны, то, объединяя все ортонормированные базисы в W_j , мы получим ортонормированный базис в $L^2(\mathbb{R})$: $\{\psi_{jk}^H\}_{j \in \mathbb{Z}, k \in \mathbb{Z}}$. Отметим сразу, что в приложениях чаще всего удобнее заменить в (10.4) $\bigoplus_{j=-\infty}^{\infty} W_j$ на V_0 : $V_0 \oplus \{\bigoplus_{j=0}^{\infty} W_j\} = L^2(\mathbb{R})$. В этом случае ортонормированный базис в $L^2(\mathbb{R})$ состоит из $\{\varphi_{0k}^H\}_{k \in \mathbb{Z}}$ и $\{\psi_{jk}^H\}_{j \in \mathbb{Z}, k \in \mathbb{Z}, j \geq 0}$.

Таким образом, любую функцию из $L^2(\mathbb{R})$ можно разложить в ряд

$$f = \sum_{j \in \mathbb{Z}} \sum_{k \in \mathbb{Z}} d_{jk} \psi_{jk}^H = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_{0k} \varphi_{0k}^H + \sum_{j=0}^{\infty} \sum_{k \in \mathbb{Z}} d_{jk} \psi_{jk}^H.$$

Последний ряд удобен, в частности, потому, что легко переносится со всей прямой на отрезок $[0, 1]$. Для $f \in L^2[0, 1]$ имеем

$$(10.5) \quad f = c_0 + \sum_{j=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{2^j-1} d_{jk} \psi_{jk}^H.$$

Именно в таком виде систему определил А. Хаар [16].

Перечислим преимущества (10.5) по сравнению с классическим рядом Фурье по тригонометрической системе

$$(10.6) \quad f(t) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{l=1}^{\infty} (a_l \cos lt + b_l \sin lt).$$

Первое преимущество состоит в том, что ряд Хаара является хорошо локализованным. Если мы интересуемся поведением функции f на подынтервале $[a, b]$, то в разложении (10.5) нам нужны только те индексы j и k , для которых $\text{supp } \psi_{jk}^H = [k2^{-j}, (k+1)2^{-j}]$ пересекается с $[a, b]$, тогда как в разложении (10.6) нам потребуются все коэффициенты. Второе отличие состоит в том, что частичная сумма ряда Хаара по $j = 0, 1, 2, \dots, N$ является приближением исходной функции с точностью до масштаба 2^{-N-1} . Эти два свойства, локализованность и масштабирование, являются характерными для всех всплесковых разложений.

Прежде чем рассказать о других всплесках, изложим наиболее общий метод построения всплесков, так называемый кратномасштабный анализ.

11. Кратномасштабный анализ в $L^2(\mathbb{R})$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 11.1. Кратномасштабный анализ (КМА) – это последовательность $\{V_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$ замкнутых подпространств $L^2(\mathbb{R})$, удовлетворяющая следующим свойствам:

$$(11.1) \quad V_j \subset V_{j+1};$$

$$(11.2) \quad \overline{\bigcup_{j \in \mathbb{Z}} V_j} = L^2(\mathbb{R});$$

$$(11.3) \quad \bigcap_{j \in \mathbb{Z}} V_j = \{0\};$$

$$(11.4) \quad f \in V_j \Leftrightarrow f(2^{-j} \cdot) \in V_0;$$

$$(11.5) \quad f \in V_0 \Leftrightarrow f(\cdot - k) \in V_0 \text{ для любого } k \in \mathbb{Z};$$

$$(11.6) \quad \text{существует функция } \varphi \in V_0 \text{ такая, что последовательность } \{\varphi(\cdot - k)\}_{k \in \mathbb{Z}} \text{ образует базис Рисса в } V_0.$$

Это понятие введено и исследовано в [17].

Если обозначить через P_j ортогональный проектор на V_j , то из условия (11.2) следует, что $\lim_{j \rightarrow \infty} P_j f = f$ для любой функции $f \in L^2(\mathbb{R})$. Условие (11.4) означает, что все подпространства V_j однозначно определяются из центрального подпространства V_0 при помощи соответствующей замены переменных (соответствующего изменения масштаба). Из (11.4) и (11.5) следует, что для любой функции $f \in V_j$ функция $f(\cdot - 2^{-j}k)$ также принадлежит V_j при любом $k \in \mathbb{Z}$. Пусть $\varphi_{jk}(t) := 2^{j/2} \varphi(2^j t - k)$; $j, k \in \mathbb{Z}$. Из (11.4) и (11.6) следует, что последовательность $\{\varphi_{jk}\}_{k \in \mathbb{Z}}$ является базисом Рисса в V_j для любого $j \in \mathbb{Z}$. Не ограничивая общности, можно считать, что $\{\varphi(\cdot - k)\}_{k \in \mathbb{Z}}$ – ОНБ в V_0 (этого всегда можно достичь за счет ортогонализации (9.2)).

Основным свойством КМА является возможность построения ортонормированного всплескового базиса $\{\psi_{jk}\}_{j,k \in \mathbb{Z}}$, $\psi_{jk}(t) = 2^{j/2} \psi(2^j t - k)$, такого, что для любой функции f из $L^2(\mathbb{R})$

$$(11.7) \quad P_{j+1} f = P_j f + \sum_{k \in \mathbb{Z}} \langle f, \psi_{jk} \rangle \psi_{jk}.$$

Опишем процесс построения такого базиса. Пусть W_j – это ортогональное дополнение V_j до V_{j+1} : $W_j \oplus V_j = V_{j+1}$. В силу (11.1)

$$(11.8) \quad W_j \perp W_{j_1} \text{ при } j \neq j_1,$$

и при любых $j_0 < j$

$$(11.9) \quad V_j = V_{j_0} \oplus \left(\bigoplus_{l=j_0}^{j-1} W_l \right).$$

Из (11.2) и (11.3) следует, что

$$(11.10) \quad L^2(\mathbb{R}) = \bigoplus_{j \in \mathbb{Z}} W_j.$$

Последовательность $\{W_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$ наследует от V_j свойство (11.4):

$$(11.11) \quad f \in W_j \iff f(2^{-j} \cdot) \in W_0.$$

Формула (11.7) эквивалентна тому, что при фиксированном j последовательность $\{\psi_{jk}\}_{k \in \mathbb{Z}}$ образует ортонормированный базис в W_j . В силу (11.10) последнее означает, что $\{\psi_{jk}\}_{j, k \in \mathbb{Z}}$ – ортонормированный базис в $L^2(\mathbb{R})$. Заметим теперь, что свойство (11.11) гарантирует, что $\{\psi_{jk}\}_{k \in \mathbb{Z}}$ будет базисом в W_j , если $\{\psi_{0k}\}_{k \in \mathbb{Z}}$ является базисом в W_0 . Таким образом, задача построения всплескового базиса со свойством (11.7) сводится к нахождению функции ψ такой, что последовательность $\{\psi(\cdot - k)\}_{k \in \mathbb{Z}}$ образует ортонормированный базис в W_0 .

Для построения функции ψ нам потребуются некоторые свойства φ и W_0 . Так как $\varphi \in V_0 \subset V_1$ и $\{\varphi_{1k}\}_{k \in \mathbb{Z}}$ – ортонормированный базис в V_1 , то

$$(11.12) \quad \varphi = \sum_{k \in \mathbb{Z}} h_k \varphi_{1k},$$

где

$$(11.13) \quad h_k := \langle \varphi, \varphi_{1k} \rangle, \quad \sum_{k \in \mathbb{Z}} |h_k|^2 = 1.$$

Переходя к образам Фурье, имеем

$$(11.14) \quad \widehat{\varphi}(\omega) = m(\omega/2) \widehat{\varphi}(\omega/2),$$

где $m(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{k \in \mathbb{Z}} h_k e^{-ik\omega}$. Функцию φ называют масштабирующей (scaling), равенство (11.12) – масштабным, равенство (11.14) – уточняющим (refinement), функцию m – уточняющей маской (refinement mask) или масштабирующим фильтром (scaling filter).

В силу теоремы 9.1

$$(11.15) \quad \sum_{l \in \mathbb{Z}} |\widehat{\varphi}(\omega + 2\pi l)|^2 = 1$$

для почти всех ω . Если подставить (11.14) в (11.15), то получим, что

$$\sum_{l \in \mathbb{Z}} |m(\omega/2 + \pi l) \widehat{\varphi}(\omega/2 + \pi l)|^2 = 1.$$

Разбивая сумму на две (по четным и по нечетным l) и учитывая 2π -периодичность m , имеем

$$(11.16) \quad \begin{aligned} & \sum_{l \in \mathbb{Z}} |m(\omega/2 + 2\pi l) \widehat{\varphi}(\omega/2 + 2\pi l)|^2 + \sum_{l \in \mathbb{Z}} |m(\omega/2 + 2\pi l + \pi) \widehat{\varphi}(\omega/2 + 2\pi l + \pi)|^2 \\ &= |m(\omega/2)|^2 + |m(\omega/2 + \pi)|^2 = 1. \end{aligned}$$

Охарактеризуем подпространство W_0 в терминах образов Фурье. Любая функция f из W_0 принадлежит V_1 и ортогональна V_0 . Первое свойство означает, что $f = \sum_{k \in \mathbb{Z}} f_k \varphi_{1k}$, где $f_k = \langle f, \varphi_{1k} \rangle$. В образах Фурье имеем

$$(11.17) \quad \widehat{f}(\omega) = m_f(\omega/2) \widehat{\varphi}(\omega/2),$$

где $m_f = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{k \in \mathbb{Z}} f_k e^{-ik\omega} - 2\pi$ -периодическая функция из $L^2[0, 2\pi]$. Условие ортогональности f к V_0 эквивалентно тому, что $f \perp \varphi_{0k}$ для любого $k \in \mathbb{Z}$, т.е.

$$\int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(\omega) \overline{\widehat{\varphi}(\omega)} e^{ik\omega} d\omega = 0.$$

Заметим, что

$$(11.18) \quad \int_{\mathbb{R}} \widehat{f}(\omega) \overline{\widehat{\varphi}(\omega)} e^{ik\omega} d\omega = \int_0^{2\pi} e^{ik\omega} \sum_{l \in \mathbb{Z}} \widehat{f}(\omega + 2\pi l) \overline{\widehat{\varphi}(\omega + 2\pi l)} d\omega = 0.$$

Так как равенство (11.18) имеет место для любого $k \in \mathbb{Z}$, то

$$(11.19) \quad \sum_{l \in \mathbb{Z}} \widehat{f}(\omega + 2\pi l) \overline{\widehat{\varphi}(\omega + 2\pi l)} = 0.$$

Ряд в (11.19) сходится абсолютно в $L^1([0, 2\pi])$. Подставляя (11.14) и (11.17) в (11.19) и группируя суммы с четными и нечетными l , получим, учитывая (11.15), что

$$\sum_{l \in \mathbb{Z}} \widehat{f}(\omega + 2\pi l) \overline{\widehat{\varphi}(\omega + 2\pi l)} = m_f(\omega/2) \overline{m}(\omega/2) + m_f(\omega/2 + \pi) \overline{m}(\omega/2 + \pi) = 0.$$

В силу (11.16) $\overline{m}(\omega)$ и $\overline{m}(\omega + \pi)$ не могут обратиться в нуль одновременно, поэтому существует 2π -периодическая функция $\lambda(\omega)$ такая, что

$$(11.20) \quad m_f(\omega) = \lambda(\omega) \overline{m}(\omega + \pi) \text{ п.в.}$$

и $\lambda(\omega) + \lambda(\omega + \pi) = 0$. Последнее равенство можно переписать как $\lambda(\omega) = e^{-i\omega} \nu(2\omega)$, где ν — некоторая 2π -периодическая функция. Таким образом, преобразование Фурье произвольной функции из W_0 имеет вид

$$(11.21) \quad \widehat{f}(\omega) = e^{-i\omega/2} \overline{m}(\omega/2 + \pi) \nu(\omega) \widehat{\varphi}(\omega/2),$$

где ν — некоторая 2π -периодическая функция. Кроме того,

$$\begin{aligned} \|f\|_{L^2(\mathbb{R})} &= \frac{1}{2\pi} \|\widehat{f}\|_{L^2(\mathbb{R})} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |\nu|^2 \sum_{l \in \mathbb{Z}} |m(\omega/2 + \pi l) \widehat{\varphi}(\omega/2 + \pi l)|^2 d\omega \\ &= \|\nu\|_{L^2([0, 2\pi])}^2. \end{aligned}$$

Таким образом, 2π -периодическая функция ν является квадратично суммируемой.

Имея описание (11.21) пространства W_0 , легко найти функцию $\psi \in W_0$, целые сдвиги которой $\{\psi(\cdot - k)\}_{k \in \mathbb{Z}}$ образуют ортонормированный базис в W_0 . Пусть ψ – искомая функция. Тогда $\hat{\psi}(\omega) = e^{-i\omega/2} \overline{m}(\omega/2 + \pi) \nu_\psi(\omega) \hat{\varphi}(\omega/2)$. Подставляя это выражение в (11.15), получаем, используя (11.16), что

$$(11.22) \quad |\nu_\psi(\omega)|^2 \equiv 1 \quad \text{п.в.}$$

Проще всего положить $\nu_\psi(\omega) \equiv 1$. В силу (11.16) целые сдвиги функции ψ , определяемой равенством

$$(11.23) \quad \hat{\psi}(\omega) = e^{-i\omega/2} \overline{m}(\omega/2 + \pi) \hat{\varphi}(\omega/2),$$

будут базисом в W_0 .

Действительно, если $\nu(\omega) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \nu_k e^{-ik\omega}$, то $\hat{f}(\omega) = (\sum_{k \in \mathbb{Z}} \nu_k e^{-ik\omega}) \hat{\psi}(\omega)$ или $f(\cdot) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \nu_k \psi(\cdot - k)$.

Заметим, что в силу (11.22) образ Фурье любой функции, целые сдвиги которой образуют ортонормированный базис в W_0 , отличается от образа Фурье функции ψ из (11.23) лишь некоторым 2π -периодическим множителем, по модулю равным 1.

Таким образом, имея кратномасштабный анализ $\{V_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$, порождаемый масштабирующей функцией φ , всегда можно построить ортонормированный всплесковый базис $\{\psi_{jk}\}_{j,k \in \mathbb{Z}}$ в $L^2(\mathbb{R})$, обладающий свойством (11.7).

Из формулы (11.23) следует, что

$$(11.24) \quad \psi(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} (-1)^{k-1} h_{-k+1} \varphi_{1k}(t).$$

В литературе для сокращения записей чаще всего используют

$$(11.25) \quad \psi(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} (-1)^k h_{-k+1} \varphi_{1k}(t).$$

В заключение этого раздела проанализируем, более подробно свойства (11.2) и (11.3). Приводимые ниже результаты доказаны в [18].

Пусть $\hat{V} := \{\hat{f} : f \in V\}$. Из тождества Планшереля и свойств (11.4)–(11.6) следует, что $f \in V_j$ тогда и только тогда, когда

$$(11.26) \quad \hat{f}(\omega) = m(\xi 2^{-j}) \hat{\varphi}(\omega 2^{-j}), \quad \hat{f}(\omega) \in L_2(\mathbb{R}),$$

где m – некоторая 2π -периодическая функция.

ЛЕММА 11.1. *Из свойств (11.4) и (11.5) следует, что пространство $\overline{\bigcup_{j \in \mathbb{Z}} V_j}$ инвариантно относительно сдвигов.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. В силу (11.4), (11.5) из $f \in \bigcup_{j \in \mathbb{Z}} V_j$ следует, что $f(\cdot + t) \in \bigcup_{j \in \mathbb{Z}} V_j$ для любого двоично-рационального $t = 2^{-j}l$, $l, k \in \mathbb{Z}$. Так как сдвиг является непрерывной операцией в $L_2(\mathbb{R})$, то $f(\cdot + t) \in \overline{\bigcup_{j \in \mathbb{Z}} V_j}$ для любого $t \in \mathbb{R}$. Если теперь $g \in \overline{\bigcup_{j \in \mathbb{Z}} V_j}$, то, приближая g функциями $f \in \bigcup_{j \in \mathbb{Z}} V_j$ и замечая, что $\|f(\cdot + t) - g(\cdot + t)\|_{L_2(\mathbb{R})} = \|g - f\|_{L_2(\mathbb{R})}$, получаем утверждение леммы.

Хорошо известно, что замкнутое подпространство X в $L_2(\mathbb{R})$ является инвариантным относительно сдвигов тогда и только тогда, когда $\widehat{X} = L_2(\Omega)$ для некоторого измеримого множества Ω .

В дальнейшем равенства между множествами понимаются с точностью до множеств нулевой меры.

ТЕОРЕМА 11.1. *Пусть последовательность $\{V_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$ удовлетворяет свойствам (11.4)–(11.6). Тогда $\overline{\bigcup_{j \in \mathbb{Z}} V_j} = L_2(\mathbb{R})$ тогда и только тогда, когда $\Omega_0 := \bigcup_{j \in \mathbb{Z}} \text{supp } \widehat{\varphi}(2^{-j} \cdot) = \mathbb{R}$.*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $X := \overline{\bigcup_{j \in \mathbb{Z}} V_j}$. Тогда $\widehat{X} = L_2(\Omega)$. Таким образом, $X = L_2(\mathbb{R})$ тогда и только тогда, когда $\Omega = \mathbb{R}$. Так как $\varphi(2^j \cdot) \in V_j$, $j \in \mathbb{Z}$, то $\text{supp } \widehat{\varphi}(2^{-j} \cdot) \subset \Omega$. Поэтому $\Omega_0 \subset \Omega$. Предположим теперь, что $\Omega \setminus \Omega_0$ содержит множество положительной меры Ω_1 . В силу (11.26) преобразование Фурье любого элемента из V_j обнуляется на Ω_1 . Следовательно, то же самое верно для любого элемента из $\bigcup_{j \in \mathbb{Z}} V_j$. Переходя к пределу, получаем, что преобразование Фурье любого элемента из X обнуляется на Ω_1 , что противоречит тому, что $\widehat{X} \supset L_2(\Omega_1)$.

СЛЕДСТВИЕ 11.1. *Пусть последовательность $\{V_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$ удовлетворяет свойствам (11.4)–(11.6) и $\widehat{\varphi}$ не равно нулю почти всюду в некоторой окрестности нуля. Тогда $\overline{\bigcup_{j \in \mathbb{Z}} V_j} = L_2(\mathbb{R})$.*

Докажем теперь, что условие (11.3) следует из свойств (11.4)–(11.6) кратномасштабного анализа. Для доказательства нам потребуются две леммы, первая из которых хорошо известна.

ЛЕММА 11.2. *Пусть Ω – измеримое подмножество $\mathbb{R}$, причем $\Omega + \alpha t = \Omega$ для некоторого действительного числа $\alpha \neq 0$ и для любого двоично-рационального числа $t \in \mathbb{R}$. Тогда $\Omega = \mathbb{R}$ или $\Omega = \emptyset$.*

Кроме того, если f – некоторая измеримая функция на $\mathbb{R}$, удовлетворяющая условию $f(\cdot + \alpha t) = f(\cdot)$ для любого двоично-рационального t , то $f = \text{const}$ почти всюду.

Доказательство этой леммы основано на свойствах точек Лебега измеримой функции.

ЛЕММА 11.3. *Пусть последовательность $\{V_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$ замкнутых подпространств $L_2(\mathbb{R})$ удовлетворяет свойствам (11.4)–(11.6) кратномасштабного анализа. Тогда $Y = \bigcap_{j \in \mathbb{Z}} V_j$ имеет размерность ≤ 1 .*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Предположим, что $Y \neq \{0\}$. Докажем, что в этом случае $\dim Y = 1$. Пусть f, g – две произвольные функции из Y . Рассмотрим отображение

$F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}^2$:

$$F(\omega) = \begin{cases} 0, & \text{если } \widehat{f}(\omega) = \widehat{g}(\omega) = 0, \\ \frac{(\widehat{f}(\omega), \widehat{g}(\omega))}{\widehat{f}(\omega)}, & \text{если } \widehat{f}(\omega) \neq 0, \widehat{g}(\omega) = 0, \\ \frac{(\widehat{f}(\omega), \widehat{g}(\omega))}{\widehat{g}(\omega)}, & \text{если } \widehat{g}(\omega) \neq 0. \end{cases}$$

Докажем, что отображение F постоянно на своем носителе. Для этого рассмотрим произвольное измеримое подмножество $K \subset \mathbb{C}^2 \setminus \{0\}$. Предположим, что $A := F^{-1}(K)$ имеет положительную меру. Пусть D — это множество точек вида $2^j k \pi$, $k \in \mathbb{Z}$, $j \in \mathbb{Z}$. Рассмотрим $\omega \in A$ и $t = 2^{j+1} k \pi \in D$. В силу (11.26) существуют 2π -периодические функции τ и ν такие, что $\widehat{f}(\omega) = \tau(\omega 2^{-j}) \widehat{\varphi}(\omega 2^{-j})$, $\widehat{g}(\omega) = \nu(\omega 2^{-j}) \widehat{\varphi}(\omega 2^{-j})$ п.в. Так как $0 \notin K$, то $F(\omega) \neq 0$ и, значит, $\widehat{\varphi}(\omega 2^{-j}) \neq 0$. Поэтому

$$\begin{aligned} (\widehat{f}(\omega + t), \widehat{g}(\omega + t)) &= \widehat{\varphi}(2^{-j}(\omega + t)) (\tau(2^{-j}\omega + 2k\pi), \nu(2^{-j}\omega + 2k\pi)) \\ &= \widehat{\varphi}(2^{-j}(\omega + t)) (\tau(2^{-j}\omega), \nu(2^{-j}\omega)) \\ &= \frac{\widehat{\varphi}(2^{-j}(\omega + t))}{\widehat{\varphi}(2^{-j}\omega)} (\widehat{f}(\omega), \widehat{g}(\omega)). \end{aligned}$$

Полученное равенство означает, что либо $F(\omega + t) = 0$, либо $F(\omega + t) = F(\omega)$. Поэтому $F(A + D) \subset K \cup \{0\}$. В силу леммы 11.2 $A + D = \mathbb{R}$, так как A имеет положительную меру. Таким образом, все ненулевые значения F принадлежат K . Поскольку K можно выбрать сколь угодно малым, отображение F постоянно на своем носителе. Последнее означает, что функции f и g линейно зависимы.

ТЕОРЕМА 11.2. Пусть последовательность $\{V_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$ замкнутых подпространств $L_2(\mathbb{R})$ удовлетворяет свойствам (11.4)–(11.6) кратномасштабного анализа. Тогда $Y := \bigcap_{j \in \mathbb{Z}} V_j = \{0\}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Предположим противное: пусть $f \in Y$ и $f \neq 0$. В силу (11.4) V_j является сжатием в два раза V_{j-1} , поэтому подпространство Y инвариантно относительно сжатия в 2 раза. С другой стороны, в силу леммы 11.3 $\dim Y \leq 1$, поэтому существует константа λ такая, что

$$(11.27) \quad f(2 \cdot) = \lambda f(\cdot) \quad \text{п.в. на } \mathbb{R}.$$

Докажем, что (11.27) противоречит $f \in L_2(\mathbb{R}) \setminus \{0\}$. Действительно, для любого $C > 0$ множества $F_j := \{t : 2^j \leq |t| < 2^{j+1} \text{ и } |f(t)| > C|\lambda|^j\}$ имеют следующие свойства: $F_j = 2F_{j-1}$, $|F_j| = 2|F_{j-1}|$, $j \in \mathbb{Z}$. Если $f \neq 0$, то существует $C > 0$ такое, что $|F_0| \neq 0$. Из (11.27) следует, что $|f(t)| > C|\lambda|^k$ для $t \in 2^k F_0$. Поэтому

$$\int_{\mathbb{R}} |f(t)|^2 dt \geq |F_0| \sum_{k \in \mathbb{Z}} (2|\lambda|^2)^k,$$

что противоречит $f \in L_2(\mathbb{R})$.

12. Система Уиттакера–Шеннона–Котельникова. Другим простейшим примером ортогональных всплесков является система Уиттакера–Шеннона–Котельникова (см., например, [19]). Рассмотрим функцию φ^S , имеющую образ Фурье

$$\widehat{\varphi}^S(\omega) := \kappa_{[-\pi, \pi]}(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{если } |\omega| \leq \pi; \\ 0 & \text{в остальных случаях.} \end{cases}$$

Ясно, что $\varphi^S(t) = \frac{\sin \pi t}{\pi t}$. Очевидно, что $\widehat{\varphi}^S$ удовлетворяет условию (11.15), значит, функции $\varphi_{0k}^S(\cdot) := \varphi^S(\cdot - k)$ образуют ортонормированный базис в $V_0 := [\varphi_{0k}^S]_{k \in \mathbb{Z}}$. Легко видеть, что $\widehat{V}_0 := \{\widehat{f} : f \in V_0\} = L^2([-\pi, \pi])$. Кроме того, если $f \in V_0$, то

$$(12.1) \quad f(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} f(k) \varphi^S(t - k).$$

Дело в том, что

$$\langle f, \varphi_{0k}^S \rangle = \frac{1}{2\pi} \langle \widehat{f}, \widehat{\varphi}_{0k}^S \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \widehat{f}(\omega) e^{ik\omega} d\omega = f(k).$$

Если теперь определить для любого целого j $V_j := [\varphi_{jk}^S]_{k \in \mathbb{Z}}$, то легко видеть, что $\{V_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$ образуют КМА. Построим соответствующий всплесковый базис. Заметим, что $\widehat{\varphi}^S(\omega) = m^S(\omega/2) \widehat{\varphi}^S(\omega/2)$, где 2π -периодическая уточняющая маска m^S равна

$$m^S(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{если } |\omega| < \frac{\pi}{2}; \\ 0, & \text{если } \frac{\pi}{2} \leq |\omega| \leq \pi. \end{cases}$$

Коэффициенты $\{h_k\}_{k \in \mathbb{Z}}$ из (11.12) можно найти, пользуясь формулой (12.1) (точнее, ее аналогом для функций из V_1):

$$(12.2) \quad \varphi^S(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \varphi^S(k/2) \varphi^S(2t - k).$$

Значит,

$$h_k^S = \begin{cases} 1, & \text{если } k = 0; \\ \frac{\sqrt{2}}{k\pi} (-1)^{(k-1)/2}, & \text{если } k - \text{нечетное}; \\ 0, & \text{если } k - \text{четное}. \end{cases}$$

В соответствии с общей схемой всплеск Уиттакера–Шеннона–Котельникова имеет образ Фурье, равный

$$\begin{aligned} \widehat{\psi}^S &= e^{-i\omega/2} \overline{m^S}(\omega/2 + \pi) \widehat{\varphi}^S(\omega/2) \\ &= e^{-i\omega/2} \kappa_{[-2\pi, \pi] \cup [\pi, 2\pi]}(\omega) \\ &= e^{-i\omega/2} (\widehat{\varphi}^S(\omega/2) - \widehat{\varphi}^S(\omega)). \end{aligned}$$

Рис. 10. График $\varphi^S(t)$ Рис. 11. График $\psi^S(t)$

Откуда $\psi^S(t) = 2\varphi^S(2t-1) - \varphi^S(t-1/2)$.

13. Константы неопределенности. Всплески Хаара и Уиттакера–Шеннона–Котельникова представляют собой, условно говоря, два полюса в шкале всплесков. Всплески Хаара имеют прекрасную временную локализованность (компактный носитель), однако плохо локализованы по частоте (преобразование Фурье всплеска Хаара убывает на бесконечности как $|\omega|^{-1}$). Всплески же Уиттакера–Шеннона–Котельникова, наоборот, имеют компактный спектр (носитель преобразования Фурье), но убывают на бесконечности как $|t|^{-1}$.

Заметим, что $\Delta_{\psi_{jk}} = 2^{-j} \Delta_{\psi}$, $\Delta_{\widehat{\psi}_{jk}} = 2^j \Delta_{\widehat{\psi}}$, $j, k \in \mathbb{Z}$. Таким образом, константа неопределенности (см. раздел 5) для всех элементов всплескового базиса одна и та же. Для всплесков Хаара и Уиттакера–Шеннона–Котельникова константа неопределенности равна бесконечности: $\Delta_{\widehat{\psi}_H} = \infty$, $\Delta_{\psi^S} = \infty$. Примерами всплесковых базисов с конечной константой неопределенности являются всплески Мейера, Стремберга, Лемари–Бэтла и Добеши.

14. Всплески Мейера. Всплески Мейера [20] являются сглаженным вариантом всплесков Уиттакера–Шеннона–Котельникова. Масштабирующая функция Мейера φ^M определяется следующим образом. Пусть $\theta(\omega)$ – нечетная бесконечно дифференцируемая функция, равная $\pi/4$ при $\omega > \pi/3$ и $-\pi/4$ при $\omega < -\pi/3$. Определим четную функцию $\lambda(\omega)$ формулой

$$\lambda(\omega) = \begin{cases} \frac{\pi}{4} + \theta(\omega - \pi), & \text{если } \omega \in \left[\frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}\right]; \\ \frac{\pi}{4} - \theta\left(\frac{\omega}{2} - \pi\right), & \text{если } \omega \in \left[\frac{4\pi}{3}, \frac{8\pi}{3}\right]; \\ 0, & \text{если } \omega \in \left[0, \frac{2\pi}{3}\right) \cup \left(\frac{8\pi}{3}, \infty\right]. \end{cases}$$

Преобразование Фурье масштабирующей функции Мейера равно

$$\widehat{\varphi}^M(\omega) = \begin{cases} \cos(\lambda(\omega)), & \text{если } |\omega| \leq \frac{4\pi}{3}; \\ 0, & \text{если } |\omega| > \frac{4\pi}{3}. \end{cases}$$

Откуда

$$\varphi^M(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \cos(t\omega) \cos(\lambda(\omega)) d\omega.$$

Легко проверить, что $\widehat{\varphi}^M$ удовлетворяет (iii) из теоремы 9.1. Кроме того, $\widehat{\varphi}^M(\omega) = m^M(\omega/2) \widehat{\varphi}^M(\omega/2)$, где 2π -периодическая уточняющая маска $m^M(\omega)$ равна

$$\sum_{l \in \mathbb{Z}} \widehat{\varphi}^M(2\omega + 4l\pi).$$

Поэтому масштабирующая функция φ^M порождает кратномасштабный анализ, и, значит, существует соответствующий всплесковый базис $\{\psi_{j,k}^M\}_{j,k \in \mathbb{Z}}$, где

$$\widehat{\psi}^M(\omega) := e^{-i\omega/2} \overline{m(\omega/2 + \pi)} \widehat{\varphi}^M(\omega/2) = e^{-i\omega/2} \sin(\lambda(\omega))$$

или

$$(14.1) \quad \psi^M(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \cos((t - 1/2)\omega) \sin(\lambda(\omega)) d\omega.$$

Рис. 12. График $\varphi^M(t)$

Рис. 13. График $\psi^M(t)$

Отметим, что масштабирующая функция Мейера, так же как и масштабирующая функция Шеннона (см. (12.2)), удовлетворяет равенству

$$\varphi^M(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \varphi^M(k/2) \varphi^M(2t - k).$$

Действительно,

$$\begin{aligned} \langle \varphi^M, \varphi^M(2 \cdot - k) \rangle &= \frac{1}{4\pi} \int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi}^M(\omega) \widehat{\varphi}^M(\omega/2) e^{-ik\omega/2} d\omega \\ &= \frac{1}{4\pi} \int_{\mathbb{R}} \widehat{\varphi}^M(\omega) e^{-ik\omega/2} d\omega = \frac{1}{2} \varphi^M(k/2). \end{aligned}$$

15. Всплески Лемари–Бэтла и Стремберга. Зафиксируем произвольное натуральное число m . Рассмотрим для любого целого j подпространство V_j^m , состоящее из $(m-2)$ раза непрерывно дифференцируемых функций из $L^2(\mathbb{R})$, которые на любом интервале вида $[k2^{-j}, (k+1)2^{-j}]$, $k \in \mathbb{Z}$, совпадают с некоторым полиномом степени не выше $m-1$. Совершенно очевидно, что последовательность $\{V_j^m\}_{j \in \mathbb{Z}}$ удовлетворяет свойствам кратномасштабного анализа.

В качестве масштабирующей функции можно взять B -сплайн

$$(15.1) \quad N^m(x) := (N^{m-1} * N^1)(x) = \int_0^1 N^{m-1}(x-t) dt, \quad m \geq 2,$$

где $N^1 = \kappa_{[0,1]}$. Ясно, что целые сдвиги N^m не ортогональны друг другу при $m > 1$. Например, при $m = 2$

$$N^2(t) = \begin{cases} t, & \text{если } t \in [0, 1]; \\ 2-t, & \text{если } t \in (1, 2]; \\ 0, & \text{если } t \notin [0, 2]; \end{cases}$$

и функции $N^2(\cdot)$ и $N^2(\cdot \pm 1)$ не ортогональны друг другу.

Из (15.1) следует, что

$$\begin{aligned} \widehat{N^m}(\omega) &= \left(\frac{1 - e^{-i\omega}}{i\omega} \right)^m, \quad |\widehat{N^m}(\omega)| = \left| \frac{\sin(\omega/2)}{\omega/2} \right|^m, \\ \sum_{l \in \mathbb{Z}} |\widehat{N^m}(\omega + 2l\pi)|^2 &= \sum_{l \in \mathbb{Z}} \left| \frac{\sin(\omega/2 + l\pi)}{\omega/2 + l\pi} \right|^{2m}. \end{aligned}$$

Поэтому в силу теоремы 9.2 $\{N^m(\cdot - k)\}_{k \in \mathbb{Z}}$ – базис Рисса в V_0^m .

Для построения ортогональных сплайн-всплесков определим сначала ортогональную масштабирующую функцию (см. теорему 9.1)

$$(15.2) \quad \widehat{\varphi}^{B,m}(\omega) = \widehat{N^m}(\omega) \left(\sum_{l \in \mathbb{Z}} |\widehat{N^m}(\omega + 2l\pi)|^2 \right)^{-1/2}.$$

(Верхний индекс B – первая буква фамилии Ж. Бэтла, всплески которого получатся при таком выборе ортогональной масштабирующей функции.)

Рассмотрим два случая. Пусть m – четное, $m = 2s$, $s \in \mathbb{N}$. Тогда

$$\widehat{N^m}(\omega) = \left(\frac{\sin \omega/2}{\omega/2} \right)^{2s} e^{-i\omega s}.$$

Для упрощения выкладок заменим $N^m(t)$ на $N^m(t + s)$. Тогда

$$\widehat{N^m}(\omega) = \left(\frac{\sin \omega/2}{\omega/2} \right)^{2s}.$$

Для ортогонализации надо посчитать

$$\left(\sum_{l \in \mathbb{Z}} |\widehat{N^m}(\omega + 2l\pi)|^2 \right)^{1/2} = (\sin \omega/2)^{2s} \left(\sum_{l \in \mathbb{Z}} (\omega/2 + l\pi)^{-4s} \right)^{1/2}.$$

Это можно сделать, дифференцируя тождество $\sum_{l \in \mathbb{Z}} (\omega + l\pi)^{-1} = \operatorname{ctg} \omega$. Продифференцировав $(q - 1)$ раз, получим

$$(15.3) \quad \sum_{l \in \mathbb{Z}} \frac{1}{(\omega + l\pi)^q} = \frac{P_q(\cos \omega)}{(\sin \omega)^q},$$

где P_q – полином степени $q - 2$. Для четных q очевидно, что $P_q(t)$ строго положителен на $[0, 1]$. Окончательно имеем

$$\widehat{\varphi}^{B,m}(\omega) = \left(\frac{\sin \omega/2}{\omega/2} \right)^m (P_{2m}(\cos \omega/2))^{-1/2}.$$

Функция $\varphi^{B,m}$ действительнoзначна и симметрична относительно $t = 0$.

Если m – нечетно, то аналогичные выкладки показывают, что

$$\widehat{\varphi}^{B,m}(\omega) = e^{-i\omega/2} \left(\frac{\sin \omega/2}{\omega/2} \right)^m (P_{2m}(\cos \omega/2))^{-1/2}.$$

В этом случае функция $\varphi^{B,m}$ действительнoзначна и симметрична относительно $t = 1/2$.

В соответствии с общей схемой КМА с масштабирующей функцией $\varphi^{B,m}$ позволяет построить всплесковый базис $\{\psi_{jk}^{B,m}\}_{j,k \in \mathbb{Z}}$. Этот базис был построен (без использования КМА) в работах: [21], [22].

Рис. 14. График $\varphi^{B,2}(t)$ Рис. 15. График $\psi^{B,2}(t)$

Ортогонализировать B -сплайн N^m можно чуть-чуть по-другому. Из (15.3) следует, что

$$(15.4) \quad \sum_{l \in \mathbb{Z}} |\widehat{N^m}(\omega + 2l\pi)|^2 = P_{2m}(\cos \omega/2).$$

Коэффициенты полинома $P_{2m}(\cos \omega/2)$ нетрудно найти из следующих соображений. Очевидно, что

$$(15.5) \quad \text{supp } N^m = [0, m].$$

Остается заметить, что по формуле Планшереля

$$(15.6) \quad \begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{ik\omega} \sum_{l \in \mathbb{Z}} |\widehat{N^m}(\omega + 2l\pi)|^2 d\omega &= \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} e^{ik\omega} |\widehat{N^m}(\omega)|^2 d\omega \\ &= \int_{\mathbb{R}} N^m(t) N^m(t+k) dt. \end{aligned}$$

Кроме того, $\langle N_{0k}^m, N_{00}^m \rangle = \langle N_{0,-k}^m, N_{00}^m \rangle$.

Напомним хорошо известную лемму Рисса [23, задача 40].

ЛЕММА 15.1. Пусть $A(\xi) = \sum_{-T}^T \gamma_k e^{ik\xi}$ – тригонометрический полином, положительный или равный нулю на действительной оси. Тогда существует тригонометрический полином $h(\xi) = \sum_0^T \alpha_k e^{ik\xi}$ такой, что $|h(\xi)|^2 = A(\xi)$. Более того, если коэффициенты γ_k действительны, то $h(\xi)$ можно тоже выбрать с действительными α_k .

Из этой леммы следует, что

$$P_{2m}(\cos \omega/2) = a_m |(1 + z_1 e^{i\omega}) \cdots (1 + z_{m-1} e^{i\omega})|^2,$$

где $\{z_l\}_{l=1}^{m-1}$ всегда можно выбрать внутри единичного круга: $|z_l| < 1$. Более того, из результатов И. Шонберга (I. J. Shoenberg) [24] следует, что $\{z_l\}_{l=1}^{m-1}$ – положительные числа. Обозначим их $s_{m-1} < \dots < s_1$. Пусть

$$A_m(w) := \sqrt{a_m} (1 + s_1 e^{iw}) \cdots (1 + s_{m-1} e^{iw}).$$

Тогда функция $\varphi^{St,m}$, определяемая

$$(15.7) \quad \widehat{\varphi^{St,m}}(\omega) = \frac{\widehat{N}^m(\omega)}{A_m(\omega)},$$

так же как и $\varphi^{B,m}$, удовлетворяет условию (iii) из теоремы 9.1 и, следовательно, является ортогональной масштабирующей для $\{V_j^m\}_{j \in \mathbb{Z}}$. Так как $(1 + se^{iw})^{-1} = \sum_{l=0}^{\infty} (-se^{iw})^l$, равенство (15.7) означает, что $\varphi^{St,m}$ разлагается в ряд по целым сдвигам влево B -сплайна N^m , причем коэффициенты разложения убывают как геометрическая прогрессия. Значит, $\text{supp } \varphi^{St,m} = (-\infty, m]$ и $\varphi^{St,m}(t)$ убывает экспоненциально при $t \rightarrow -\infty$. КМА с такой масштабирующей функцией порождает всплесковый базис $\{\psi_{jk}^{St,m}\}_{j,k \in \mathbb{Z}}$, построенный (без использования КМА) в [25].

Рис. 16. График $\varphi^{St,2}(t)$

Рис. 17. График $\psi^{St,2}(t)$

16. Ортогональные всплески с компактным носителем. Простейший способ построения ортогональных всплесков с компактным носителем основан на использовании ортогональных масштабирующих функций с компактным носителем. В этом случае в последовательности $h_n := \sqrt{2} \int_{\mathbb{R}} \varphi(x) \overline{\varphi(2x - n)} dx$, $n \in \mathbb{N}$, из (11.12) только конечное число h_n отлично от нуля, и поэтому соответствующий всплеск ψ (см. (11.25)) является конечной линейной комбинацией функций с компактным

носителем, т.е. сам имеет компактный носитель. Уточняющий фильтр m_0 будет тригонометрическим полиномом $m_0(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{n \in \mathbb{Z}} h_n e^{-in\omega}$. В силу (11.16) $|m_0(\omega/2)|^2 + |m_0(\omega/2 + \pi)|^2 \equiv 1$.

Естественно стараться построить φ и ψ достаточно регулярными. Отметим здесь следующее необходимое условие [3].

ТЕОРЕМА 16.1. Пусть $f \in L^2(\mathbb{R})$ удовлетворяет условиям

$$\langle f_{j,k}, f_{l,m} \rangle = \delta_{j,l} \delta_{k,m},$$

где $f_{j,k}(x) = 2^{j/2} f(2^j x - k)$. Предположим, что f имеет компактный носитель, $f \in C^m(\mathbb{R})$ и $f^{(l)}$ ограничены при $l \leq m$. Тогда

$$(16.1) \quad \int_{\mathbb{R}} x^l f(x) dx = 0 \quad \text{для } l = 0, 1, \dots, m.$$

Свойство (16.1) эквивалентно тому, что $\widehat{\psi}^{(l)}(0) = 0$ при $l = 0, 1, \dots, m$. Так как $\widehat{\psi}(\omega) = e^{-i\omega/2} \overline{m_0(\omega/2 + \pi)} \widehat{\varphi}(\omega/2)$ и $\widehat{\varphi}(0) = 1$, то из $\psi \in C^m(\mathbb{R})$ следует, что m_0 имеет нуль кратности $m+1$ в π или $m_0(\omega) = \left(\frac{1+e^{i\omega}}{2}\right)^{m+1} L(\omega)$, где L — некоторый тригонометрический полином.

Итак, будем искать решения (11.16) в виде $m_0(\omega) = \left(\frac{1+e^{i\omega}}{2}\right)^N L(\omega)$. Заметим, что

$$|m_0(\omega)|^2 = \left(\cos^2 \frac{\omega}{2}\right)^N |L(\omega)|^2 = \left(\cos^2 \frac{\omega}{2}\right)^N P\left(\sin^2 \frac{\omega}{2}\right),$$

где $P\left(\sin^2 \frac{\omega}{2}\right) := |L(\omega)|^2$. Подставляя это выражение в (11.16), получаем уравнение на P :

$$(16.2) \quad x^N P(1-x) + (1-x)^N P(x) = 1.$$

Так как x^N и $(1-x)^N$ — взаимно-простые полиномы степени N , то по теореме Безу существует единственный полином P_{N-1} степени $N-1$, удовлетворяющий (16.2):

$$P_{N-1}(x) = \sum_{k=0}^{N-1} \binom{N-1+k}{k} x^k.$$

Очевидно, что $P_{N-1}(x) > 0$. Существуют решения (16.2) более высокой степени $P(x) = P_{N-1}(x) + x^N R(x - \frac{1}{2})$, где R — произвольный нечетный полином. Для простоты рассмотрим здесь только случай $R = 0$.

Зная P , полином m_0 находится при помощи леммы 15.1.

Итак, пусть $N \in \mathbb{N}$. Фильтрами Добеши называют тригонометрические полиномы

$$d_N(\omega) = 2^{-1/2} \sum_{l=0}^{2N-1} h_N(l) e^{il\omega}, \quad h_N(l) \in \mathbb{R},$$

удовлетворяющие равенствам

$$|d_N(\omega)|^2 = \left(\cos^2 \frac{\omega}{2}\right)^N P_{N-1}\left(\sin^2 \frac{\omega}{2}\right).$$

В [26] доказана следующая

ТЕОРЕМА 16.2. Функция $\varphi^{D,N}$, определенная в образах Фурье как

$$\widehat{\varphi^{D,N}}(\omega) := \prod_{l=1}^{\infty} d_N(\omega 2^{-l}),$$

является ортогональной масштабирующей функцией. Соответствующий всплеск $\psi^{D,N}$, определяемый формулой

$$\widehat{\psi^{D,N}}(\omega) = e^{-i\omega/2} \overline{d_N(\omega/2 + \pi)} \widehat{\varphi^{D,N}}(\omega/2),$$

порождает ортонормированный базис в $L^2(\mathbb{R})$:

$$\{\psi_{jk}^{D,N}(\cdot) := 2^{j/2} \psi^{D,N}(2^j \cdot - k)\}_{j \in \mathbb{Z}, k \in \mathbb{Z}}.$$

Более того, $\text{supp } \psi^{D,N} = [-(N-1), N]$, и существует $\lambda > 0$ такая, что $\psi^{D,N} \in C^{\lambda N}$, где $C^\alpha := \left\{ f : \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(\omega) (1 + |\omega|)^\alpha d\omega < \infty \right\}$, $\alpha > 0$.

Рис. 18. График $\varphi^{D,2}(t)$

Рис. 19. График $\psi^{D,2}(t)$

Рис. 20. График $\varphi^{D,4}(t)$ Рис. 21. График $\psi^{D,4}(t)$

17. Быстрые алгоритмы. Кратномасштабный анализ позволяет быстро вычислять всплесковые коэффициенты заданной функции. Предположим, что нам известны скалярные произведения f с $\{\varphi_{jk}\}_{k \in \mathbb{Z}}$ для некоторого j . Не ограничивая общности, можно считать $j = 0$ (к этому случаю всегда можно перейти соответствующей заменой переменных). Зная $\langle f, \varphi_{0k} \rangle$, $k \in \mathbb{Z}$, легко подсчитать $\langle f, \psi_{jk} \rangle$ для $j < 0$. Действительно, $\psi = \sum_{k \in \mathbb{Z}} g_k \varphi_{1k}$, где $g_k = (-1)^k h_{1-k}$ (см. (11.25)). Следовательно,

$$\begin{aligned}
 (17.1) \quad \psi_{jk}(t) &= 2^{j/2} \psi(2^j t - k) = 2^{j/2} \sum_{l \in \mathbb{Z}} \varphi(2^j t - 2k - l) \\
 &= \sum_{l \in \mathbb{Z}} g_l \varphi_{j+1, 2k+l}(t) = \sum_{l \in \mathbb{Z}} g_{l-2k} \varphi_{j+1, l}(t).
 \end{aligned}$$

Значит,

$$\langle f, \psi_{-1, k} \rangle = \sum_{l \in \mathbb{Z}} \overline{g_{l-2k}} \langle f, \varphi_{0l} \rangle,$$

т.е. $\{\langle f, \psi_{-1, k} \rangle\}_{k \in \mathbb{Z}}$ получается сверткой последовательности $\{\langle f, \varphi_{0l} \rangle\}_{l \in \mathbb{Z}}$ с $\{\overline{g_{-l}}\}_{l \in \mathbb{Z}}$ с последующим выбором только четных элементов. Аналогично выполняется переход

от слоя j к $j - 1$:

$$(17.2) \quad \langle f, \psi_{j-1,k} \rangle = \sum_{l \in \mathbb{Z}} \overline{g_{l-2k}} \langle f, \varphi_{j,l} \rangle,$$

правда при этом нужно предварительно вычислить $\{\langle f, \varphi_{j,k} \rangle\}_{k \in \mathbb{Z}}$. Но в силу масштабного равенства

$$(17.3) \quad \varphi_{j,k} = \sum_{l \in \mathbb{Z}} h_{l-2k} \varphi_{j+1,l}.$$

Поэтому

$$(17.4) \quad \langle f, \varphi_{j,k} \rangle = \sum_{l \in \mathbb{Z}} \overline{h_{l-2k}} \langle f, \varphi_{j+1,l} \rangle.$$

Итак, начиная с $\{\langle f, \varphi_{0,k} \rangle\}_{k \in \mathbb{Z}}$, можно вычислить $\{\langle f, \psi_{-1,k} \rangle\}_{k \in \mathbb{Z}}$ по (17.2) и $\{\langle f, \varphi_{-1,k} \rangle\}_{k \in \mathbb{Z}}$ по (17.4). Затем мы можем применить (17.2) и (17.4) снова и получить $\{\langle f, \psi_{-2,k} \rangle\}_{k \in \mathbb{Z}}$ и $\{\langle f, \varphi_{-2,k} \rangle\}_{k \in \mathbb{Z}}$, используя $\{\langle f, \varphi_{-1,k} \rangle\}_{k \in \mathbb{Z}}$. Таким образом, на каждом шаге вычисляются не только всплесковые коэффициенты j -го слоя, но и вспомогательные коэффициенты $\{\langle f, \varphi_{j,k} \rangle\}_{k \in \mathbb{Z}}$, которые потребуются для нахождения всплесковых коэффициентов в $(j - 1)$ -м слое.

В целом весь процесс можно рассматривать как последовательное вычисление более грубых приближений функции f вместе с фиксацией деталей, необходимых для получения более точного приближения из более грубого. С этой точки зрения мы начинаем с приближения $f^0 = P_0 f$ (напоминаем, что P_j — это ортогональный проектор на V_j ; через Q_j мы будем обозначать проектор на W_j). Далее мы разлагаем $f^0 \in V_0 = V_{-1} \oplus W_{-1}$ на f^{-1} и δ^{-1} : $f^0 = f^{-1} + \delta^{-1}$, где $f^{-1} = P_{-1} f^0 = P_{-1} f$ — более грубое приближение f в шкале кратномасштабного анализа, а $\delta^{-1} = f^0 - f^{-1} = Q_{-1} f^0 = Q_{-1} f$ — это “потеря” в информации при отображении $f^0 \rightarrow f^{-1}$. В каждом из пространств V_j и W_j есть ортонормированный базис $\{\varphi_{j,k}\}_{k \in \mathbb{Z}}$ и $\{\psi_{j,k}\}_{k \in \mathbb{Z}}$, поэтому

$$f^0 = \sum_{k \in \mathbb{Z}} s_k^0 \varphi_{0,k}, \quad f^{-1} = \sum_{k \in \mathbb{Z}} s_k^{-1} \varphi_{-1,k}, \quad \delta^{-1} = \sum_{k \in \mathbb{Z}} d_k^{-1} \psi_{-1,k}.$$

Таким образом, формулы (17.2), (17.4) задают преобразование коэффициентов при переходе от ортонормированного базиса $\{\varphi_{0,k}\}_{k \in \mathbb{Z}}$ в V_0 к ортонормированному базису $\{\varphi_{-1,k}\}_{k \in \mathbb{Z}} \cup \{\psi_{-1,k}\}_{k \in \mathbb{Z}}$:

$$(17.5) \quad s_k^{-1} = \sum_{l \in \mathbb{Z}} \overline{h_{l-2k}} s_k^0, \quad d_k^{-1} = \sum_{l \in \mathbb{Z}} \overline{g_{l-2k}} s_k^0.$$

Если обозначить $a := \{a_l\}_{l \in \mathbb{Z}}$, $A := \{a_{-l}\}_{l \in \mathbb{Z}}$ и $(Ab)_k = \sum_{l \in \mathbb{Z}} A_{2k-l} b_l$, то (17.5) можно записать в виде $s^{-1} = \overline{H} s^0$, $d^{-1} = \overline{G} s^0$.

Приближение $f^{-1} \in V_{-1} = V_{-2} \oplus W_{-2}$ может быть снова разложено:

$$f^{-1} = f^{-2} + \delta^{-2}, \quad f^{-2} \in V_{-2}, \quad \delta^{-2} \in W_{-2},$$

$$f^{-2} = \sum_{k \in \mathbb{Z}} s_k^{-2} \varphi_{-2,k}, \quad \delta^{-2} = \sum_{k \in \mathbb{Z}} d_k^{-2} \psi_{-2,k}.$$

Опять $s^{-2} = \overline{H}s^{-1}$, $d^{-2} = \overline{G}s^{-1}$. Схематично весь процесс можно изобразить так:

$$\begin{array}{ccccccc} s^0 & \xrightarrow{\overline{H}} & s^{-1} & \xrightarrow{\overline{H}} & s^{-2} & \dots & s^j & \xrightarrow{\overline{H}} & s^{j-1} \\ & \searrow \overline{G} & & \searrow \overline{G} & & & & \searrow \overline{G} & \\ & & d^{-1} & & d^{-2} & \dots & d^j & & d^{j-1} \end{array}$$

На практике, после выполнения конечного числа шагов процесс прекращается, что означает, что исходная информация $\{\langle f, \varphi_{0k} \rangle\}_{k \in \mathbb{Z}} = s^0$ преобразована в $d^{-1}, d^{-2}, \dots, d^{-j_0}$ и s^{-j_0} , т.е. в $\{\langle f, \psi_{-j,k} \rangle\}_{j=1, \dots, j_0; k \in \mathbb{Z}}$ и $\{\langle f, \varphi_{-j_0,k} \rangle\}_{k \in \mathbb{Z}}$. Так как преобразования выполнялись при помощи изменения ортогональных базисов, обратная операция задается сопряженной матрицей. Точнее:

$$f^{j+1} = f^j + \delta^j = \sum_{k \in \mathbb{Z}} s_k^j \varphi_{jk} + \sum_{k \in \mathbb{Z}} d_k^j \psi_{jk}.$$

Следовательно (см. (17.1), (17.3)),

$$\begin{aligned} (17.6) \quad s_k^{j+1} &= \langle f^{j+1}, \varphi_{j+1,k} \rangle \\ &= \sum_{l \in \mathbb{Z}} s_l^j \langle \varphi_{jl}, \varphi_{j+1,k} \rangle + \sum_{l \in \mathbb{Z}} d_l^j \langle \psi_{jl}, \psi_{j+1,k} \rangle \\ &= \sum_{l \in \mathbb{Z}} h_{k-2l} s_l^j + \sum_{l \in \mathbb{Z}} g_{k-2l} d_l^j. \end{aligned}$$

Если обозначить $(\tilde{a}b)_k := \sum_{l \in \mathbb{Z}} a_{k-2l} b_l$, то $s^{j+1} = \tilde{h}s^j + \tilde{g}d^j$ и схематично процесс восстановления выглядит так:

$$\begin{array}{ccccccc} s^j & \xrightarrow{\tilde{h}} & s^{j+1} & \xrightarrow{\tilde{h}} & s^{j+2} & \dots & s^{-1} & \xrightarrow{\tilde{h}} & s^0 \\ & \nearrow \tilde{g} & & \nearrow \tilde{g} & & & & \nearrow \tilde{g} & \\ d^j & & d^{j+1} & & d^{j+2} & \dots & d^{-1} & & \end{array}$$

Важнейшей чертой изложенного алгоритма разложения и восстановления является его быстрота. Например, для системы Хаара имеем следующее. Пусть исходная информация состояла из 2^N чисел $\{s_k^0\}_{k=0}^{2^N-1}$. Тогда на первом шаге вычисляется 2^{N-1} вспомогательных чисел $\{s_k^{-1}\}_{k=0}^{2^{N-1}-1}$: $s_k^{-1} = (s_{2k}^0 + s_{2k+1}^0)/\sqrt{2}$ и 2^{N-1} коэффициентов $\{d_k^{-1}\}_{k=0}^{2^{N-1}-1}$: $d_k^{-1} = (s_{2k}^0 - s_{2k+1}^0)/\sqrt{2}$. На каждом следующем шаге количество вспомогательных чисел и коэффициентов уменьшается в два раза. Количество операций во всем алгоритме разложения равно $2 \cdot 2^N (\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots) = 2 \cdot 2^N$. Для более сложных всплесковых базисов вычисления вспомогательных чисел (условно говоря, “средних”) и коэффициентов (“разностей”) требуют более чем два предыдущих числа, но рассуждения о количестве коэффициентов на каждом слое остаются в силе. Если “обобщенные средние” и “разности” используют K предыдущих чисел, то общее число операций равно $2KN$ (KN – умножений, KN – сложений).

Следует отметить, что быстрый алгоритм разложения и восстановления по всплесковому базису (коротко, быстрое всплесковое преобразование (БВП)) был известен в цифровой обработке сигналов под названием полосовая фильтрация с точным восстановлением (subband filtering scheme with exact reconstruction). Эта схема была предложена до появления теории всплесков в работах: [27]–[29].

18. Полуортогональные сплайн-всплески с компактным носителем.

Пусть φ – масштабирующая функция с компактным носителем, порождающая КМА $\{V_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$ в $L^2(\mathbb{R})$. В этом случае можно построить соответствующий полуортогональный всплеск ψ с компактным носителем. В этом разделе мы не предполагаем ортонормированность последовательности $\{\varphi(\cdot - k)\}_{k \in \mathbb{Z}}$ (дело в том, что ортогонализация (9.2) масштабирующей функции с компактным носителем приводит к потере компактного носителя).

Пусть $\text{supp } \varphi = [0, M]$, $M \in \mathbb{N}$. Тогда $\varphi = \sum_{k=-M+1}^{2M-1} h_k \varphi_{1k}$. Для удобства будем рассматривать действительные значения φ . Очевидно, что автокорреляционная функция $\Phi(t) := \int_{\mathbb{R}} \varphi(x-t)\varphi(x) dx$ является четной функцией и $\text{supp } \Phi = [-M, M]$. Пусть n_φ – наибольшее целое, для которого $\Phi(n_\varphi) \neq 0$. Так как Φ – непрерывная функция, то $\Phi(M) = 0$ и $0 \leq n_\varphi \leq M-1$. Аналогично (15.6) получаем, что

$$\sum_{l \in \mathbb{Z}} |\hat{\varphi}(\omega + 2l\pi)|^2 = E_\varphi(e^{-i\omega}),$$

где $E_\varphi(z) := \sum_{k=-n_\varphi}^{n_\varphi} \Phi(k) z^k$. Полином $P_\varphi(z)$ называют полиномом Эйлера–Фробениуса для масштабирующей функции φ .

Построение полуортогонального всплескового базиса аналогично построению ортогонального (см. раздел 11). Прежде всего охарактеризуем функции $\psi \in W_0$, где $V_0 \oplus W_0 = V_1$, $W_0 \perp V_0$. Так как $W_0 \subset V_1$, то $\psi = \sum_k r_k \varphi_{1k}$. В образах Фурье имеем

$$\hat{\psi}(\omega) = R(e^{-i\omega/2}) \hat{\varphi}(\omega/2),$$

где $R(z) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{k \in \mathbb{Z}} r_k z^k$ – 2π -периодическая функция из $L^2[0, 2\pi]$. Аналогично для φ :

$$\varphi = \sum_k p_k \varphi_{1k}, \quad \hat{\varphi}(\omega) = P(e^{-i\omega/2}) \hat{\varphi}(\omega/2), \quad P(z) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{k \in \mathbb{Z}} p_k z^k.$$

Пусть $z = e^{-i\omega/2}$. Применяя тождество Планшереля, имеем

$$\begin{aligned} \langle \varphi(\cdot - l), \psi(\cdot) \rangle &= \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \hat{\varphi}(\omega) e^{-il\omega} \overline{\hat{\psi}(\omega)} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} |\hat{\varphi}(\omega/2)|^2 P(z) \overline{R(z)} e^{-il\omega} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{4\pi} \left\{ \sum_{k \in \mathbb{Z}} |\hat{\varphi}(\omega/2 + 2\pi k)|^2 \right\} P(z) \overline{R(z)} e^{-il\omega} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{4\pi} E_\varphi(z) P(z) \overline{R(z)} e^{-il\omega} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \{ E_\varphi(z) P(z) \overline{R(z)} + E_\varphi(-z) P(-z) \overline{R(-z)} \} e^{-il\omega} d\omega. \end{aligned}$$

Откуда следует, что $\psi \in W_0$ тогда и только тогда, когда

$$(18.1) \quad E_\varphi(z) P(z) \overline{R(z)} + E_\varphi(-z) P(-z) \overline{R(-z)} = 0, \quad |z| = 1.$$

Если предположить, что коэффициенты R действительны, то нетрудно указать общее решение (18.1):

$$(18.2) \quad R(z) = zK(z^2)P\left(-\frac{1}{z}\right)E_\varphi(-z), \quad |z| = 1,$$

где $K(z)$ – произвольная квадратично-суммируемая функция на единичной окружности $|z| = 1$. Здесь использовано то, что $E_\varphi(z^{-1}) = E_\varphi(z)$ при $|z| = 1$, так как $\Phi(-k) = \Phi(k)$.

Если φ имеет компактный носитель, то P и E_φ являются полиномами Лорана. Из (18.2) следует, что R будет тоже полиномом Лорана, если K – полином Лорана.

ТЕОРЕМА 18.1. *Полуортogonalный всплеск с минимальным компактным носителем, соответствующий φ , определяется двумасштабным соотношением*

$$\psi := \sum_k q_k \varphi_{1,k}$$

или, в образах Фурье,

$$\widehat{\psi}(\omega) := Q(e^{-i\omega/2})\widehat{\varphi}(\omega/2),$$

где $Q(z) := \frac{1}{\sqrt{2}}q_k z^k = cz^{2N+1}P(-1/z)E_\varphi(-z)$. Здесь N – произвольное целое, c – произвольная ненулевая константа. В частности, если положить N равным целой части $(M + n_\varphi)/2$, то Q будет алгебраическим полиномом и $\psi := \sum_{k=0}^{M+2n_\varphi} q_k \varphi_{1,k}$.

Последовательность $\{\psi(\cdot - k)\}_{k \in \mathbb{Z}}$ образует базис Рисса в W_0 , а $\{\psi_{j,k}(t) := 2^{j/2}\psi(2t - k)\}_{j,k \in \mathbb{Z}}$ – полуортogonalный базис в $L^2(\mathbb{R})$.

Применим эту теорему к B -сплайну $\varphi = N^m$, $m \in \mathbb{N}$. В этом случае $M = m$, $n_\varphi = m - 1$. Полагая $N = m - 1$, $c = -1$, имеем

$$\begin{aligned} Q_m(z) &= -z^{2m-1}P\left(-\frac{1}{z}\right)E(-z) \\ &= -z^{2m-1}\left(\frac{z-1}{2z}\right)^m \sum_{k=-m+1}^{m-1} (-1)^k N^{2m}(m+k)z^k \\ &= \left(\frac{1-z}{2}\right)^m \sum_{k=0}^{2m-2} (-1)^k N^{2m}(k+1)z^k = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{k=0}^{3m-2} q_{m,k} z^k, \end{aligned}$$

где

$$q_{m,k} = \frac{(-1)^k}{2^{m-\frac{1}{2}}} \sum_{l=0}^m N^{2m}(k-l+1), \quad k = 0, \dots, 3m-2.$$

Здесь использованы легко проверяемые соотношения:

$$N^m(t) = \sum_{k=0}^m 2^{-m+1} \binom{m}{k} N^m(2t-k), \quad E_{N^m}(z) = \sum_{k=-m+1}^{m-1} N^{2m}(m+k)z^k.$$

Рис. 22. График $\psi^2(t)$ Рис. 23. График $\psi^3(t)$

Окончательно, полуортогональный сплайн-всплеск порядка m равен

$$\psi^m(t) = \sum_{k=0}^{3m-2} \sqrt{2} q_{m,k} N^m(2t - k), \quad \text{supp } \psi^m = [0, 2m - 1].$$

19. Регулярные КМА в $L^2(\mathbb{R}^n)$. Перейдем от рассмотрения одномерных КМА к многомерным. Следующее определение обобщает определение 11.1.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 19.1. Кратномасштабный анализ (КМА) — это последовательность $\{V_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$ замкнутых подпространств $L^2(\mathbb{R}^n)$, удовлетворяющая следующим свойствам:

$$(19.1) \quad V_j \subset V_{j+1};$$

$$(19.2) \quad \overline{\bigcup_{j \in \mathbb{Z}} V_j} = L^2(\mathbb{R}^n);$$

$$(19.3) \quad \bigcap_{j \in \mathbb{Z}} V_j = \{0\};$$

$$(19.4) \quad f \in V_j \Leftrightarrow f(2^{-j} \cdot) \in V_0;$$

$$(19.5) \quad f \in V_0 \Leftrightarrow f(\cdot - k) \in V_0 \text{ для любого } k \in \mathbb{Z}^n;$$

$$(19.6) \quad \text{существует функция } g \in V_0 \text{ такая, что последовательность } \{g(\cdot - k)\}_{k \in \mathbb{Z}^n} \text{ образует базис Рисса в } V_0.$$

Напомним, что последовательность $\{g_{0k}(\cdot) := g(\cdot - k)\}_{k \in \mathbb{Z}^n}$ является базисом Рисса в V_0 , если $[g_{0k}]_{k \in \mathbb{Z}^n} = V_0$ и существуют две константы $A > 0, B > 0$ такие, что

$$A \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}^n} |c_k|^2 \right)^{1/2} \leq \left\| \sum_{k \in \mathbb{Z}^n} c_k g_{0k} \right\|_{L^2(\mathbb{R})} \leq B \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}^n} |c_k|^2 \right)^{1/2}$$

для любой последовательности чисел $\{c_k\}_{k \in \mathbb{Z}^n}$.

Эффективность использования всплесковых базисов в функциональных пространствах, отличных от $L^2(\mathbb{R}^n)$, зависит от регулярности соответствующего КМА.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 19.2. КМА $\{V_j\}_{j \in \mathbb{Z}^n}$ называется r -регулярным ($r \in \mathbb{N}$), если функция $g(x)$ в (19.6) может быть выбрана так, что

$$(19.7) \quad |\partial^\alpha g(x)| \leq C_m (1 + |x|)^{-m}$$

для любого целого $m \in \mathbb{N}$ и для любого мультииндекса $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, удовлетворяющего $|\alpha| \leq r$.

Следующая теорема показывает, как перейти от базиса Рисса к каноническому ортонормированному базису (см. для сравнения одномерный случай в теоремах 9.1–9.3).

ТЕОРЕМА 19.1. Пусть $\{V_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$ – кратномасштабный анализ в $L^2(\mathbb{R}^n)$. Тогда существуют две константы $c_2 \geq c_1 > 0$ такие, что для почти всех $\omega \in \mathbb{R}^n$ имеем

$$(19.8) \quad c_1 \leq \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}^n} |\hat{g}(\omega + 2k\pi)|^2 \right)^{1/2} \leq c_2.$$

Далее, если $\varphi \in L^2(\mathbb{R}^n)$ определена в образах Фурье

$$(19.9) \quad \hat{\varphi}(\omega) = \hat{g}(\omega) \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}^n} |\hat{g}(\omega + 2k\pi)|^2 \right)^{-1/2},$$

то $\{\varphi(x - k)\}_{k \in \mathbb{Z}^n}$ является ортонормированным базисом в V_0 .

Наконец, пусть последовательность $\{f(x - k)\}_{k \in \mathbb{Z}^n}$ ортонормирована, где функция $f \in V_0$. Тогда эта последовательность является ортонормированным базисом в V_0 и $\hat{f}(\omega) = \theta(\omega)\hat{\varphi}(\omega)$, где $\theta(\omega) \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, $|\theta(\omega)| = 1$ почти всюду и $\theta(\omega + 2k\pi) = \theta(\omega)$ для любого $k \in \mathbb{Z}^n$.

Следующая теорема показывает, что ортогонализация (19.9) сохраняет регулярность КМА.

ТЕОРЕМА 19.2. Пусть $\{V_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$ – r -регулярный кратномасштабный анализ в $L^2(\mathbb{R}^n)$. Тогда функция $\varphi \in V_0$, определенная в (19.9), удовлетворяет оценке

$$(19.10) \quad |\partial^\alpha \varphi(x)| \leq C_m (1 + |x|)^{-m}$$

для любого целого $m \in \mathbb{N}$ и для любого мультииндекса $\alpha \in \mathbb{N}^n$, удовлетворяющего $|\alpha| \leq r$.

Покажем, как получить КМА в $L^2(\mathbb{R}^2)$, используя одномерный КМА $\{\mathcal{V}_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$ в $L^2(\mathbb{R})$. Определим $V_j \subset L^2(\mathbb{R}^2)$ как замыкание в $L^2(\mathbb{R}^2)$ -норме алгебраического тензорного произведения $\mathcal{V}_j \otimes \mathcal{V}_j$. Полученный КМА называют сепарабельным. Если многомерный КМА нельзя получить описанным способом, то его называют несепарабельным.

В сепарабельном случае ортонормированный базис в V_0 состоит из произведений $\varphi(x-k)\varphi(y-l)$, $(k, l) \in \mathbb{Z}^2$. Другими словами, полагая $\varphi(x, y) := \varphi(x)\varphi(y)$, получаем, что ортонормированный базис в V_0 является орбитой функции φ под действием $\mathbb{Z}^2$.

Пусть $\mathcal{W}_0$ – ортогональное дополнение $\mathcal{V}_0$ до $\mathcal{V}_1$. Тогда

$$V_1 = V_0 \oplus \overline{\mathcal{V}_0 \otimes \mathcal{W}_0} \oplus \overline{\mathcal{W}_0 \otimes \mathcal{V}_0} \oplus \overline{\mathcal{W}_0 \otimes \mathcal{W}_0}.$$

Действительно, $V_1 = \overline{(\mathcal{V}_0 \oplus \mathcal{W}_0) \otimes (\mathcal{V}_0 \oplus \mathcal{W}_0)}$ и достаточно воспользоваться дистрибутивностью тензорного произведения по отношению к сложению. Пусть W_0 обозначает ортогональное дополнение V_0 до V_1 . Тогда $W_0 = W_{0,1} \oplus W_{1,0} \oplus W_{1,1}$, где $W_{0,1} = \overline{\mathcal{V}_0 \otimes \mathcal{W}_0}$, $W_{1,0} = \overline{\mathcal{W}_0 \otimes \mathcal{V}_0}$, $W_{1,1} = \overline{\mathcal{W}_0 \otimes \mathcal{W}_0}$.

Для получения ортонормированного базиса в W_0 надо взять объединение последовательностей $\varphi(x-k)\psi(y-l)$, $\psi(x-k)\varphi(y-l)$ и $\psi(x-k)\psi(y-l)$, $k, l \in \mathbb{Z}^2$, которые являются ортонормированными базисами в $W_{0,1}$, $W_{1,0}$ и $W_{1,1}$.

Проблема построения всплескового базиса на основе КМА в $L^2(\mathbb{R}^n)$ в общем случае является более сложной. Однако в [30] доказана

ТЕОРЕМА 19.3. Пусть $\{V_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$ – r -регулярный кратномасштабный анализ в $L^2(\mathbb{R}^n)$. W_j – ортогональное дополнение V_j до V_{j+1} . Тогда существует $q := 2^n - 1$ функций $\psi_1, \dots, \psi_q$ из V_1 со следующими свойствами:

$$(19.11) \quad |\partial^\alpha \psi_l(x)| \leq C_N (1 + |x|)^{-N}$$

для любого мультииндекса $\alpha \in \mathbb{N}^n$ с $|\alpha| \leq r$, любого $x \in \mathbb{R}^n$ и любого $N \geq 1$

$\{\psi_l(x-k), 1 \leq l \leq q, k \in \mathbb{Z}^n\}$ является ортонормированным базисом в W_0 .

СЛЕДСТВИЕ 19.1. Функции $2^{nj/2}\psi_l(2^j x - k)$, $1 \leq l \leq q$, $k \in \mathbb{Z}^n$, $j \in \mathbb{Z}$, образуют ортонормированный базис в $L^2(\mathbb{R}^n)$.

ЗАМЕЧАНИЕ 19.1. Не известен метод построения несепарабельного многомерного КМА $\{V_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$ в $L^2(\mathbb{R}^n)$, у которого всплесковый базис состоит из компактных функций. Дело в том, что алгоритм К. Грошенига (К. Gröchenig) даже при применении к компактной масштабирующей функции φ не дает всплесков с компактным носителем. Очевидно, что сепарабельные многомерные всплески, полученные на основе всплесков Добеши, имеют компактный носитель.

20. Неравенства Бернштейна. Регулярность масштабирующей функции (19.7) позволяет рассматривать КМА $\{V_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$ не только в $L^2(\mathbb{R}^n)$, но и в других функциональных пространствах, например, в $L^p(\mathbb{R}^n)$, $p \in [1, \infty]$.

ЛЕММА 20.1. Пусть ортогональная масштабирующая функция φ удовлетворяет (19.7). Тогда существуют две константы $c_2 > c_1 > 0$ такие, что для любого $p \in [1, \infty]$ и любой конечной суммы $f(x) = \sum_k \alpha(k)\varphi(x-k)$ выполнены неравенства

$$(20.1) \quad c_1 \|f\|_p \leq \left(\sum_k |\alpha(k)|^p \right)^{1/p} \leq c_2 \|f\|_p.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Начнем с крайних случаев. При $p = \infty$

$$|f(x)| \leq \sum_k |\alpha(k)| |\varphi(x-k)| \leq \sup_k |\alpha(k)| C(\varphi),$$

где $C(\varphi) := \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \sum_{k \in \mathbb{Z}} |\varphi(x-k)|$. В другую сторону воспользуемся тем, что $\alpha(k) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \overline{\varphi}(x-k) dx$, поэтому $|\alpha(k)| \leq \|f\|_\infty \|\varphi\|_1$.

Случай $p = 1$ разбирается так же:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| dx &\leq \int_{\mathbb{R}^n} \sum_k |\alpha(k)| |\varphi(x-k)| dx \leq \sum_k |\alpha(k)| \|\varphi\|_1; \\ \sum_k |\alpha(k)| &\leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)| \sum_k |\varphi(x-k)| dx \leq C(\varphi) \|f\|_1. \end{aligned}$$

Рассмотрим общий случай. Пусть q – сопряженный показатель к p , т.е. $1/p + 1/q = 1$. Запишем $|\varphi(x-k)| = |\varphi(x-k)|^{1/p} |\varphi(x-k)|^{1/q}$, что дает

$$\begin{aligned} |f(x)| &\leq \sum_k |\alpha(k)| |\varphi(x-k)| \\ &\leq \left(\sum_k |\alpha(k)|^p |\varphi(x-k)| \right)^{1/p} \left(\sum_k |\varphi(x-k)| \right)^{1/q} \\ &\leq C(\varphi) \left(\sum_k |\alpha(k)|^p \right)^{1/p}, \end{aligned}$$

откуда следует левая часть неравенства (20.1). Для доказательства правой части используем то, что $\alpha(k) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) \overline{\varphi}(x-k) dx$, поэтому

$$|\alpha(k)| \leq \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^p |\varphi(x-k)| dx \right)^{1/p} \|\varphi\|_1^{1/q}.$$

Определим $V_0(p)$ как пересечение $V_0 \cap L^p(\mathbb{R}^n)$ для $1 \leq p \leq 2$ и как замыкание V_0 по $L^p(\mathbb{R}^n)$ -норме для $2 \leq p < \infty$. По лемме 20.1 $f \in V_0(p)$ тогда и только тогда, когда $f(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}^n} \alpha(k) \varphi(x-k)$, где $\alpha(k) \in l^p(\mathbb{Z}^n)$.

Определим $V_0(\infty)$ как векторное пространство, чьи элементы могут быть записаны как $f(x) = \lim f_m(x)$, где предел является равномерным на компактах и где $f_m \in V_0$ и $\sup_{m \geq 0} \|f_m\|_\infty < \infty$. Другими словами, $f \in V_0(\infty)$ тогда и только тогда, когда $f(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}^n} \alpha(k) \varphi(x-k)$, где $\alpha(k) \in l^\infty(\mathbb{Z}^n)$.

Наконец, определим $V_j(p)$: $f(\cdot) \in V_j(p) \Leftrightarrow f(2^{-j} \cdot) \in V_0(p)$. Очевидно, что $V_j(p)$ вложено в $L^p(\mathbb{R}^n)$.

ТЕОРЕМА 20.1 [2, с. 32]. Пусть V_j , $j \in \mathbb{Z}$, — r -регулярный кратномасштабный анализ в $L_2(\mathbb{R}^n)$. Тогда существует константа C такая, что для $1 \leq p \leq \infty$, $j \in \mathbb{Z}$, $f \in V_j(p)$ и $|\alpha| \leq r$ выполнено неравенство

$$(20.2) \quad \|\partial^\alpha f\|_p \leq C 2^{|\alpha|j} \|f\|_p.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Заменой переменной все сводится к случаю $j = 0$. Пусть $f(x) = \sum_k \alpha(k) \varphi(x - k)$. Тогда $|\partial^\alpha f(x)| \leq \sum_k |\alpha(k)| |\partial^\alpha \varphi(x - k)|$. Повторение рассуждений доказательства левого неравенства (20.1) дает $\|\partial^\alpha f\|_p \leq C (\sum_k |\alpha(k)|^p)^{1/p}$, что можно оценить, используя правое неравенство (20.1).

Напомним, что классическое неравенство Бернштейна утверждает, что для любого $\alpha \in \mathbb{N}^n$ $\|\partial^\alpha f\|_p \leq R^{|\alpha|} \|f\|_p$, где f — произвольная функция из $L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p \leq \infty$, чье преобразование Фурье имеет носитель в шаре $|\omega| \leq R$.

Таким образом, теорема 20.1 показывает, что по своим дифференциальным свойствам элементы V_j близки к целым функциям экспоненциального типа 2^j , их преобразование Фурье сосредоточено в полосе $[-2^j, 2^j]$.

21. Регулярные КМА и полиномы. Пусть $\{V_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$ — r -регулярный кратномасштабный анализ в $L_2(\mathbb{R}^n)$, $\{P_j: L^2(\mathbb{R}) \rightarrow V_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$ — ортогональные проекторы. Очевидно, что

$$(21.1) \quad P_0 f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} E(x, y) f(y) dy,$$

где $E(x, y) := \sum_{k \in \mathbb{Z}} \varphi(x - k) \overline{\varphi}(y - k)$, φ — ортогональная масштабирующая функция. Для произвольного $j \in \mathbb{Z}$

$$P_j f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} E_j(x, y) f(y) dy,$$

где $E_j(x, y) := 2^{nj} E(2^j x, 2^j y)$. Перечислим простейшие свойства ядер.

ЛЕММА 21.1.

$$(21.2) \quad |\partial_x^\alpha \partial_y^\beta E(x, y)| \leq C_m (1 + |x - y|)^{-m}$$

для любых $m \in \mathbb{N}$, $|\alpha| \leq r$, $|\beta| \leq r$;

$$(21.3) \quad E(x + k, y + k) = E(x, y), \quad k \in \mathbb{Z}^n; \\ \lim_{j \rightarrow \infty} \|P_j f - f\|_{L^2(\mathbb{R})} = 0.$$

Для доказательства последнего свойства в функциональных пространствах, отличных от $L^2(\mathbb{R}^n)$, нам потребуется следующий фундаментальный результат, показывающий, что полиномы степени не выше r инвариантны относительно проекторов P_j r -регулярного КМА (точная формулировка в следствии 21.1 ниже).

ТЕОРЕМА 21.1 [2, с. 33]. Для любого мультииндекса $\alpha \in \mathbb{N}^n$ с порядком $|\alpha| \leq r$ выполняется равенство

$$(21.4) \quad \int_{\mathbb{R}^n} E(x, y) y^\alpha dy = x^\alpha.$$

СХЕМА ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. В доказательстве существенную роль играет вложение $V_0 \subset V_j, j \in \mathbb{N}$, которое на языке проекторов превращается в равенство $P_0 = P_j P_0$, или, в терминах ядер:

$$(21.5) \quad E(x, y) = 2^{nj} \int_{\mathbb{R}^n} E(2^j x, 2^j u) E(u, y) du.$$

Рассмотрим сначала случай $r = 0$. Надо доказать, что

$$(21.6) \quad \int_{\mathbb{R}^n} E(x, y) dy = 1 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

Свойство (21.2) имеет вид:

$$(21.7) \quad |E(x, y)| \leq C_m (1 + |x - y|^{-m}) \quad \forall m \in \mathbb{N}.$$

Пусть $\mu_0(x) := \int_{\mathbb{R}^n} E(x, y) dy$. В силу (21.3) μ_0 является $\mathbb{Z}^n$ -периодической функцией:

$$(21.8) \quad \mu_0(x + k) = \mu_0(x) \quad \forall k \in \mathbb{Z}^n.$$

Равенство (21.6) получается предельным переходом из (21.5) при помощи следующего результата.

ЛЕММА 21.2 [2, с. 34]. Для любого $y \in \mathbb{R}^n$ и для почти всех $x \in \mathbb{R}^n$ имеем

$$(21.9) \quad \lim_{j \rightarrow \infty} \left\{ 2^{nj} \int_{\mathbb{R}^n} E(2^j x, 2^j u) E(u, y) du - \mu_0(2^j x) E(x, y) \right\} = 0.$$

Доказательство этой леммы основано на свойствах точек Лебега.

Из (21.9) с помощью (21.5) получаем, что для почти всех $x \in \mathbb{R}^n$

$$(21.10) \quad \lim_{j \rightarrow \infty} (1 - \mu_0(2^j x)) E(x, y) = 0 \quad \forall y \in \mathbb{R}^n.$$

Умножая (21.10) на $f \in V_0$ и интегрируя, имеем

$$(21.11) \quad \lim_{j \rightarrow \infty} \mu_0(2^j x) f(x) = f(x) \quad \forall f \in V_0.$$

Заменой переменных получаем то же самое для $f \in V_{j_0}, j_0 \geq 0$. Так как μ_0 принадлежит $L_\infty(\mathbb{R}^n)$, сходимость в (21.11) имеет место в $L_2(\mathbb{R}^n)$.

Из (19.2) следует, что (21.11) имеет место для любой $f \in L_2(\mathbb{R}^n)$. В частности, полагая $f = \kappa_{[0,1]^n}$ и используя периодичность μ_0 (см. (21.8)), имеем

$$\int_{[0,1]^n} |1 - \mu_0(x)|^2 dx = \int_{[0,1]^n} |1 - \mu_0(2^j x)|^2 dx \rightarrow 0 \quad \text{при } j \rightarrow \infty.$$

Откуда следует, что $\mu_0(x) = 1$.

Для $r = 0$ результат можно доказать проще, однако приведенное доказательство без больших изменений переносится на $r \geq 1$.

Разложим $E(u, y)$ в ряд Тейлора по степеням $u - x$ для того, чтобы оценить

$$2^{nj} \int E(2^j x, 2^j u) E(u, y) du.$$

Имеем

$$(21.12) \quad E(u, y) = \sum_{0 \leq |\alpha| < r} \frac{(u - x)^\alpha}{\alpha!} \partial_x^\alpha E(x, y) + R(u, x, y),$$

где

$$R(u, x, y) := \sum_{|\alpha|=r} \frac{(u - x)^\alpha}{\alpha!} S_\alpha(u, x, y),$$

$$S_\alpha(u, x, y) := r \int_0^1 \partial_x^\alpha E(tu + (1 - t)x, y) (1 - t)^{r-1} dt.$$

Сделаем замену $u = x + 2^{-j}s$, которая превращает $S_\alpha(u, x, y)$ в

$$(21.13) \quad S_\alpha^{(j)}(s, x, y) = r \int_0^1 \partial_x^\alpha E(x + t2^{-j}s, y) (1 - t)^{r-1} dt.$$

Обозначим

$$(21.14) \quad \mu_\alpha(x) := \frac{1}{\alpha!} \int_{\mathbb{R}^n} E(x, u) (u - x)^\alpha du.$$

Функция $\mu_\alpha(x)$ является непрерывной и $\mathbb{Z}^n$ -периодической (см. (21.8)). Подставляя (21.13), (21.14) в (21.12) и в (21.5), получим, что

$$(21.15) \quad \begin{aligned} & 2^{nj} \int_{\mathbb{R}^n} E(2^j x, 2^j u) E(u, y) du \\ &= \sum_{0 \leq |\alpha| < r} 2^{-j|\alpha|} \mu_\alpha(2^j x) \partial_x^\alpha E(x, y) \\ & \quad + r 2^{-jr} \sum_{|\alpha|=r} \int_{\mathbb{R}^n} \int_0^1 E(2^j x, 2^j x + s) \frac{s^\alpha}{\alpha!} \partial_x^\alpha E(x + t2^{-j}s, y) (1 - t)^{r-1} dt ds \\ &= E(x, y). \end{aligned}$$

Доказательство того, что $\mu_\alpha(x) = 0$, проводится индукцией по $p := |\alpha| \in [1, r]$. Разберем случай $p = 1$. В (21.15) $E(x, y)$ сокращается, так как $\mu_0(x) = 1$. Поэтому

$$(21.16) \quad \sum_{1 \leq |\alpha| \leq r-1} 2^{-j|\alpha|} \mu_\alpha(2^j x) \partial_x^\alpha E(x, y) + O(2^{-jr}) = 0,$$

где оценка O равномерна по x и y . Умножим (21.16) на 2^j и перейдем к пределу:

$$(21.17) \quad \lim_{j \rightarrow \infty} \sum_{|\alpha|=1} \mu_\alpha(2^j x) \partial_x^\alpha E(x, y) = 0.$$

Теперь мы повторяем анализ, проделанный для случая $r = 0$. Умножим (21.17) на $f \in V_0$ и проинтегрируем:

$$(21.18) \quad \lim_{j \rightarrow \infty} \sum_{|\alpha|=1} \mu_\alpha(2^j x) \partial_x^\alpha f = 0.$$

Пусть g – непрерывная $\mathbb{Z}^n$ -периодическая функция. Умножим (21.18) на произведение $g(2^j x)h(x)$, где $h \in D(\mathbb{R}^n)$, и проинтегрируем. Перейдем к пределу по $j \rightarrow \infty$ и воспользуемся хорошо известной леммой.

ЛЕММА 21.3. *Если $u(x) \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$ является $\mathbb{Z}^n$ -периодической функцией и $v(x) \in L^1(\mathbb{R}^n)$, то*

$$(21.19) \quad \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}^n} u(Nx)v(x) dx = \left(\int u \right) \int_{\mathbb{R}^n} v(x) dx,$$

где

$$\int u = \int_0^1 \cdots \int_0^1 u(x_1, \dots, x_n) dx_1 \cdots dx_n.$$

Окончательно получим, что

$$(21.20) \quad \sum_{|\alpha|=1} \left(\int g \mu_\alpha \right) \langle \partial^\alpha f, h \rangle = 0.$$

Полагая $c_\alpha = \int g \mu_\alpha$, из (21.20) получаем, что векторное поле $\sum_{|\alpha|=1} c_\alpha \partial^\alpha$ аннулирует любую функцию из V_0 . Заменой переменной устанавливается, что аннигиляция имеет место для любой функции из V_j , $j \in \mathbb{N}$. Учитывая (19.1), получаем это свойство (в смысле обобщенных функций) для всех $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$. Таким образом, $c_\alpha = 0$ для любой функции g , что означает, что $\mu_\alpha = 0$ при $|\alpha| = 1$.

Для $p = |\alpha| < r$ доказательство проходит без каких-либо изменений. Мы получаем, что $\mu_\alpha = 0$ при $|\alpha| < r$.

Остается разобраться со случаем $|\alpha| = r$. Равенство (21.15) превращается в

$$(21.21) \quad r \sum_{|\alpha|=r} \int_{\mathbb{R}^n} \int_0^1 E(2^j x, 2^j x + s) \frac{s^\alpha}{\alpha!} \partial_x^\alpha E(x + t2^{-j}s, y) (1-t)^{r-1} dt ds = 0.$$

Воспользуемся тем, что $\partial_x^\alpha E(x, y) \in L^\infty(dx)$ для любого фиксированного y . Почти все точки $x \in \mathbb{R}^n$ являются точками Лебега рассматриваемой функции. Если x – точка Лебега, то в (21.21) $\partial_x^\alpha E(x + t2^{-j}s, y)$ можно заменить на $\partial_x^\alpha E(x, y)$. Таким образом, предел по j

$$\begin{aligned} S_j(x, y) &:= r \sum_{|\alpha|=r} \int_{\mathbb{R}^n} \int_0^1 E(2^j x, 2^j x + s) \frac{s^\alpha}{\alpha!} \partial_x^\alpha E(x, y) (1-t)^{r-1} dt ds \\ &= r \sum_{|\alpha|=r} \int_{\mathbb{R}^n} E(2^j x, 2^j x + s) \frac{s^\alpha}{\alpha!} \partial_x^\alpha E(x, y) ds \int_0^1 (1-t)^{r-1} dt \\ &= \sum_{|\alpha|=r} \mu_\alpha(2^j x) \partial_x^\alpha E(x, y) \end{aligned}$$

равен 0 для любого $y \in \mathbb{R}^n$ и для почти всех $x \in \mathbb{R}^n$. Функции $S_j(x, y)$ удовлетворяют равномерной оценке $|S_j(x, y)| \leq C_m(1 + |x - y|)^{-m}$. Умножая на $f \in V_0$ и интегрируя, находим, что $\sum_{|\alpha|=r} \mu_\alpha(2^j x) \partial_x^\alpha f$ сходится к 0 почти всюду и в $L^2(\mathbb{R}^n)$, так как можно применить теорему Лебега. Так же как и в случае $s < r$, заключаем, что все коэффициенты μ_α обнуляются при $|\alpha| = r$.

Итак, доказано, что $\int_{\mathbb{R}^n} E(x, y)(x-y)^\alpha dy = 0$ для $1 \leq |\alpha| \leq r$ и $\int_{\mathbb{R}^n} E(x, y) dy = 1$. Отсюда следует, что $\int_{\mathbb{R}^n} E(x, y)y^\alpha dy = x^\alpha$ при $|\alpha| \leq r$. Действительно, запишем

$$\frac{y^\alpha}{\alpha!} = \sum_{\beta+\gamma=\alpha} \frac{(y-x)^\beta}{\beta!} \frac{x^\gamma}{\gamma!}$$

и, после интегрирования по y , все члены в правой части обнуляются, за исключением $\beta = 0$ и $\gamma = \alpha$.

Теорема 21.1 может быть переформулирована, если расширить область определения проекторов P_j на объединение пространств $L^2(\mathbb{R}^n, (1 + |x|)^{-m} dx)$, $m \in \mathbb{N}$. Такое расширение возможно, так как ядра проекторов P_j убывают быстрее любой степени при $|y - x|$, стремящемся к бесконечности. Пространство образов теперь будет отличаться от V_j , но будет полным по норме $L^2(\mathbb{R}^n, (1 + |x|)^{-m} dx)$.

СЛЕДСТВИЕ 21.1. Пусть V_j – r -регулярный кратномасштабный анализ в $L_2(\mathbb{R}^n)$ и пусть $P_j: L^2(\mathbb{R}^n) \rightarrow V_j$ – ортогональный проектор на V_j . Тогда $P_j(M) = M$ для любого полинома M степени меньше или равной r .

Значение теоремы 21.1 состоит в том, что она устанавливает сходство проекторов P_j с операторами свертки. Последние коммутируют с операторами частичного дифференцирования, тогда как операторы P_j коммутируют приближенно с ∂^α при $|\alpha| \leq r$.

Зафиксируем функцию $g \in D(\mathbb{R}^n)$ с интегралом, равным 1. Обозначим через g_j функцию $2^{nj}g(2^j x)$ и через G_j – оператор свертки с g_j , $j \in \mathbb{Z}$. Теорема 21.1 позволяет сравнить $\partial^\alpha P_j$ с $G_j \partial^\alpha$ для мультииндексов α с $|\alpha| \leq r$.

ТЕОРЕМА 21.2. Пусть V_j , $j \in \mathbb{Z}$, — r -регулярный кратномасштабный анализ в $L^2(\mathbb{R}^n)$. Тогда для любого мультииндекса α с $|\alpha| \leq r$ существуют функции $R^{(\alpha, \beta)}(x, y) \in L^\infty(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$, заиндексированные мультииндексами β с $|\beta| = |\alpha|$ и удовлетворяющие неравенствам

$$(21.22) \quad |R^{(\alpha, \beta)}(x, y)| \leq C_m(1 + |x - y|)^{-m}$$

для любого $m \in \mathbb{N}$. Эти функции удовлетворяют также равенству

$$(21.23) \quad \int_{\mathbb{R}^n} R^{(\alpha, \beta)}(x, y) dy = 0$$

тождественно по x и определяют для любого $j \in \mathbb{Z}$ операторы

$$(21.24) \quad R_j^{(\alpha, \beta)} f(x) := 2^{nj} \int_{\mathbb{R}^n} R^{(\alpha, \beta)}(2^j x, 2^j y) f(y) dy,$$

для которых верно следующее тождество:

$$(21.25) \quad \partial^\alpha P_j = G_j \partial^\alpha + \sum_{|\beta|=|\alpha|} R_j^{(\alpha, \beta)} \partial^\beta,$$

где $\partial^\alpha = (\partial/\partial x_1)^{\alpha_1} \dots (\partial/\partial x_n)^{\alpha_n}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Ясно, что (21.25) достаточно доказать для $j = 0$. Общий случай получается заменой переменных.

Зафиксировав x , рассмотрим $\partial_x^\alpha E(x, y)$ как функцию по y . По теореме 21.1 имеем $\int_{\mathbb{R}^n} \partial_x^\alpha E(x, y) y^\beta dy = 0$ при $|\beta| \leq |\alpha|$ и $\beta \neq \alpha$, тогда как $\int_{\mathbb{R}^n} \partial_x^\alpha E(x, y) y^\alpha dy = \alpha!$.

Заметим теперь, что ядро $g(x - y)$ оператора $G := G_0$ имеет такие же свойства: $\int_{\mathbb{R}^n} \partial_x^\alpha g(x - y) y^\beta dy = 0$ при $|\beta| \leq |\alpha|$ и $\beta \neq \alpha$, $\int_{\mathbb{R}^n} \partial_x^\alpha g(x - y) y^\alpha dy = \alpha!$.

Рассмотрим разность $R^\alpha(x, y) := \partial_x^\alpha E(x, y) - \partial_x^\alpha g(x - y)$, для которой

$$\int_{\mathbb{R}^n} R^\alpha(x, y) y^\beta dy = 0 \quad \text{при } |\beta| \leq |\alpha|.$$

Рассмотрим $f^\alpha(x, y) := R^\alpha(x, x + y) = \partial_x^\alpha E(x, x + y) - \partial_x^\alpha g(-y)$ как функцию от y при фиксированном x . Эта функция принадлежит пространству $S_r(\mathbb{R}^n)$, которое определяется следующим образом.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 21.1. $S_r(\mathbb{R}^n)$ — это векторное пространство функций f , удовлетворяющих неравенствам $|\partial^\alpha f(x)| \leq C_m(1 + |x|)^{-m}$ для любого $m \in \mathbb{N}$ и любого мультииндекса $\alpha \in \mathbb{N}^n$ с $|\alpha| \leq r$.

ЛЕММА 21.4. Пусть $0 \leq s \leq r$. Если f принадлежит $S_r(\mathbb{R}^n)$ и удовлетворяет условиям $\int_{\mathbb{R}^n} f(x) x^\alpha dx = 0$ для любого $\alpha \in \mathbb{N}^n$ с $|\alpha| \leq r$, то

$$f(x) = \sum_{|\alpha|=s} \partial^\alpha f_\alpha(x),$$

где $f_\alpha \in S_r(\mathbb{R}^n)$ и $\int_{\mathbb{R}^n} f_\alpha(x) dx = 0$ для любого $\alpha \in \mathbb{N}^n$ с $|\alpha| = s$.

Доказательство леммы проводится индукцией по размерности n . При $n = 1$ f_s является первообразной для f порядка s , которая стремится к 0 на бесконечности.

Применим лемму к функции $f^\alpha(x, y)$, которую будем рассматривать как функцию по y , зависящую от параметра x . Получаем, что

$$(21.26) \quad \partial_x^\alpha E(x, y) = (-1)^{|\alpha|} \partial_y^\alpha g(x - y) + \sum_{|\beta|=|\alpha|} \partial_y^\beta R^{(\alpha, \beta)}(x, y),$$

где $|R^{(\alpha, \beta)}(x, y)| \leq C_m (1 + |x - y|)^{-m}$ для любых $m \in \mathbb{N}$. Более того,

$$\int_{\mathbb{R}^n} R^{(\alpha, \beta)}(x, y) dy = 0$$

для любого x . Интегрирование по частям показывает, что ядро оператора $G_0 \partial^\alpha$ совпадает с $(-1)^{|\alpha|} \partial_y^\alpha g(x - y)$.

ЗАМЕЧАНИЕ 21.1. Функции f_α из леммы 21.4 линейно и непрерывно зависят от f . Например, если f является непрерывной функцией некоторых параметров, то то же будет верно для функций f_α . Это означает, что функции $R^{(\alpha, \beta)}$ будут непрерывными по всем переменным, если масштабирующая функция φ принадлежит $C^r(\mathbb{R}^n)$.

ЗАМЕЧАНИЕ 21.2. Аналогичными рассуждениями доказывается, что

$$P_{j+1} - P_j = 2^{-jr} \sum_{|\beta|=r} R_j^{(\beta)} \partial^\beta,$$

где $R_j^{(\beta)}$ определяются ядрами $2^{nj} R^{(\beta)}(2^j x, 2^j y)$ и $R^{(\beta)}$ удовлетворяют свойствам, аналогичным свойствам $R^{(\alpha, \beta)}$.

22. КМА в пространствах Соболева.

ТЕОРЕМА 22.1. Пусть $r \in \mathbb{N}$ и V_j , $j \in \mathbb{Z}$, является r -регулярным кратномасштабным анализом в $L_2(\mathbb{R}^n)$. Если f принадлежит пространству Соболева $W_2^s(\mathbb{R}^n)$ и $-r \leq s \leq r$, то $P_j(f)$ сходится к f в $W_2^s(\mathbb{R}^n)$ -норме.

В доказательстве этой теоремы используется следующая лемма.

ЛЕММА 22.1. Пусть $K(x, y)$ — функция из $L^\infty(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$, удовлетворяющая неравенству $|K(x, y)| \leq C(1 + |x - y|)^{-n-1}$, и

$$T_\lambda: L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n), \quad 1 \leq p \leq \infty, \quad \lambda > 0,$$

операторы с ядрами $\lambda^n K(\lambda x, \lambda y)$, $T_\lambda f(x) = \lambda^n \int_{\mathbb{R}^n} K(\lambda x, \lambda y) f(y) dy$. Если

$$\int_{\mathbb{R}^n} K(x, y) dy = 0$$

тождественно по x и $1 \leq p < \infty$, то

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \|T_\lambda(f)\|_p = 0 \quad \text{для} \quad f \in L^p.$$

Если $\int_{\mathbb{R}^n} K(x, y) dy = 1$ тождественно по x и $1 \leq p < \infty$, то

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \|T_\lambda(f) - f\|_p = 0 \quad \text{для} \quad f \in L^p.$$

При $p = \infty$ предположим в дополнение, что f является равномерно непрерывной и что $K(x, y)$ является непрерывной функцией по x при каждом фиксированном y . Тогда, если $\int_{\mathbb{R}^n} K(x, y) dy = 1$ и $f \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$, то

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \|T_\lambda(f) - f\|_\infty = 0.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Во-первых, заметим, что норма оператора $T_\lambda: L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)$ является конечной и не зависит от λ .

Если $1 \leq p < \infty$, то достаточно рассмотреть плотное подмножество в $L^p(\mathbb{R}^n)$. Пусть f — непрерывная функция с компактным носителем. Тогда $T_\lambda f(x)$ является $O(|x|^{-n-1})$ при $|x| \rightarrow \infty$ равномерно по $\lambda \geq 1$. Так как $\int_{\mathbb{R}^n} K(x, y) dy = 0$, то

$$T_\lambda f(x) = \lambda^n \int_{\mathbb{R}^n} K(\lambda x, \lambda y) f(y) dy = \lambda^n \int_{\mathbb{R}^n} K(\lambda x, \lambda y) (f(y) - f(x)) dy,$$

что меньше, чем

$$C \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |y|)^{-n-1} w(\lambda^{-1}|y|, f) dy =: \epsilon(\lambda),$$

где w — модуль непрерывности f . Из теоремы Лебега о доминируемой сходимости следует, что $\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \epsilon(\lambda) = 0$. Таким образом, функции $T_\lambda f(x)$ сходятся к 0 равномерно по x и равномерно по λ являются $O(|x|^{-n-1})$ при $|x| \rightarrow \infty$. Значит, они сходятся к 0 в $L^p(\mathbb{R}^n)$ -норме.

Второй случай леммы, когда $\int_{\mathbb{R}^n} K(x, y) dy = 1$, является следствием первого. Пусть g — непрерывная функция с компактным носителем, чей интеграл равен 1. Заменим $K(x, y)$ на $R(x, y) := K(x, y) - g(x - y)$ и применим первый случай.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТЕОРЕМЫ 22.1. Пусть $s = r$. Надо доказать, что для $f \in W_2^s(\mathbb{R}^n)$ и $|\alpha| \leq r$

$$\lim_{j \rightarrow \infty} \|\partial^\alpha P_j(f) - \partial^\alpha f\|_2 = 0.$$

По теореме 21.2 имеем $\partial^\alpha P_j = G_j \partial^\alpha + \sum_{|\beta|=|\alpha|} R_j^{(\alpha, \beta)} \partial^\beta$, поэтому достаточно применить лемму 22.1.

Если s не целое и $0 < s < r$, то заметим, что операторы $P_j: W_2^s \rightarrow W_2^s$ равномерно ограничены. Это следует из крайних случаев $s = 0$, $s = r$ и следующей интерполяционной теоремы.

УТВЕРЖДЕНИЕ 22.1. *Любой непрерывный оператор $T: L^2 \rightarrow L^2$, чье сужение на пространство Соболева W_2^r является непрерывным линейным оператором из W_2^r в W_2^r , является также непрерывным оператором из W_2^s в W_2^s для $0 < s < r$. Если нормы T как оператора в L^2 и W_2^r обозначить C_0 и C_1 соответственно, то норма T как оператора в W_2^s , $0 < s < r$, не превосходит $\max(C_0, C_1)$.*

Из равномерной ограниченности операторов P_j и плотности $W_2^r(\mathbb{R}^n)$ в $W_2^s(\mathbb{R}^n)$ следует утверждение теоремы.

Для доказательства теоремы 22.1 при $-r \leq s \leq 0$ нужно сначала определить P_j на $W_2^s(\mathbb{R}^n)$. Заметим, что $L^2(\mathbb{R}^n)$ плотно в $W_2^s(\mathbb{R}^n)$. Если f и g принадлежат $L^2(\mathbb{R}^n)$, то $(P_j(f), g) = (f, P_j(g))$. Теперь мы предположим, что f принадлежит $W_2^s(\mathbb{R}^n)$, где $-r \leq s \leq 0$, и что f_m — это последовательность функций $L^2(\mathbb{R}^n)$, сходящаяся к f в $W_2^s(\mathbb{R}^n)$ -норме. Тогда для $t = -s$ и $g \in W_2^t(\mathbb{R}^n)$ имеем

$$(P_j(f_m), g) = (f_m, P_j(g)) \rightarrow (f, P_j(g)) \quad \text{при } m \rightarrow \infty.$$

Поэтому мы определяем $P_j(f) \in W_2^s(\mathbb{R}^n)$ следующим образом:

$$(P_j(f), g) = (f, P_j(g)).$$

Так как $P_j^2 = P_j$, то $(P_j(f), P_j(g)) = (P_j(f), g)$.

По двойственности операторы $P_j: W_2^s(\mathbb{R}^n) \rightarrow W_2^s(\mathbb{R}^n)$ равномерно ограничены. Кроме того, $L^2(\mathbb{R}^n)$ плотно в $W_2^s(\mathbb{R}^n)$ и $P_j(f)$ сходится к f для $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$. Из этого следует, что $P_j(f)$ сходится к f в $W_2^s(\mathbb{R}^n)$ -норме. Стандартным способом доказывается, что $\lim_{j \rightarrow \infty} P_j(f) = f$ для распределений f , принадлежащих $W_2^s(\mathbb{R}^n)$ при $-r \leq s < 0$.

ЗАМЕЧАНИЕ 22.1. Теорему 22.1 можно обобщить на пространства W_p^s с $-r \leq s \leq r$ и $1 < p < \infty$. Для функций и распределений $f \in W_p^s$ проекции $P_j(f)$ сходятся к f в W_p^s -норме.

Случай $p = \infty$ требует отдельного рассмотрения. Определим пространство W_∞^m , $m \in \mathbb{N}$, условием, что $\partial^\alpha f$ принадлежат $L^\infty(\mathbb{R}^n)$ для любых α с $|\alpha| \leq m$. Тогда для $f \in W_\infty^m$, $0 \leq m \leq r$, последовательность $P_j(f)$ равномерно ограничена в W_∞^m и слабо сходится к f , т.е.

$$\int P_j(f)g \, dx \rightarrow \int fg \, dx \quad \forall g \in S(\mathbb{R}^n).$$

Можно заменить $W_\infty^m(\mathbb{R}^n)$ на пространство $C_\infty^m(\mathbb{R}^n)$, определяемое условием, что все производные $\partial^\alpha f$, $|\alpha| \leq m$, ограничены и равномерно непрерывны на $\mathbb{R}^n$. Тогда для любой функции $f \in C_\infty^m(\mathbb{R}^n)$ проекции $P_j(f)$ сходятся к f в $C_\infty^m(\mathbb{R}^n)$ -норме при $0 \leq m < r$. Если масштабирующая функция φ принадлежит $C_\infty^m(\mathbb{R}^n)$ и быстро убывает на бесконечности вместе со всеми производными порядка $|\alpha| \leq r$, то сходимость имеет место и при $m = r$.

Если $\varphi \in C^m(\mathbb{R}^n)$ и имеет компактный носитель, то $P_j(f)$ сходятся к $f \in C^m(\mathbb{R}^n)$ в $C^m(\mathbb{R}^n)$ -норме.

23. Операторы $Q_j = P_{j+1} - P_j$. Пусть V_j , $j \in \mathbb{Z}$, r -регулярный КМА в $L^2(\mathbb{R}^n)$ и W_j — ортогональное дополнение V_j до V_{j+1} . Ортогональный проектор из $L^2(\mathbb{R}^n)$ на W_j равен $Q_j = P_{j+1} - P_j$. Ясно, что $f(\cdot) \in W_0$ тогда и только тогда, когда $f(2^j \cdot) \in W_j$. Кроме того,

$$(23.1) \quad L^2(\mathbb{R}^n) = \bigoplus_{-\infty}^{\infty} W_j,$$

так как объединение V_j плотно в $L^2(\mathbb{R}^n)$, а пересечение V_j равно $\{0\}$. Любую функцию $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$ можно разложить в ортогональный ряд

$$(23.2) \quad f = \sum_{-\infty}^{\infty} Q_j(f).$$

Покажем, что классические нормы пространств функций и распределений легко вычисляются с использованием этого разложения.

Распространим разложение (23.1) на $L^p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p \leq \infty$. Если $1 \leq p \leq 2$, то $W_j(p)$ определим как пересечение W_j с $L^p(\mathbb{R}^n)$, что согласовано с определением $V_j(p)$ (см. раздел 20). Тогда $V_{j+1}(p) = V_j(p) + W_j(p)$, где сумма прямая, но не ортогональная. Операторы P_j и Q_j , проектирующие $V_{j+1}(p)$ на $V_j(p)$ и $W_j(p)$ соответственно, являются непрерывными в $L^p(\mathbb{R}^n)$ (см. лемму 22.1). Кроме того, при $1 < p \leq 2$ для любой функции $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ $\|P_j f\|_p \rightarrow 0$ при $j \rightarrow -\infty$. Таким образом, функция $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ может быть единственным образом записана в виде

$$(23.3) \quad f = \sum_{-\infty}^{\infty} q_j, \quad q_j \in W_j(p),$$

где частные суммы сходятся к f в $L_p(\mathbb{R}^n)$ при $1 < p \leq 2$.

В случае $2 \leq p < \infty$ пространства $W_j(p)$ определяются как замыкание W_j в $L^p(\mathbb{R}^n)$. Тогда (23.3) распространяется на $L^p(\mathbb{R}^n)$, $2 \leq p < \infty$.

Для $p = \infty$ $W_j(p)$ — это замыкание W_j в $L^\infty(\mathbb{R}^n)$ с топологией $\sigma(L^\infty, L^1)$.

Следующий результат дополняет и уточняет неравенства Бернштейна.

ТЕОРЕМА 23.1. Пусть $V_j, j \in \mathbb{Z}$, – r -регулярный кратномасштабный анализ в $L^2(\mathbb{R}^n)$. Тогда существуют две константы $C_2 \geq C_1 > 0$ такие, что для любого целого $s \in \mathbb{N}$, $s \in [0, r]$, для любого $p \in [1, \infty]$ и любой функции $f \in W_0(p)$

$$(23.4) \quad C_1 \|f\|_p \leq \sum_{|\alpha|=s} \|\partial^\alpha f\|_p \leq C_2 \|f\|_p.$$

Если s не целое и $0 < s < r$, то

$$(23.5) \quad C_1 \|f\|_p \leq \|\Lambda^s f\|_p \leq C_2 \|f\|_p,$$

где $\Lambda = (-\Delta)^{1/2}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Правая часть (23.4) полностью совпадает с (20.2). Для доказательства левой части обозначим через $Q(x, y)$ ядро проектора $Q_0 = P_1 - P_0$. Тогда очевидно, что $f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} Q(x, y) f(y) dy$, если $f \in W_0$. С одной стороны, $|Q(x, y)| \leq C_m (1 + |x - y|)^{-m}$ для любого $m \in \mathbb{N}$. С другой, $Q(x, y) = 2^n E(2x, 2y) - E(x, y)$, где $E(x, y)$ – ядро P_0 , следовательно, по теореме 21.1

$$\int_{\mathbb{R}^n} Q(x, y) y^\alpha dy = 0 \quad \text{при} \quad |\alpha| \leq r.$$

Используя лемму 21.4, получим, что $Q(x, y) = \sum_{|\beta|=s} \partial_y^\beta Q_\beta(x, y)$, где функции Q_β также удовлетворяют условиям $|Q_\beta(x, y)| \leq C'_m (1 + |x - y|)^{-m}$ для любого $m \in \mathbb{N}$. Таким образом,

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} Q(x, y) f(y) dy = (-1)^s \sum_{|\beta|=s} \int_{\mathbb{R}^n} Q_\beta(x, y) \partial^\beta f(y) dy.$$

Так как ядра $Q_\beta(x, y)$ определяют ограниченные операторы в $L^p(\mathbb{R}^n)$ при $1 \leq p \leq \infty$ (см. доказательство леммы 22.1), то левая часть (23.4) доказана.

Пусть s – не целое и $m \in \mathbb{Z}$ такое, что $m < s < m + 1$. Для Q_0 имеют место два представления $Q_0 = \sum_{|\beta|=m} Q_\beta \partial^\beta = \sum_{|\beta|=m+1} Q_\beta \partial^\beta$, которые приводят к равенству $Q_0 = G \Lambda^s$, где G – оператор, который ограничен во всех $L_p(\mathbb{R}^n)$, $1 \leq p \leq \infty$. Действительно, определим оператор свертки U , соответствующий мультипликатору $u(\xi) \in D(\mathbb{R}^n)$, который радиален, равен 1 при $|\xi| \leq 1/2$ и равен 0 при $|\xi| \geq 1$. Пусть $V := I - U$. Тогда

$$\begin{aligned} Q_0 &= Q_0 U + Q_0 V = \sum_{|\beta|=m+1} Q_\beta \partial^\beta \Lambda^{-s} U \Lambda^s + \sum_{|\beta|=m} Q_\beta \partial^\beta \Lambda^{-s} V \Lambda^s \\ &= \left(\sum_{|\beta|=m+1} Q_\beta \partial^\beta \Lambda^{-s} U + \sum_{|\beta|=m} Q_\beta \partial^\beta \Lambda^{-s} V \right) \Lambda^s =: G \Lambda^s. \end{aligned}$$

Непрерывность G в $L^p(\mathbb{R}^n)$ следует из непрерывности операторов $\partial^\beta \Lambda^{-s} U$, $|\beta| = m + 1$, и $\partial^\beta \Lambda^{-s} V$, $|\beta| = m$, в $L^p(\mathbb{R}^n)$, которые являются операторами свертки, соответствующими мультипликаторам $\xi^\beta |\xi|^{-s} u(\xi)$, $|\beta| = m + 1$, и $\xi^\beta |\xi|^{-s} (1 - u(\xi))$, $|\beta| = m$, (с точностью до степени i). Эти функции являются преобразованиями Фурье интегрируемых функций, что завершает доказательство.

СЛЕДСТВИЕ 23.1. Если $1 \leq p \leq \infty$ и f принадлежит $W_j(p)$, то

$$(23.6) \quad C_1 2^{js} \|f\|_p \leq \sum_{|\alpha|=s} \|\partial^\alpha f\|_p \leq C_2 2^{js} \|f\|_p$$

при целом $s \in [0, r]$.

В общем случае действительного $s \in [0, r]$

$$(23.7) \quad C_1 2^{js} \|f\|_p \leq \|\Lambda^s f\|_p \leq C_2 2^{js} \|f\|_p.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Для доказательства достаточно сделать замену переменных в (23.4) и (23.5).

Заметим, что при $j \in \mathbb{N}$ Λ^s можно заменить в (23.7) на $(I - \Delta)^{s/2}$. Ясно, что при $1 \leq p \leq \infty$ $\|\Lambda^s f\|_p \leq C(s, n) \|(I - \Delta)^{s/2} f\|_p$. Достаточно сравнить преобразования Фурье $\Lambda^s f$ и $(I - \Delta)^{s/2} f$. С другой стороны, $\|(I - \Delta)^{s/2} f\|_p \leq C'(s, n) \|(I + \Lambda^s) f\|_p$ при $1 \leq p \leq \infty$.

УТВЕРЖДЕНИЕ 23.1. Если $-r \leq s \leq r$, $1 \leq p \leq \infty$ и $f \in W_j(p)$ для $j \in \mathbb{N}$, то

$$(23.8) \quad C'_1 2^{js} \|f\|_p \leq \|(I - \Delta)^{s/2} f\|_p \leq C'_2 2^{js} \|f\|_p,$$

где $C'_2 > C'_1 > 0$ – константы.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. В доказательстве нуждается только случай $-r \leq s < 0$, так как случай $0 \leq s \leq r$ рассмотрен в следствии 23.1. Замена переменной $x \mapsto 2^j x$ сводит доказательство к следующим неравенствам

$$(23.9) \quad C'_1 \|f\|_p \leq \|(\epsilon I - \Delta)^{s/2} f\|_p \leq C'_2 \|f\|_p$$

для $f \in W_0(p)$ и $\epsilon := 4^{-j}$.

Для доказательства правой части воспользуемся тождеством $I = U + V$ (см. доказательство теоремы 23.1). Оператор $(\epsilon I - \Delta)^{s/2}$ разлагается на сумму $(\epsilon I - \Delta)^{s/2} U$ и $(\epsilon I - \Delta)^{s/2} V$. Второе выражение – это оператор свертки, соответствующий мультипликатору $(\epsilon + |\omega|^2)^{s/2} (1 - u(\omega))$. Так как $u(\omega) = 1$ при $|\omega| \leq 1/2$, сингулярности первого множителя в нуле уничтожаются за счет второго. Таким образом, оператор $(\epsilon I - \Delta)^{s/2} V$ равномерно ограничен на $L^p(\mathbb{R}^n)$ при $1 \leq p \leq \infty$.

Для изучения действия $(\epsilon I - \Delta)^{s/2} U$ на $W_0(p)$ используем воспроизводящее ядро $Q(x, y)$ подпространства W_0 . Тогда $f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} Q(x, y) f(y) dy$ для $f \in W_0$. Оператор Q_0 является самосопряженным и тождество $Q_0 = \sum_{|\beta|=r} Q_\beta \partial^\beta$ приводит к $Q_0 = \sum_{|\beta|=r} \partial^\beta \tilde{Q}_\beta$, где $\tilde{Q}_\beta$ равномерно ограничены в $L^p(\mathbb{R}^n)$ при $1 \leq p \leq \infty$. Таким образом, имеем

$$(\epsilon I - \Delta)^{s/2} U f = \sum_{|\beta|=r} ((\epsilon I - \Delta)^{s/2} U \partial^\beta) \tilde{Q}_\beta f$$

и операторы $(\epsilon I - \Delta)^{s/2} U \partial^\beta : L^p(\mathbb{R}^n) \rightarrow L^p(\mathbb{R}^n)$ равномерно ограничены в $L^p(\mathbb{R}^n)$ при $|\beta| = r > |s|$ и $0 \leq \epsilon \leq 1$, так как соответствующие мультипликаторы равны

$(\epsilon + |\omega|^2)^{s/2} u(\omega) \omega^\beta$ (с точностью до степени i) и совпадают с преобразованием Фурье интегрируемых функций. Правая часть неравенства (23.9) доказана.

Пусть $t = -s$. Тогда $f = E_0(f) = E_0(\epsilon I - \Delta)^{t/2} (\epsilon I - \Delta)^{s/2} f$. Операторы $E_0(\epsilon I - \Delta)^{t/2}$ равномерно ограничены в $L^p(\mathbb{R}^n)$ при $1 \leq p \leq \infty$, так как сопряженные к ним операторы равномерно ограничены в $L^p(\mathbb{R}^n)$ в силу теоремы 20.1.

Охарактеризуем пространства Соболева $W_2^s(\mathbb{R}^n)$ в терминах разложения (23.2).

ТЕОРЕМА 23.2. *Если V_j , $j \in \mathbb{N}$, $-r$ -регулярный кратномасштабный анализ в $L_2(\mathbb{R}^n)$ и $s \in (-r, r)$, то функция f принадлежит пространству Соболева $W_2^s(\mathbb{R}^n)$ тогда и только тогда, когда $P_0(f) \in L^2(\mathbb{R}^n)$ и $\|Q_j f\|_2 = \epsilon_j 2^{-js}$ для всех $j \in \mathbb{N}$, где $\{\epsilon_j\}_0^\infty \in l^2(\mathbb{N})$. Более того, W_2^s -норма f эквивалентна сумме L^2 -нормы $P_0(f)$ и $l^2(\mathbb{N})$ -нормы последовательности ϵ_j .*

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Из теоремы 20.1 следует, что $V_0 \subset W_2^s(\mathbb{R}^n)$. Поэтому для доказательства достаточности нужно показать, что сумма функций $q_j \in W_j$ с $\|q_j\|_2 = \epsilon_j 2^{-js}$, где $\epsilon_j \in l^2(\mathbb{N})$, принадлежит $W_2^s(\mathbb{R}^n)$. Зафиксируем положительное ϵ , для которого $|s| + 2\epsilon \leq r$. Пространство W_2^s является гильбертовым со скалярным произведением $\langle (I - \Delta)^{s/2} u, (I - \Delta)^{s/2} v \rangle$. Обозначим через $\|\cdot\|_s$ соответствующую норму в W_2^s . Заметим, что

$$|\langle (I - \Delta)^{s/2} u, (I - \Delta)^{s/2} v \rangle| = \langle (I - \Delta)^{s/2+\epsilon} u, (I - \Delta)^{s/2-\epsilon} v \rangle \leq \|u\|_{s+2\epsilon} \|v\|_{s-2\epsilon}.$$

Поэтому

$$\left\| \sum_0^\infty q_j \right\|_s^2 \leq 2 \sum_{j < k} \|q_j\|_{s+2\epsilon} \|q_k\|_{s-2\epsilon} + \sum_j \|q_j\|_s^2.$$

Из утверждения 23.1 следует, что $\|q_j\|_\sigma \asymp 2^{j\sigma} 2^{-js} \epsilon_j$ для $\sigma \in [-r, r]$. Поэтому

$$\|q_j\|_{s+2\epsilon} \|q_k\|_{s-2\epsilon} \leq C \epsilon_j \epsilon_k 4^{\epsilon(j-k)}.$$

Ряд $\sum_{j < k} \epsilon_j \epsilon_k 4^{-\epsilon|j-k|}$ сходится, так как свертка l^1 -последовательности $\{4^{-\epsilon|j-k|}\}$ с l^2 -последовательностью является l^2 -последовательностью (далее неравенство Коши).

Необходимость условий $P_0(f) \in L^2(\mathbb{R}^n)$ и $\|Q_j f\|_2 \leq \epsilon_j 2^{-js}$ для принадлежности f к W_2^s следует из достаточности условий для $t = -s$ и соображений двойственности.

СЛЕДСТВИЕ 23.2. *Если $-r < s < r$, $f \in W_2^s(\mathbb{R}^n)$ и $g \in W_2^{-r}(\mathbb{R}^n)$, то*

$$(23.10) \quad \langle f, g \rangle = \langle P_0 f, P_0 g \rangle + \sum_0^\infty \langle Q_j f, Q_j g \rangle,$$

причем ряд в правой части сходится абсолютно.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Действительно, $\|Q_j(f)\|_2 \leq \epsilon_j 2^{-js}$ и $\|Q_j(g)\|_2 \leq \eta_j 2^{js}$, поэтому $\langle Q_j(f), Q_j(g) \rangle \leq \epsilon_j \eta_j$ и ряд $\sum_0^\infty \epsilon_j \eta_j$ сходится абсолютно.

24. Пространства Бесова. Если в определении 2.8 пространств Бесова положить $g_j := f_{j+1} - f_j$, то

$$(24.1) \quad f = f_0 + \sum_0^{\infty} g_j,$$

где $\partial^\alpha g_j \leq \varepsilon_j 2^{(m-s)j}$ при $|\alpha| = m$ и $\|g_j\| \leq \varepsilon_j 2^{-js}$. Очевидно, что верно и обратное.

Пусть $V_j, j \in \mathbb{Z}$, $-r$ -регулярный КМА в $L^2(\mathbb{R}^n)$, $P_j: L^2(\mathbb{R}^n) \rightarrow V_j$ — ортогональный проектор, $Q_j = P_{j+1} - P_j$.

УТВЕРЖДЕНИЕ 24.1. Пусть $0 < s < r$ и $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$. Функция f принадлежит пространству Бесова $B_p^{s,q}(\mathbb{R}^n)$ тогда и только тогда, когда последовательность $\{2^{js} \|Q_j(f)\|_p\}_{j \in \mathbb{N}}$ принадлежит $l^q(\mathbb{N})$. Более того, норма f в $B_p^{s,q}(\mathbb{R}^n)$ эквивалентна сумме l^q -нормы этой последовательности и $\|P_0(f)\|_p$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Достаточность следует из теоремы 20.1.

Необходимость. Из (24.1) следует, что $Q_j(f) = Q_j(f_0) + \sum_{k=0}^{\infty} Q_j(g_k)$. Для $k \geq j$ $\|Q_j(g_k)\|_p \leq C \|g_k\|_p$, так как операторы $Q_j: L^p \rightarrow L^p$ равномерно ограничены при $1 \leq p \leq \infty$. Для $k < j$ в силу замечания 21.2 $Q_j = 2^{-jr} \sum_{|\alpha|=r} R_j^{(\alpha)} \partial^\alpha$. Поэтому $\|Q_j(g_k)\|_p \leq C \varepsilon_k 2^{(r-s)k} 2^{-rj}$. Окончательно,

$$\|Q_j(f)\|_p \leq C 2^{-rj} \sum_{k=0}^j \varepsilon_k 2^{(r-s)k} + C \sum_{k=j+1}^{\infty} \varepsilon_k 2^{-js} \leq C' \tilde{\varepsilon}_j 2^{-sk},$$

где $\tilde{\varepsilon}_j := \sum_k \varepsilon_k 2^{-(r-s)|j-k|}$ принадлежит l^q как свертка l^q -последовательности с l^1 -последовательностью.

По аналогии с пространствами Соболева определение пространств Бесова можно распространить на неположительные s .

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 24.1. Пусть $s \leq 0$, $|s| < r \in \mathbb{N}$. Будем говорить, что $f \in B_p^{s,q}(\mathbb{R}^n)$, если $P_0 f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ и $\|Q_j f\|_p \leq \varepsilon_j 2^{-js}$, где $\{\varepsilon_j\}_{j=0}^{\infty} \in l^q(\mathbb{N})$.

Легко видеть, что при $s' = -s$, $s' > 0$, $1/p + 1/p' = 1$, $1/q + 1/q' = 1$ двойственность между распределениями $f \in B_p^{s,q}(\mathbb{R}^n)$ и пробными функциями $g \in B_{p'}^{s',q'}(\mathbb{R}^n)$ определяется следующим образом:

$$\langle f, g \rangle = \langle P_0 f, P_0 g \rangle + \sum_0^{\infty} \langle Q_j f, Q_j g \rangle.$$

Если $p > 1$ и $q > 1$, то $B_p^{s,q}(\mathbb{R}^n)$ — двойственное пространство к $B_{p'}^{s',q'}(\mathbb{R}^n)$ и его определение не зависит от выбора КМА. Для $p = 1$ или $q = 1$ независимость определения от КМА проверяется непосредственно.

Используя утверждение 24.1, нетрудно показать, что

$$(24.2) \quad \mathbb{C}^r(\mathbb{R}^n) = B_{\infty}^{r,\infty}(\mathbb{R}^n) = (B_1^{-r,1})^*(\mathbb{R}^n).$$

УТВЕРЖДЕНИЕ 24.2. Пусть V_j , $j \in \mathbb{Z}$, — r -регулярный кратномасштабный анализ в $L^2(\mathbb{R}^n)$, $r > s$. Тогда $f \in \mathbb{C}^s(\mathbb{R}^n)$ тогда и только тогда, когда $P_0 f \in L^\infty(\mathbb{R}^n)$ и $\|Q_j f\|_\infty \leq C 2^{-js}$ для некоторой константы C .

25. Проекторы P_j и псевдодифференциальные операторы.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 25.1. Пусть символ $\sigma(x, \omega)$ является функцией от $x \in \mathbb{R}^n$ и от $\omega \in \mathbb{R}^n$ (иногда дополнительно требуют, чтобы $\omega \neq 0$). Псевдодифференциальный оператор (ПДО) T определяется посредством формального правила

$$(25.1) \quad T(e^{ix \cdot \omega}) = \sigma(x, \omega) e^{ix \cdot \omega}.$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 25.2. Класс Хермандера $S_{\rho, \delta}^0$ определяется условием

$$(25.2) \quad |\partial_\omega^\alpha \partial_x^\beta \sigma(x, \omega)| \leq C(\alpha, \beta) (1 + |\omega|)^{\rho|\beta| - \delta|\alpha|},$$

где случай $\rho = \delta = 1$ исключается из рассмотрения.

Произвольная функция из $S(\mathbb{R}^n)$ равна $f(x) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} e^{ix \cdot \omega} \hat{f}(\omega) d\omega$, поэтому для линейного T получаем, что

$$(25.3) \quad Tf(x) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_{\mathbb{R}^n} e^{ix \cdot \omega} \sigma(x, \omega) \hat{f}(\omega) d\omega.$$

Формула (25.3) имеет смысл для $\sigma(x, \omega) \in L^\infty(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n)$.

Пусть V_j , $j \in \mathbb{Z}$, — r -регулярный КМА в $L^2(\mathbb{R}^n)$, φ — ортогональная масштабирующая функция, $P_j : L^2(\mathbb{R}^n) \rightarrow V_j$ — ортогональные проекторы.

УТВЕРЖДЕНИЕ 25.1. Символ проектора P_j равен $\sigma(2^j x, 2^{-j} \omega)$, где

$$(25.4) \quad \sigma(x, \omega) := \sum_{k \in \mathbb{Z}^n} e^{2\pi i k \cdot x} \hat{\varphi}(\omega + 2k\pi) \overline{\hat{\varphi}(\omega)}.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\sigma(x, \omega)$ символ P_0 . Легко видеть, что для любого $a \in \mathbb{R}^n$ $\sigma(x - a, \omega)$ является символом оператора $R_a P_0 R_a^{-1}$, где $R_a f(x) := f(x - a)$. Так как оператор P_0 коммутирует со сдвигами R_k , $k \in \mathbb{Z}^n$, его символ $\sigma(x, \omega)$ является $\mathbb{Z}^n$ -периодической функцией по x . Заметим, что

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}^n} e^{2\pi i k \cdot x} \hat{\varphi}(\omega + 2k\pi) = \sum_{l \in \mathbb{Z}^n} e^{-i\omega \cdot (x+l)} \varphi(x+l),$$

так как

$$\begin{aligned} \int_{[0,1]^n} e^{-2\pi i k \cdot x} \left(\sum_{l \in \mathbb{Z}^n} e^{-i\omega \cdot (x+l)} \varphi(x+l) \right) dx \\ = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-2\pi i k \cdot x} e^{-i\omega \cdot x} \varphi(x) dx = \hat{\varphi}(\omega + 2\pi k). \end{aligned}$$

Таким образом, (25.4) переписывается в виде

$$(25.5) \quad \sigma(x, \omega) = \left(\sum_{l \in \mathbb{Z}^n} e^{-i\omega \cdot (x+l)} \varphi(x+l) \right) \overline{\widehat{\varphi}(\omega)}.$$

Для доказательства (25.5) воспользуемся тождеством $P_0(e^{ix \cdot \omega}) = \sigma(x, \omega)e^{ix \cdot \omega}$. Так как $E_0(x, y) := \sum_{k \in \mathbb{Z}} \varphi(x-k) \overline{\varphi(y-k)}$, то

$$\begin{aligned} P_0(e^{ix \cdot \omega}) &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} \varphi(x-k) \int_{\mathbb{R}^n} \overline{\varphi(y-k)} e^{iy \cdot \omega} dy \\ &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} \varphi(x-k) e^{i(k-x) \cdot \omega} \overline{\widehat{\varphi}(\omega)} e^{ix \cdot \omega} = \sigma(x, \omega) e^{ix \cdot \omega}. \end{aligned}$$

Так как производные φ порядка не выше r быстро убывают, то

$$(25.6) \quad |\partial_\omega^\alpha \partial_x^\beta \sigma(x, \omega)| \leq C(\alpha)$$

для любого $\alpha \in \mathbb{N}^n$ и любого $\beta \in \mathbb{N}^n$, $|\beta| \leq r$.

Исследуем, какие свойства символа $\sigma(x, \omega)$ следуют из теоремы 21.1. Вычислим $P_0(x^\alpha)$, используя (25.3). Для этого приблизим x^α функциями из класса Шварца. Рассмотрим для любого $\epsilon > 0$ функцию $f_\epsilon(x) = x^\alpha e^{-\epsilon|x|^2}$, преобразование Фурье которой равно $i^{|\alpha|} \partial_\omega^\alpha g_\epsilon(\omega)$, где $g_\epsilon(\omega) := (\pi/\epsilon)^{n/2} e^{-|\omega|^2/4\epsilon}$. Тогда

$$P_0 f_\epsilon(x) = \frac{i^{|\alpha|}}{(2\pi)^n} \int e^{ix \cdot \omega} \sigma(x, \omega) \partial_\omega^\alpha g_\epsilon(\omega) d\omega.$$

Интегрируя по частям, имеем

$$(25.7) \quad P_0 f_\epsilon(x) = \frac{(-i)^{|\alpha|}}{(2\pi)^n} \int \partial_\omega^\alpha (e^{ix \cdot \omega} \sigma(x, \omega)) g_\epsilon(\omega) d\omega.$$

Так как ядро $E(x, y)$ оператора P_0 есть $O(|x-y|^{-m})$ на бесконечности для любого $m \in \mathbb{N}$, по теореме Лебега получаем, что $P_0(x^\alpha) = \lim_{\epsilon \downarrow 0} P_0(f_\epsilon)(x)$. Переходя к пределу в (25.7), имеем

$$(25.8) \quad x^\alpha = (-i)^{|\alpha|} \partial_\omega^\alpha (e^{ix \cdot \omega} \sigma(x, \omega)) \big|_{\omega=0}.$$

Равенство (25.8) выполнено для любых $\alpha \in \mathbb{N}^n$ с $|\alpha| \leq r$. Поэтому $\sigma(x, 0) = 1$ и $\partial_\omega^\alpha \sigma(x, \omega) \big|_{\omega=0} = 0$ при $1 \leq |\alpha| \leq r$.

Учитывая (25.4), имеем $\sigma(x, 0) = \sum_{k \in \mathbb{Z}^n} e^{2\pi i k \cdot x} \widehat{\varphi}(0 + 2k\pi) \overline{\widehat{\varphi}(0)} = 1$, откуда следует, что

$$(25.9) \quad \widehat{\varphi}(2k\pi) = 0 \quad \forall k \neq 0.$$

По индукции получим, что $(\partial^\alpha \widehat{\varphi})(2k\pi) = 0 \quad \forall k \neq 0, |\alpha| \leq r$.

Так как $\varphi(x) \leq C_m(1+|x|)^{-m}$ для любого $m \in \mathbb{N}$, то ряд $\sum_{k \in \mathbb{Z}^n} |\widehat{\varphi}(\omega + 2k\pi)|^2$ и все его производные равномерно сходятся на компактах. Из теоремы 9.1 следует

УТВЕРЖДЕНИЕ 25.2.

$$(25.10) \quad |\widehat{\varphi}(\omega)|^2 = 1 + O(|\omega|^{2r+2}) \quad \text{при } |\omega| \rightarrow 0.$$

Всегда можно скорректировать φ таким образом, чтобы скорректированная функция $\widetilde{\varphi}$ удовлетворяла условиям

$$(25.11) \quad \int_{\mathbb{R}^n} \widetilde{\varphi}(x) dx = 1 \quad \text{и} \quad \int_{\mathbb{R}^n} x^\alpha \widetilde{\varphi}(x) dx = 0$$

при $1 \leq |\alpha| \leq r$, сохраняя при этом свойство ортогональности $\{\widetilde{\varphi}(\cdot - k)\}_{k \in \mathbb{Z}}$ и быстрого убывания на бесконечности производных $\partial^\alpha \widetilde{\varphi}$ при $|\alpha| \leq r$. Для этого умножим сначала $\widehat{\varphi}$ на константу, по модулю равную 1, для того, чтобы $\widehat{\varphi}(0) = 1$. Далее, пусть $\alpha(\omega)$ – аргумент $\widehat{\varphi}(\omega)$ в окрестности 0, т.е. $\widehat{\varphi}(\omega) = |\widehat{\varphi}(\omega)|e^{i\alpha(\omega)}$ для $|\omega| < \delta$, где $\alpha(0) = 0$ и $\alpha(\omega)$ – бесконечно дифференцируемая функция на $|\omega| < \delta$. Пусть действительная, бесконечно дифференцируемая функция $\beta(\omega)$ является 2π -периодическим продолжением $\alpha(\omega)$ на $\mathbb{R}^n$. Определим $\widehat{\widetilde{\varphi}}(\omega)$ как $e^{-i\beta(\omega)}\widehat{\varphi}(\omega)$. Тогда $\widehat{\widetilde{\varphi}}(\omega) = |\widehat{\varphi}(\omega)|$ в окрестности 0 и выполнено (25.11).

УТВЕРЖДЕНИЕ 25.3. Всплески $\psi_1, \dots, \psi_q$, $q := 2^n - 1$, определенные в теореме 19.3, удовлетворяют условиям

$$(25.12) \quad \int_{\mathbb{R}^n} x^\alpha \psi_l(x) dx = 0$$

для $|\alpha| \leq r$ и $1 \leq l \leq q$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\widehat{\varphi}(\omega) = m_0(\omega/2)\widehat{\varphi}(\omega/2)$, $\widehat{\psi}_l(\omega) = m_l(\omega/2)\widehat{\varphi}(\omega/2)$, где m_l – бесконечно дифференцируемые $2\pi\mathbb{Z}^n$ -периодические функции. Аналогично одномерному случаю доказывается, что $|m_0(\omega)|^2 + |m_1(\omega)|^2 + \dots + |m_q(\omega)|^2 = 1$, откуда следует, что $|\widehat{\varphi}(\omega)|^2 + |\widehat{\psi}_1(\omega)|^2 + \dots + |\widehat{\psi}_q(\omega)|^2 = |\widehat{\varphi}(\omega/2)|^2$. Из (25.10) следует, что $\widehat{\psi}_l(\omega) = O(|\omega|^{r+1})$, $1 \leq l \leq q$. Так как ψ_l быстро убывают на бесконечности, их преобразование Фурье бесконечно дифференцируемо. Значит, $\partial^\alpha \psi_l(\omega) = 0$ при $\omega = 0$ и $1 \leq l \leq q$, откуда следует (25.12).

ПРИМЕР. Применим (25.4) к КМА Мейера (см. раздел 14). Так как $\text{supp } \widehat{\varphi}^M = [-4\pi/3, 4\pi/3]$, то в (25.4) всего три не равных нулю члена:

$$(25.13) \quad \sigma(t, \omega) = e^{-2\pi i t} \widehat{\varphi}(\omega - 2\pi) \widehat{\varphi}(\omega) + (\widehat{\varphi}(\omega))^2 + e^{2\pi i t} \widehat{\varphi}(\omega + 2\pi) \widehat{\varphi}(\omega).$$

Пусть S_j – оператор свертки, соответствующий мультипликатору $(\widehat{\varphi}(2^{-j}\omega))^2$. Обозначим

$$\eta(\omega) := \widehat{\varphi}(\omega - 2\pi) \widehat{\varphi}(\omega), \quad \theta(\omega) := \widehat{\varphi}(\omega + 2\pi) \widehat{\varphi}(\omega).$$

Ясно, что $\text{supp } \eta = [2\pi/3, 4\pi/3]$, $\eta(2\pi - \omega) = \eta(\omega)$, $\text{supp } \theta = [-4\pi/3, -2\pi/3]$, $\theta(-2\pi - \omega) = \theta(\omega)$. Пусть Δ_j^+ и Δ_j^- – операторы свертки, соответствующие мультипликаторам $\eta(2^{-j}\omega)$ и $\theta(2^{-j}\omega)$ соответственно. Пусть M_j – оператор поточечного умножения на $e^{2\pi i 2^j t}$. Из (25.13) следует, что проекторы КМА Мейера имеют вид

$$(25.14) \quad P_j = S_j + M_j \Delta_j^- + M_j^{-1} \Delta_j^+.$$

26. Всплесковая характеристика пространств Гёльдера $\mathbb{C}^s$, Соболева W_2^s и Бесова $B_p^{s,q}$. Всплесковые ряды обладают следующими преимуществами:

- всплески, локализованные в области регулярности функции, имеют пренебрежимо маленькие коэффициенты, а всплески, локализованные около особенностей функции, наоборот, имеют большие коэффициенты (эта особенность выражена тем ярче, чем больше нулевых моментов у всплеска);
- всплесковые коэффициенты позволяют вычислять, с точностью до эквивалентности, норму функции в большинстве функциональных пространств.

Пусть $\{\psi_l\}_{l=0}^{2^n-1}$ – функции, определенные в теореме 19.3. Многомерный всплесковый ряд имеет вид

$$(26.1) \quad f(x) = \sum_{\lambda \in \Lambda} \langle f, \psi_\lambda \rangle \psi_\lambda(x),$$

где $\Lambda := \{\lambda = (l, j, k) : 1 \leq l \leq 2^n - 1, k \in \mathbb{Z}^n, j \in \mathbb{Z}\}$, $\psi_\lambda(x) := 2^{nj/2} \psi_l(2^j x - k)$.

В пространствах, отличных от $L^2(\mathbb{R}^n)$, использование (26.1) бывает затруднительным. Например, в $L^\infty(\mathbb{R}^n)$ для $f \equiv 1$ (26.1) превращается в $1 = 0$. Двойственный пример: пусть $f \in D(\mathbb{R}^n)$ и $\int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx = 1$. Так как $\int_{\mathbb{R}^n} \psi_l(x) dx = 0$, то ряд (26.1) не сходится в $L^1(\mathbb{R}^n)$.

Поэтому вместо (26.1) удобнее пользоваться рядом по сдвигам масштабирующей функции φ и всплескам, сжатым в 2^j раз с $j \geq 0$:

$$(26.2) \quad f(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}^n} \langle f, \varphi_{0,k} \rangle \varphi_{0,k}(x) + \sum_{\lambda \in \cup_{j \geq 0} \Lambda_j} \langle f, \psi_\lambda \rangle \psi_\lambda(x),$$

где $\Lambda_j := \{\lambda = (l, j, k) : 1 \leq l \leq 2^n - 1, k \in \mathbb{Z}^n\}$.

Ряд (26.2) хорошо представляет функции из пространств, которые характеризуются некоторым локальным условием и некоторым глобальным условием роста на бесконечности.

Проиллюстрируем использование (26.1) и (26.2) на примере пространств Соболева $W_2^s(\mathbb{R}^n)$ (определение 2.6), Гёльдера $\mathbb{C}^s(\mathbb{R}^n)$ (определение 2.9) и Бесова $B_p^{s,q}$ (определение 2.8). Будем рассматривать всплески, полученные из r -регулярного КМА. При этом порядок распределения, для которого вычисляются коэффициенты, предполагается строго меньшим r . Равенство (26.1) понимается как равенство интегралов от обеих частей равенства, умноженных на функцию из $C^r(\mathbb{R}^n)$ с компактным носителем.

ТЕОРЕМА 26.1. *Распределение f принадлежит $W_2^s(\mathbb{R}^n)$ с $s \in (-r, r)$ тогда и только тогда, когда всплесковые коэффициенты $\alpha(\lambda) := \langle f, \psi_\lambda \rangle$ удовлетворяют условиям*

$$(26.3) \quad \sum_{j < 0} \sum_{\lambda \in \Lambda_j} |\alpha(\lambda)|^2 + \sum_{j \geq 0} \sum_{\lambda \in \Lambda_j} 4^{js} |\alpha(\lambda)|^2 < \infty.$$

Функция f принадлежит $\mathbb{C}^s(\mathbb{R}^n)$ с $s \in (0, r)$ тогда и только тогда, когда существуют две константы C_0 и C_1 такие, что коэффициенты $\beta(k) := \langle f, \varphi_{0,k} \rangle$, $k \in \mathbb{Z}^n$, и $\alpha(\lambda) := \langle f, \psi_\lambda \rangle$, $\lambda \in \Lambda_j$, $j > 0$, удовлетворяют условиям $|\beta(k)| \leq C_0$, $|\alpha(\lambda)| \leq C_1 2^{-nj/2} 2^{-js}$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. В случае пространств Соболева теорема следует из теоремы 23.2 и того, что $\{\psi_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda_j}$ – ортонормированный базис в W_j , поэтому

$$\|Q_j f\|_2^2 = \sum_{\lambda \in \Lambda_j} |\langle f, \psi_\lambda \rangle|^2.$$

Для пространств Гёльдера результат следует из утверждения 24.2 и того, что $\|f\|_\infty$ и $\sup_{\lambda \in \Lambda_0} |\langle f, \psi_\lambda \rangle|$ эквивалентны на W_0 . Действительно, $|\langle f, \psi_\lambda \rangle| \leq \|\psi_\lambda\|_1 \|f\|_\infty = C \|f\|_\infty$ и $\sup_{\lambda \in \Lambda_0} |\psi_\lambda(x)| \leq C'$ в силу (19.6), откуда $|f(x)| \leq C' \sup_{\lambda \in \Lambda_0} |\langle f, \psi_\lambda \rangle|$.

ЗАМЕЧАНИЕ 26.1. Пространство $\mathbb{C}^s$ нельзя охарактеризовать, используя только модули коэффициентов ряда (26.1). Это связано с невозможностью охарактеризовать таким способом $L^\infty(\mathbb{R}^n)$. Например, при $x \in \mathbb{R}$ модули коэффициентов всплесков Мейера (см. (14.1)) для $\log|x|$ и для $x/|x|$ асимптотически совпадают. Это связано с тем, что преобразование Гильберта H отображает $x/|x|$ в $\log|x|$, а всплески Мейера $\psi_{j,k}^M$ преобразуются в совершенно аналогичные всплески $\tilde{\psi}_{j,k}^M$, где $\tilde{\psi}^M(t) := (H\psi^M)(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \sin((t-1/2)\xi) \operatorname{sign}(\xi) \sin(\lambda(\xi)) d\xi$.

ЗАМЕЧАНИЕ 26.2. Пространство Соболева W_2^s можно охарактеризовать при помощи ряда (26.2): $f \in W_2^s$, $-r < s < r$, тогда и только тогда, когда $\sum_{k \in \mathbb{Z}} |\beta(k)|^2 < \infty$ и $\sum_{j \geq 0} \sum_{\lambda \in \Lambda_j} 4^{js} |\alpha(\lambda)|^2 < \infty$.

Дело в том, что $\sum_{k \in \mathbb{Z}} |\beta(k)|^2 = \sum_{j < 0} \sum_{\lambda \in \Lambda_j} |\alpha(\lambda)|^2 < \infty$, так как V_0 – прямая сумма пространств W_j , $j < 0$.

Аналогично лемме 20.1 доказывается

УТВЕРЖДЕНИЕ 26.1. Пусть $p \in [1, \infty]$. Существуют константы $C' > C > 0$ такие, что для любой конечной суммы $f(x) = \sum_{\lambda \in \Lambda_j} \alpha(\lambda) \psi_\lambda(x) \in W_j$

$$C \|f\|_p \leq 2^{nj(\frac{1}{2} - \frac{1}{p})} \left(\sum_{\lambda \in \Lambda_j} |\alpha(\lambda)|^p \right)^{1/p} \leq C' \|f\|_p.$$

Из утверждений 24.1 и 26.1 следует

ТЕОРЕМА 26.2. Функция

$$f(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}^n} \beta(k) \varphi(x-k) + \sum_{j \geq 0} \sum_{\lambda \in \Lambda_j} \alpha(\lambda) \psi_\lambda(x)$$

принадлежит $B_p^{s,q}$ тогда и только тогда, когда $\{\beta(k)\}_{k \in \mathbb{Z}^n} \in l^p(\mathbb{Z}^n)$ и

$$\left(\sum_{\lambda \in \Lambda_j} |\alpha(\lambda)|^p \right)^{1/p} = 2^{-nj(\frac{1}{2} - \frac{1}{p})} 2^{-js} a_j,$$

где $\{a_j\}_{j \in \mathbb{N}} \in l^q(\mathbb{N})$.

27. Всплесковая характеристика пространств $H^1(\mathbb{R}^n)$ и ВМО. Пусть $\{\psi_l\}_{l=0}^{2^n-1}$ – всплески, определенные в теореме 19.3, $r \geq 1$, $\Lambda := \{\lambda = (l, j, k) : 1 \leq l \leq 2^n - 1, k \in \mathbb{Z}^n, j \in \mathbb{Z}\}$, $\psi_\lambda(x) := 2^{nj/2} \psi_l(2^j x - k)$.

ТЕОРЕМА 27.1. *Всплески $\{\psi_\lambda\}_{\lambda \in \Lambda}$ образуют безусловный базис в вещественном классе Харди $H^1(\mathbb{R}^n)$.*

СХЕМА ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. Сначала рассмотрим всплески с компактным носителем. Не ограничивая общности, можно считать, что $\int_{[0,1]^n} |\psi_l(x)|^2 dx \neq 0$, $1 \leq l < 2^n$ (этого всегда можно добиться за счет соответствующего сдвига). Тогда существуют константы $c > 0$, $\gamma > 0$ и кубы $A_l \subset [0,1]^n$ такие, что $|\psi_l(x)| \geq c$, если $x \in A_l$, и $|A_l| \geq \gamma$.

Если $\lambda = (l, j, k)$, $1 \leq l \leq 2^n - 1$, $k \in \mathbb{Z}^n$, $j \in \mathbb{Z}$, то по определению $Q(\lambda) := Q(j, k) := \{x \in \mathbb{R}^n : 2^j x - k \in [0,1]^n\}$ и $R(\lambda) := \{x \in \mathbb{R}^n : 2^j x - k \in A_l\}$.

Пусть $f(x) = \sum_{\lambda \in \Lambda} \alpha(\lambda) \psi_\lambda(x)$. Утверждение теоремы следует из того, что $\|f\|_{H^1(\mathbb{R}^n)}$ эквивалентна следующим величинам:

$$(27.1) \quad \left\| \left(\sum_{\lambda \in \Lambda} |\alpha(\lambda)|^2 |\psi_\lambda(x)|^2 \right)^{1/2} \right\|_{L^1(\mathbb{R}^n)};$$

$$(27.2) \quad \left\| \left(\sum_{\lambda \in \Lambda} |\alpha(\lambda)|^2 |Q(\lambda)|^{-1} \kappa_{R(\lambda)}(x) \right)^{1/2} \right\|_{L^1(\mathbb{R}^n)};$$

$$(27.3) \quad \left\| \left(\sum_{\lambda \in \Lambda} |\alpha(\lambda)|^2 |Q(\lambda)|^{-1} \kappa_{Q(\lambda)}(x) \right)^{1/2} \right\|_{L^1(\mathbb{R}^n)}.$$

Здесь $|e|$ – мера Лебега множества e .

В доказательстве используется атомарное описание $H^1(\mathbb{R}^n)$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 27.1. Атомом в $H^1(\mathbb{R}^n)$ называют функцию $a(x)$ из $L^2(\mathbb{R}^n)$, для которой существует шар $B \subset \mathbb{R}^n$ такой, что выполнены три свойства

$$(27.4) \quad a(x) = 0, \quad \text{если } x \notin B;$$

$$(27.5) \quad \|a\|_2 \leq |B|^{-1/2};$$

$$(27.6) \quad \int_B a(x) dx = 0.$$

ТЕОРЕМА 27.2 [8]. *Функция $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ принадлежит $H^1(\mathbb{R}^n)$ тогда и только тогда, когда существует последовательность атомов $a_j(x)$ и последовательность чисел λ_j такие, что*

$$(27.7) \quad \sum_0^\infty |\lambda_j| < \infty \quad \text{и} \quad f(x) = \sum_0^\infty \lambda_j a_j(x).$$

Оказывается возможным сгруппировать члены всплескового ряда

$$f(x) = \sum_{\lambda \in \Lambda} \alpha(\lambda) \psi_\lambda(x)$$

так, что частные суммы $\sum_{\lambda \in \Lambda(l, m, r)} \alpha(\lambda) \psi_\lambda(x)$, где $\{\Lambda(l, m, r)\}$ – дизъюнктное разбиение Λ , образуют атомарное представление f . Множества $\Lambda(l, m, r)$ определяются следующим образом. Пусть

$$\sigma_l(x) := \left(\sum_{Q \in \Omega} |\alpha(l, Q)|^2 |Q|^{-1} \kappa_{R(l, Q)}(x) \right)^{1/2},$$

где Ω – совокупность всех двоичных кубов, $\alpha(l, Q) = \alpha(l, j, k)$ для $Q = Q(j, k)$, $R(l, Q) := R(l, j, k)$. Пусть $E(l, m) := \{x : \sigma_l(x) > 2^m\}$, $m \in \mathbb{Z}$. Ясно, что

$$(27.8) \quad \sum_{m \in \mathbb{Z}} 2^m |E(l, m)| \leq 2 \int_{\mathbb{R}^n} \sigma_l(x) dx.$$

Обозначим через $\Omega(l, m)$ совокупность двоичных кубов Q , для которых $|Q \cap E(l, m)| \geq \beta |Q|$, где $\beta \in (0, \gamma)$ – фиксированная постоянная. Пусть $\{A(l, m, r)\}_r$ – совокупность всех максимальных по включению кубов в $\Omega(l, m)$. Легко видеть, что

$$(27.9) \quad \left| \bigcup_r A(l, m, r) \right| < \frac{1}{\beta} |E(l, m)|.$$

Наконец, $\Lambda(l, m, r)$ состоит из тех $\lambda = (l, j, k) \in \Lambda$, для которых $Q(\lambda) \in \Omega(l, m) \setminus \Omega(l, m+1)$ и $Q(\lambda) \subset A(l, m, r)$. Нетрудно показать, что

$$(27.10) \quad \sum_{\lambda \in \Lambda(l, m, r)} |\alpha(\lambda)|^2 \leq \frac{1}{\gamma - \beta} 4^{m+1} |A(l, m, r)|.$$

Пусть $b(l, m, r) := |A(l, m, r)|^{1/2} (\sum_{\lambda \in \Lambda(l, m, r)} |\alpha(\lambda)|^2)^{1/2}$, $\tilde{\alpha}(\lambda) := (b(l, m, r))^{-1} \alpha(\lambda)$ для $\lambda \in \Lambda(l, m, r)$ и $\tilde{\alpha}(\lambda) := 0$ в противном случае. Из (27.9), (27.10) и (27.8) следует, что для любого l , $1 \leq l \leq 2^n - 1$,

$$(27.11) \quad \begin{aligned} \sum_{m \in \mathbb{Z}} \sum_r b(l, m, r) &\leq \frac{2}{(\gamma - \beta)^{1/2}} \sum_{m \in \mathbb{Z}} 2^m \left| \bigcup_r A(l, m, r) \right| \\ &\leq \frac{2}{\beta(\gamma - \beta)^{1/2}} \sum_{m \in \mathbb{Z}} 2^m |E(l, m)| \leq \frac{4}{\beta(\gamma - \beta)^{1/2}} \|\sigma_l\|_1. \end{aligned}$$

Так как мы пока рассматриваем всплески с компактным носителем, то существует $d \in \mathbb{N}$ такое, что $\text{supp } \psi_\lambda \subset dQ(\lambda)$, где dQ обозначает куб с тем же центром и в d раз большей, чем у Q , длиной стороны. Функции $a(l, m, r, x) := d^{-n/2} \sum_{\lambda \in \Lambda(l, m, r)} \tilde{\alpha}(\lambda) \psi_\lambda(x)$ являются атомами в $H^1(\mathbb{R}^n)$. Действительно,

$\text{supp } a(l, m, r, x) \subset dQ(l, m, r)$ и $\|a(l, m, r, \cdot)\|_2 \leq d^{-n/2} (\sum_{\lambda \in \Lambda(l, m, r)} |\tilde{\alpha}(\lambda)|^2)^{1/2} \leq |dQ(l, m, r)|^{-1/2}$. Поэтому ряд, определяющий $a(l, m, r, x)$, сходится в $L^1(\mathbb{R}^n)$, и почленное интегрирование дает последнее свойство атома $\int_{\mathbb{R}^n} a(l, m, r, x) dx = 0$ в силу (25.12).

Таким образом, доказано, что из конечности (27.2) следует возможность атомарного представления функции f .

Покажем, что из атомарного представления f следует интегрируемость функции

$$Sf(x) := \left(\sum_{\lambda \in \Lambda} |\langle f, \psi_\lambda \rangle|^2 |\psi_\lambda(x)|^2 \right)^{1/2}.$$

Ясно, что для этого достаточно проверить выполнение этого свойства для произвольного атома в $H^1(\mathbb{R}^n)$. Пусть f – атом, B – соответствующий шар с центром в x_0 и радиусом $r > 0$. Пусть C – некоторая константа, значение которой будет определено ниже. Разобьем $\mathbb{R}^n$ на центральный шар $\tilde{B} := \{x : |x - x_0| \leq Cr\}$ и двоичные оболочки $R_m := \{x : 2^m Cr \leq |x - x_0| < 2^{m+1} Cr\}$, $m \in \mathbb{N}$. Тогда

$$\int_{\mathbb{R}^n} Sf(x) dx = \int_{\tilde{B}} Sf(x) dx + \sum_0^\infty \int_{R_m} Sf(x) dx.$$

Первый интеграл оценивается при помощи неравенства Коши:

$$\int_{\tilde{B}} Sf(x) dx \leq |\tilde{B}|^{1/2} \|Sf\|_2 = C^{n/2} |B|^{1/2} \|f\|_2 \leq C^{n/2}.$$

Для оценки остальных интегралов заметим, что $\langle f, \psi_\lambda \rangle = 0$, если $dQ(\lambda)$ не пересекается с B . Обозначим через Λ^m совокупность тех λ , для которых $dQ(\lambda)$ пересекается как с B , так и с R_m . Если константа C достаточно большая, то существует $c > 0$ такое, что из $\lambda \in \Lambda^m$ следует неравенство $2^{-j} \geq cr2^m$, где 2^{-j} – длина стороны куба $Q(\lambda)$. Из регулярности всплесков ψ_λ и того, что $\int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx = 0$, следует, что $|\langle f, \psi_\lambda \rangle| \leq C2^{nj/2}2^{jr}$. Поэтому при $x \in R_m$

$$Sf(x) \leq C'2^{-m(n+1)r-n} \quad \text{и} \quad \sum_0^\infty \int_{R_m} Sf(x) dx < \infty.$$

Если всплески не имеют компактного носителя, то вместо атомарной характеристики $H^1(\mathbb{R}^n)$ используется молекулярная.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 27.2. Пусть $s > n$. Молекулой с центром в x_0 и шириной $d > 0$ называют функцию f , удовлетворяющую трем условиям:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} f(x) dx &= 0, \\ \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^2 (1 + |x|)^s dx &< \infty, \\ \left(\int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^2 \left(1 + \frac{|x - x_0|}{d} \right)^s dx \right)^{1/2} &\leq d^{-n/2}. \end{aligned}$$

Нетрудно проверить, что в теореме 27.2 атомы можно заменить на молекулы.

В случае всплесков с некомпактным носителем ранее определенные функции $a(l, m, r, x) := d^{-n/2} \sum_{\lambda \in \Lambda(l, m, r)} \tilde{\alpha}(\lambda) \psi_\lambda(x)$, не будучи атомами, являются молекулами.

Пространство $\text{ВМО}(\mathbb{R}^n)$ является сопряженным к $H^1(\mathbb{R}^n)$.

ТЕОРЕМА 27.3. *Если $f(x)$ принадлежит $\text{ВМО}(\mathbb{R}^n)$, то всплесковые коэффициенты $\alpha(\lambda) := \langle f, \psi_\lambda \rangle$ удовлетворяют условию Карлесона*

$$(27.12) \quad \sum_{Q(\lambda) \subset Q} |\alpha(\lambda)|^2 \leq C|Q|$$

для любого двоичного куба Q .

Обратно, если коэффициенты $\alpha(\lambda), \lambda \in \Lambda$, удовлетворяют (27.12), то ряд $\sum_{\lambda \in \Lambda} \alpha(\lambda) \psi_\lambda(x)$ сходится в слабой топологии $\sigma(\text{ВМО}, H^1)$ к функции из ВМО .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Для упрощения выкладок предполагаем, что всплески $\psi_l, 1 \leq l \leq 2^n - 1$, имеют компактный носитель. Общий случай рассматривается аналогично.

Необходимость. Пусть $\text{supp } \psi_\lambda \subset dQ(\lambda)$ (dQ обозначает куб с тем же центром и в d раз большей, чем у Q , длиной стороны). Зафиксируем произвольный двоичный куб Q . Представим $f \in \text{ВМО}$ в виде $f = f_1 + f_2 + f_{dQ}$, где $f_{dQ} = \frac{1}{|dQ|} \int_{dQ} f(x) dx$, $f_1(x) = f(x) - f_{dQ}$ при $x \in dQ$ и $f_1(x) = 0$ при $x \notin dQ$. Ясно, что $\langle f_2, \psi_\lambda \rangle = 0$, если $Q(\lambda) \subset Q$. Учитывая (25.12), получаем, что $\langle f, \psi_\lambda \rangle = \langle f_1, \psi_\lambda \rangle$ при $Q(\lambda) \subset Q$. Поэтому

$$\sum_{Q(\lambda) \subset Q} |\alpha(\lambda)|^2 \leq \sum_{\lambda \in \Lambda} |\langle f_1, \psi_\lambda \rangle|^2 = \|f_1\|_2^2 \leq d^n \|f\|_{\text{ВМО}}^2 |Q|.$$

Достаточность. Пусть выполнено условие (27.12). Рассмотрим шар B радиуса r с центром в x_0 . Выберем $q \in \mathbb{Z}$ так, чтобы $2^{-q} \leq r < 2^{-q+1}$. Легко видеть, что при $j \geq q$ из того, что $dQ(\lambda) \cap B \neq \emptyset$ и длина стороны $Q(\lambda)$ равна 2^{-j} , следует, что $Q(\lambda) \subset MB$, где константа M зависит только от d . Пусть $\Lambda_{1,1} := \{\lambda = (l, j, k) \in \Lambda : j \geq q, Q(\lambda) \subset MB\}$, $\Lambda_{1,2} := \{\lambda = (l, j, k) \in \Lambda : j \geq q, \lambda \notin \Lambda_{1,1}\}$, $f_{1,1} := \sum_{\lambda \in \Lambda_{1,1}} \alpha(\lambda) \psi_\lambda$, $f_{1,2} := \sum_{\lambda \in \Lambda_{1,2}} \alpha(\lambda) \psi_\lambda$. Тогда функция $f_{1,2}$ равна нулю на B , а для $f_{1,1}$ имеем оценку $\|f_{1,1}\|_2^2 \leq \sum_{Q(\lambda) \subset MB} |\alpha(\lambda)|^2 \leq C|B|$.

Рассмотрим $j < q$. Для каждого такого j только M^n всплесков ψ_λ с длиной стороны $Q(\lambda)$, равной 2^{-j} , не равны нулю тождественно на B . Для каждого такого всплеска в силу (19.6) имеем $|\psi_\lambda(x) - \psi_\lambda(x_0)| \leq C2^j 2^{nj/2} |x - x_0|$. Из (27.12) следует, что $|\alpha(\lambda)| \leq C|Q(\lambda)|^{1/2} = C2^{-nj/2}$. Из всего сказанного получаем, что при $x \in B$

$$\begin{aligned} & \left| \sum_{\{\lambda=(l,j,k) \in \Lambda: j \leq q\}} \alpha(\lambda) \psi_\lambda(x) - \sum_{\{\lambda=(l,j,k) \in \Lambda: j \leq q\}} \alpha(\lambda) \psi_\lambda(x_0) \right| \\ & \leq CM^n \sum_{j < q} 2^j |x - x_0| = CM^n 2^q |x - x_0| \leq 2CM^n. \end{aligned}$$

28. Всплесковая характеристика пространств $L^p(\mathbb{R}^n)$ и $W_p^s(\mathbb{R}^n)$. Пусть ψ_λ , $\lambda \in \Lambda$, – всплески, построенные на основе r -регулярного КМА при помощи теоремы 19.3, $r \geq 1$. Используемые в дальнейшем обозначения определены в предыдущем разделе.

ТЕОРЕМА 28.1. Пусть $1 < p < \infty$. Всплесковый ряд $\sum_{\lambda \in \Lambda} \alpha(\lambda) \psi_\lambda(x)$ принадлежит $L^p(\mathbb{R}^n)$ тогда и только тогда, когда

$$\left\| \left(\sum_{\lambda \in \Lambda} |\alpha(\lambda)|^2 |\psi_\lambda(x)|^2 \right)^{1/2} \right\|_p < \infty.$$

Кроме того, норма

$$\left\| \left(\sum_{\lambda \in \Lambda} |\alpha(\lambda)|^2 |\psi_\lambda(x)|^2 \right)^{1/2} \right\|_p$$

эквивалентна норме

$$\left\| \left(\sum_{\lambda \in \Lambda} |\alpha(\lambda)|^2 |Q(\lambda)|^{-1} \kappa_{Q(\lambda)}(x) \right)^{1/2} \right\|_p.$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Пусть $\epsilon := \{\epsilon(\lambda) = \pm 1\}_{\lambda \in \Lambda}$ – произвольная расстановка знаков. Определим линейный оператор $T_\epsilon: L^2(\mathbb{R}^n) \mapsto L^2(\mathbb{R}^n)$, полагая $T_\epsilon \psi_\lambda = \epsilon(\lambda) \psi_\lambda$. Легко видеть, что операторы T_ϵ являются операторами Кальдерона–Зигмунда (определение 2.5) с ядрами

$$K_\epsilon(x, y) = \sum_{\lambda \in \Lambda} \epsilon(\lambda) \alpha(\lambda) \psi_\lambda(x) \overline{\psi}_\lambda(y),$$

удовлетворяющими в силу (19.11) оценкам $|K_\epsilon(x, y)| \leq C|x - y|^{-n}$ и

$$\left| \frac{\partial K_\epsilon}{\partial x_j} \right| + \left| \frac{\partial K_\epsilon}{\partial y_j} \right| \leq C|x - y|^{-n-1}$$

равномерно по ϵ . В силу теоремы 2.1 операторы T_ϵ равномерно ограничены в $L^p(\mathbb{R}^n)$. Теперь первое утверждение теоремы следует из неравенств Хинчина.

Второе утверждение следует из того, что линейный оператор $U: L^2(\mathbb{R}^n) \mapsto L^2(\mathbb{R}^n)$, определяемый равенствами $U(\psi_l^H) = \psi_l$, $1 \leq l < 2^n$, где ψ_l^H – многомерные всплески Хаара, является изоморфизмом в $L^p(\mathbb{R}^n)$. Действительно, U – изоморфизм двоичного $H^1(\mathbb{R}^n)$ и обычного $H^1(\mathbb{R}^n)$ (двоичное $H^1(\mathbb{R}^n)$ состоит из функций, допускающих атомарное представление по атомам с носителями, равными двоичным кубам, см. теорему 27.1). Очевидно, что U – изометрия в $L^2(\mathbb{R}^n)$. Остается воспользоваться интерполяцией между H^1 и L^2 (см. [31]).

ТЕОРЕМА 28.2. Пусть $1 < p < \infty$ и $0 \leq s < r$. Всплесковый ряд $\sum_{\lambda \in \Lambda} \alpha(\lambda) \psi_\lambda(x)$ принадлежит $W_p^s(\mathbb{R}^n)$ тогда и только тогда, когда

$$(28.1) \quad \left(\sum_{\lambda \in \Lambda} |\alpha(\lambda)|^2 (1 + 4^{js}) 2^{nj} \kappa_{Q(\lambda)}(x) \right)^{1/2} \in L^p(\mathbb{R}^n).$$

Если $-r < s \leq 0$, то всплесковый ряд принадлежит $W_p^s(\mathbb{R}^n)$ тогда и только тогда, когда

$$(28.2) \quad \left(\sum_{\lambda \in \Lambda} |\alpha(\lambda)|^2 (1 + 4^{-js})^{-1} 2^{nj} \kappa_{Q(\lambda)}(x) \right)^{1/2} \in L^p(\mathbb{R}^n).$$

СХЕМА ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. Сначала рассмотрим всплески Мейера. Для них преобразование Фурье $\widehat{\psi}_l$ равно нулю в окрестности нуля и имеет компактный носитель. Поэтому для любого $\gamma \in \mathbb{R}$ можно определить функции $\psi_l^\gamma := (-\Delta)^{\gamma/2} \psi_l$, где $\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_2^2} + \dots + \frac{\partial^2}{\partial x_n^2}$. Ясно, что $\widehat{\psi}_l^\gamma(\xi) = |\xi|^\gamma \widehat{\psi}_l(\xi)$. Определим $\psi_\lambda^\gamma(x) := 2^{nj/2} \psi_l^\gamma(2^j x - k)$, где $\lambda = (l, j, k)$. Рассмотрим линейные операторы D_γ , определяемые формулами $D_\gamma(\psi_\lambda) = \psi_\lambda^\gamma$. Для любого $\gamma \in \mathbb{R}$ операторы D_γ являются изоморфизмами в $L^p(\mathbb{R}^n)$. Дело в том, что $\psi_\lambda^\gamma, \lambda \in \Lambda$, образуют базис Рисса в $L^2(\mathbb{R}^n)$, откуда следует, что D_γ — изоморфизм в $L^2(\mathbb{R}^n)$. Кроме того, ядро оператора D_γ равно $\sum_{\lambda \in \Lambda} \psi_\lambda^\gamma(x) \overline{\psi}_\lambda(y)$ и удовлетворяет требованиям определения 2.5. Значит, по теореме 2.1 D_γ — непрерывный оператор в $L^p(\mathbb{R}^n)$. Обратный оператор исследуется аналогично.

Норма f в пространстве $W_p^s(\mathbb{R}^n)$ эквивалентна $\|f\|_p + \|(-\Delta)^{s/2} f\|_p$. Поэтому для оценки $W_p^s(\mathbb{R}^n)$ -нормы ряда $\sum_{\lambda \in \Lambda} \alpha(\lambda) \psi_\lambda(x)$ необходимо вычислить $L^p(\mathbb{R}^n)$ -норму $(-\Delta)^{s/2} \sum_{\lambda \in \Lambda} \alpha(\lambda) \psi_\lambda(x) = \sum_{\lambda \in \Lambda} \alpha(\lambda) 2^{js} \psi_\lambda^s(x)$. Остается использовать изоморфизм D_s в $L^p(\mathbb{R}^n)$ и теорему 28.1.

В общем случае r -регулярного КМА доказывается, что функции $(-\Delta)^{-s/2} \psi_l$, $1 \leq l < 2^n$, имеют нулевое среднее и вместе со всеми производными порядка $\leq r$ имеют порядок $O(|x|^{-n-r+s})$ на бесконечности. Аналогично, функции $(-\Delta)^{s/2} \psi_l$, $1 \leq l < 2^n$, принадлежат классу Гёльдера H^{r-s} , убывают на бесконечности как $O(|x|^{-n-r+s})$ и имеют нулевое среднее. Эти свойства позволяют повторить рассуждения, использованные для всплесков Мейера.

Утверждение теоремы для $s < 0$ получается по двойственности.

СЛЕДСТВИЕ 28.1. Ряд

$$(28.3) \quad f(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}^n} \beta(k) \varphi(x - k) + \sum_{\{\lambda=(l,j,k) \in \Lambda, j \geq 0\}} \alpha(\lambda) \psi_\lambda(x)$$

принадлежит $W_p^s(\mathbb{R}^n)$, $1 < p < \infty$, $|s| < r$, тогда и только тогда, когда $\{\beta(k)\}_{k \in \mathbb{Z}^n} \in l^p(\mathbb{Z}^n)$ и

$$(28.4) \quad \left(\sum_{\{\lambda=(l,j,k) \in \Lambda, j \geq 0\}} 2^{nj} 4^{js} |\alpha(\lambda)|^2 \kappa_{Q(\lambda)}(x) \right)^{1/2} \in L^p(\mathbb{R}^n).$$

29. Периодические всплески. На основе всплескового базиса на прямой можно построить всплесковый базис на отрезке $[0, 1]$.

Пусть $\{V_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$ — r -регулярный КМА в $L_2(\mathbb{R})$, $r \geq 1$, V_j^∞ — замыкание V_j в слабой топологии $\sigma(L^\infty, L^1)$. Пусть T_j — подпространство функций из V_j^∞ , имеющих период 1.

ЛЕММА 29.1. Если $j \leq 0$, то T_j совпадают и состоят только из постоянных функций. Если $j > 0$, то размерность T_j равна 2^j .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Заметим, что константы принадлежат всем V_j , так как

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} \varphi(t - k) \equiv 1.$$

Последнее следует из (25.9), так как

$$\int_{-1}^1 \sum_{k \in \mathbb{Z}} \varphi(t - k) e^{-2\pi i l t} dt = \int_{\mathbb{R}} \varphi(t) e^{-2\pi i l t} dt = \widehat{\varphi}(2\pi l) = \delta_{l,0}.$$

Так как $V_j^\infty \subset V_{j+1}^\infty$, то первое утверждение леммы будет доказано, если любая функция $f \in T_0$ является константой. Действительно, если f 1-периодична, то последовательность коэффициентов $c_k := \int_{\mathbb{R}} f(t) \overline{\varphi(t - k)} dt$ постоянна, а значит, и $f(t) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k \varphi(t - k)$ равна константе.

Пусть $j > 0$. Тогда любая функция $f \in T_j$ имеет вид $f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \varphi(2^j t - k)$, где $c_k := 2^j \int_{\mathbb{R}} f(t) \overline{\varphi(2^j t - k)} dt$. Из периодичности f следует, что $c_{k+2^j} = c_k$. Очевидно, что верно и обратное. Таким образом, размерность T_j равна 2^j .

ЛЕММА 29.2. Объединение T_j , $j \geq 0$, плотно в банаховом пространстве непрерывных на действительной оси периодических с периодом 1 функций.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Ортогональный проектор $P_j: L^2(\mathbb{R}) \rightarrow V_j$ определяется формулами

$$P_j f(t) = \int_{\mathbb{R}} E_j(t, s) f(s) ds,$$

где $E_j(t, s) := 2^j E(2^j t, 2^j s)$ и $E(t, s) := \sum_{k=-\infty}^{\infty} \varphi(t - k) \overline{\varphi(s - k)}$. Если f — ограничена и равномерно непрерывна на $\mathbb{R}$, то $\|f - P_j(f)\|_\infty \rightarrow 0$ при $j \rightarrow \infty$ (см. лемму 22.1). Остается заметить, что $P_j(f) \in T_j$ для любого $j \in \mathbb{N}$, если f периодична с периодом 1.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 29.1. Вложенная последовательность $\{T_j\}_{j \in \mathbb{N}}$, определенная выше, называется r -регулярным КМА в $L^2(\mathbb{T})$, где $\mathbb{T}$ — отрезок $[0, 1]$ с отождествленными концами.

Пусть $\varphi_j^{\text{per}}(t) := 2^{j/2} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \varphi(2^j(t - k))$.

ЛЕММА 29.3. Для любого $j \in \mathbb{N}$ функции $\varphi_j^{\text{per}}(t - k2^{-j})$, $0 \leq k < 2^j$, образуют ортонормированный базис в T_j .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Так как размерность T_j равна 2^j , то достаточно проверить ортонормированность функций $\varphi_j^{\text{пер}}(t - k2^{-j})$, $0 \leq k < 2^j$, в $L^2[0, 1]$. Для этого необходимо вычислить

$$2^j \sum_{k \in \mathbb{Z}} \sum_{l \in \mathbb{Z}} \int_0^1 \varphi(2^j t - 2^j k - m) \overline{\varphi(2^j t - 2^j l - m')} dt.$$

Сделаем замену переменных $t - k = 2^{-j} t'$, где $0 \leq t < 1$, $k \in \mathbb{Z}$. Она приводит к выражению

$$\sum_{q \in \mathbb{Z}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t' - m) \overline{\varphi(t - 2^j q - m')} dt.$$

Если $0 \leq m < 2^j$, $0 \leq m' < 2^j$ и $m \neq m'$, то каждый из интегралов равен нулю. Если $m = m'$, то единственным не равным нулю интегралом является интеграл при $q = 0$, который равен 1.

Пусть U_j обозначает ортогональное дополнение T_j до T_{j+1} и пусть

$$\psi_j^{\text{пер}}(t) := 2^{j/2} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \psi(2^j(t - k)).$$

ЛЕММА 29.4. Для любого $j \in \mathbb{N}$ функции $\psi_j^{\text{пер}}(t - k2^{-j})$, $0 \leq k < 2^j$, образуют ортонормированный базис в U_j .

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО аналогично доказательству леммы 29.3. Легко видеть, что функции $\psi_j^{\text{пер}}(t - k2^{-j})$ принадлежат T_{j+1} и ортогональны к T_j . Кроме того, функции $\psi_j^{\text{пер}}(t - k2^{-j})$, $0 \leq k < 2^j$, попарно ортогональны. Остается заметить, что размерность U_j равна 2^j , так как размерность T_j равна 2^j , а размерность T_{j+1} равна 2^{j+1} .

Таким образом,

$$L^2(\mathbb{T}) = T_0 \oplus U_0 \oplus U_1 \oplus U_2 \oplus \dots,$$

откуда следует, что постоянная функция 1 вместе с последовательностью функций $\{\psi_j^{\text{пер}}(t - k2^{-j})\}_{0 \leq k < 2^j, j \in \mathbb{N}}$ образуют ОНБ в $L^2(\mathbb{T})$. Занумеруем эту последовательность лексикографически: $g_0(t) \equiv 1$; если $m = 2^j + k$, $0 \leq k < 2^j$, то $g_m(t) := \psi_j^{\text{пер}}(t - k2^{-j})$.

ТЕОРЕМА 29.1. Пусть $\{V_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$ — r -регулярный кратномасштабный анализ в $L^2(\mathbb{R})$, $r \geq 1$. Тогда последовательность $\{g_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ является базисом Шаудера в $C(\mathbb{T})$ и $L^1(\mathbb{T})$. Она также является базисом Шаудера и в $C^k(\mathbb{T})$ при $0 \leq k < r$. Та же последовательность $\{g_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ является безусловным базисом в пространстве Гёльдера $\mathbb{C}^\alpha$ при $0 < \alpha < 1$, в классе Зигмунда $\Lambda_\star = \mathbb{C}^1$ при $r \geq 2$, в пространствах L^p с $1 < p < \infty$, в пространстве Харди $H^1(\mathbb{T})$ и в его двойственном пространстве $\text{BMO}(\mathbb{T})$.

ЗАМЕЧАНИЕ 29.1. Отметим, что тригонометрическая система не является базисом Шаудера в $C(\mathbb{T})$ и в $L^1(\mathbb{T})$. В пространствах L^p при $1 < p < \infty$ она образует базис Шаудера, но не безусловный.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Так как $\bigcup T_j$ плотно в $C(\mathbb{T})$ (см. лемму 29.2), то для базисности $\{g_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ в $C(\mathbb{T})$ достаточно доказать, что $\|\sum_{m=0}^l \langle f, g_m \rangle g_m\|_\infty \leq C\|f\|_\infty$ для любого $l \in \mathbb{N}$. Продолжим функцию $f \in C(\mathbb{T})$ по периодичности на всю прямую $\mathbb{R}$. Тогда $\sum_{m=0}^{2^j} \langle f, g_m \rangle g_m = P_j f$, причем операторы P_j равномерно ограничены на $L^\infty(\mathbb{R})$, так как $\|P_j\|_\infty = \|P_0\|_\infty$. Пусть $2^j \leq l < 2^{j+1}$. Заметим, что

$$\left\| \sum_{m=2^j}^l \langle f, g_m \rangle g_m \right\|_\infty \leq \|f\|_\infty \left(\sup_{2^j \leq m < 2^{j+1}} \|g_m\|_1 \right) \left\| \sum_{2^j \leq m < 2^{j+1}} |g_m| \right\|_\infty.$$

Легко видеть, что $\|g_m\|_{L^1(\mathbb{T})} = 2^{-j/2} \|\psi\|_{L^1(\mathbb{R})}$ при $2^j \leq m < 2^{j+1}$. Кроме того,

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{2^j \leq m < 2^{j+1}} |g_m| \right\|_\infty &= \left\| \sum_{k \in \mathbb{Z}} |2^{j/2} \psi(2^j \cdot - k)| \right\|_\infty \\ &= 2^{j/2} \left\| \sum_{k \in \mathbb{Z}} |\psi(\cdot - k)| \right\|_\infty = C 2^{j/2}. \end{aligned}$$

Поэтому $\|\sum_{m=2^j}^l \langle f, g_m \rangle g_m\|_\infty \leq C\|f\|_\infty$.

Случай $C^k(\mathbb{T})$ разбирается аналогично с использованием теоремы 21.2.

Базисность в $L^1(\mathbb{T})$ получается по двойственности.

Из теоремы 26.1 следует, что

$$(29.1) \quad \sum_{m=0}^{\infty} \alpha_m g_m \in \mathbb{C}^s(\mathbb{T}) \iff \alpha_m = O(m^{-s-1/2}),$$

из чего следует безусловная базисность в $\mathbb{C}^s(\mathbb{T})$.

Результат для пространств $L^p(\mathbb{T})$, $H^1(\mathbb{T})$, $\text{ВМО}(\mathbb{T})$ следует из теорем 28.1, 27.1 и 27.3.

Сравним всплесковые ряды и ряды Фурье. Оказывается, что полные всплесковые ряды, имеющие много больших коэффициентов, представляют собой патологические функции, тогда как всплесковые ряды хороших функций имеют мало больших коэффициентов. Это прямо противоположно ситуации с обычными рядами Фурье: для хороших функций они полные, а для патологических – лакунарные. Это объясняется тем, что всплесковый анализ носит локальный характер. Большие коэффициенты имеют всплески, локализованные вблизи особенностей анализируемой функции. Вне особенностей анализируемая функция является бесконечно дифференцируемой, и соответствующие всплесковые коэффициенты являются пренебрежимо малыми за счет свойства (25.12).

Рассмотрим функцию $|\sin \pi t|^{-\alpha}$, где $0 < \alpha < 1$. Ее коэффициенты Фурье c_k , $k \in \mathbb{Z}$, имеют следующую асимптотику $c_k = \gamma(\alpha)|k|^{-1+\alpha} + O(k^{-3+\alpha})$, где $\gamma(\alpha) \neq 0$ (см. [10, гл. 5].) Таким образом, особенность в 0 функции $|\sin \pi t|^{-\alpha}$ влияет на все коэффициенты Фурье. Всплесковые коэффициенты подвергаются влиянию особенности, только если интервал $I_m := [k2^{-j}, (k+1)2^{-j}]$, $m = 2^j + k$, $0 \leq k < 2^j$,

Рис. 24. График $|\sin \pi t|^{-1/2}$

Рис. 25. Оценка модулей всплесковых коэффициентов

определяющий локализацию всплеска $g_m(t)$, находится близко к особенности. Более точно, для периодических всплесков, построенных на основе всплесков Мейера, имеем следующую оценку: если $2^j \leq m < 2^{j+1}$ и $l := \min(m - 2^j, 2^{j+1} - m)$, то $|\alpha_m| \leq C_N 2^{j(\alpha-1/2)} / (1+l)^N$ для любого натурального N . Таким образом, большими будут только коэффициенты с номерами, близкими к 2^j , $j \in \mathbb{N}$.

Рассмотрим патологические функции. Пусть $q > 1$, $\lambda_1 > 0$, $\lambda_{k+1} > q\lambda_k$, $k \in \mathbb{N}$, $\sum_0^\infty |\alpha_k| < \infty$, но $\alpha_k \lambda_k$ не стремится к 0. Известно [10, гл. 2], что при этих предположениях ряд $\sum_0^\infty \alpha_k \cos \lambda_k t$ определяет непрерывную нигде не дифференцируемую функцию.

Для всплесковых рядов имеем следующий результат.

ТЕОРЕМА 29.2. Пусть $\{g_m\}_{m \in \mathbb{N}}$ – периодические всплески, полученные из r -регулярного кратномасштабного анализа с $r \geq 2$. Пусть $f(t) = \sum_0^\infty \alpha_m g_m(t)$ – непрерывная функция, дифференцируемая в точке t_0 . Тогда для любого фиксированного $q \geq 1$ $\alpha_m = o(m^{-3/2})$ при m , стремящемся к бесконечности и таком, что интервалы qI_m содержат точку t_0 . Здесь $I_m := [k2^{-j}, (k+1)2^{-j}]$ при $m = 2^j + k$, $0 \leq k < 2^j$, а qI_m – интервал с тем же, что и у I_m , центром и длиной $q/2^j$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Результат легко следует из (19.11) и (25.12).

Из теорем 29.1 и 29.2 следует

СЛЕДСТВИЕ 29.1. Пусть последовательность чисел α_m , $m \geq 1$, удовлетворяет неравенствам $C_1 m^{-3/2} \leq |\alpha_m| \leq C_2 m^{-3/2}$ для двух констант $C_2 \geq C_1 > 0$. Тогда функция $f(t) = \sum_0^\infty \alpha_m g_m(t)$ принадлежит классу Зигмунда $\Lambda_\star = \mathbb{C}^1$, но нигде не дифференцируема.

Функции Вейерштрасса являются частным случаем следствия 29.1.

Пусть $\psi^{\text{пер}, M}(t)$ – периодический всплеск Мейера. Прямые вычисления показывают, что $\sum_{-\infty}^{\infty} \psi^M(t-k) = -\sqrt{2} \cos 2\pi t$. Поэтому функция

$$f(t) = \sum_{j \in \mathbb{N}} \sum_0^{2^j-1} \alpha(j, k) \psi_j^{\text{пер}, M}\left(t - \frac{k}{2^j}\right)$$

с коэффициентами $\alpha(j, k) = \alpha(j)$, не зависящими от k , равна

$$f(t) = -\sqrt{2} \sum_0^{\infty} 2^{j/2} \alpha(j) \cos(2\pi 2^j t).$$

Таким образом, полный всплесковый ряд совпадает с лакунарным рядом Фурье.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Grossman A., Morlet J. Decomposition of Hardy functions into square integrable wavelets of constant shape // SIAM J. Math. Anal. 1984. V. 15. P. 723–736.
- [2] Meyer Y. Ondelettes et operateurs. Paris: Hermann, 1990.
- [3] Daubechies I. Ten lectures on wavelets // CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics. V. 61. Philadelphia: SIAM, 1992.
- [4] Chui C. K. An Introduction to Wavelets. New York: Academic Press, 1992.
- [5] Астафьева Н. М. Вейвлет-анализ: основы теории и примеры применения // УФН. 1996. Т. 166. №11. С. 1145–1170.
- [6] Новиков И. Я., Стечкин С. Б. Основные конструкции всплесков // Фундам. и прикл. матем. 1997. Т. 3. №4. С. 999–1028.
- [7] Лузин Н. Н. Sur une propriété des fonctions à carre sommable // Bull. Calcutta Math. Soc. 1930. Т. 20. С. 139–154.
- [8] Coifman R. R., Weiss G. Extentions of Hardy spaces and their use in analysis // Bull. Amer. Math. Soc. 1977. V. 83. P. 569–645.
- [9] Стейн И. Сингулярные интегралы и дифференциальные свойства функций. М.: Мир, 1973.
- [10] Зигмунд А. Тригонометрические ряды. Т. 1, 2. М.: Мир, 1965.
- [11] Calderon A. P. Commutators of singular integral operators // Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 1965. V. 53. P. 1092–1099.
- [12] Calderon A. P. Intermediate spaces and interpolation, the complex method // Studia Math. 1964. V. 24. P. 113–190.
- [13] Gabor D. Theory of communication // J. Inst. Electr. Engrg. (London). 1946. V. 93. P. 429–457.
- [14] Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Квантовая механика. М.: Наука, 1974.
- [15] Лукашенко Т. П. Всплески на топологических группах // Докл. АН. 1993. Т. 332. №1. С. 15–17.
- [16] Haar A. Zur theorie der orthogonalen functionensysteme // Math. Ann. 1910. V. 69. P. 331–371.
- [17] Mallat S. Multiresolution approximation and wavelets // Trans. Amer. Math. Soc. 1989. V. 315. P. 69–88.
- [18] Boor C. de, DeVore R., Ron A. On the construction of multivariate (pre)wavelets // Constructive Approximation. 1993. V. 9. №2–3. P. 123–166.
- [19] Whittaker J. T. Interpolatory function theory. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1935.
- [20] Meyer Y. Principe d'incertitude, bases hilbertiennes et algebres d'operateurs // Semin. Bourbaki. 1985–86. №662.
- [21] Battle G. A block spin construction of ondelettes, Part II: QFT connection // Commun. Math. Phys. 1988. V. 114. P. 93–102.

- [22] Lemarie P. G. Ondelettes à localisation exponentielle // J. Math. Pures Appl. 1988. V. 67. № 3. P. 227–236.
- [23] Полиа Г., Сеге Г. Задачи и теоремы из анализа. Ч. 2. М.: Наука, 1978.
- [24] Schoenberg I. J. Contributions to the problem of approximation of equidistant data by analytic functions. Parts A, B // Quart. Appl. Math. 1946. V. 4. P. 45–99, 112–141.
- [25] Stromberg J. O. A modified Franklin system and higher order spline systems on $\mathbb{R}^n$ as unconditional bases for Hardy spaces // Conf. in honor of A. Zygmund, Vol. II. Belmont, CA: Wadsworth, 1983. P. 475–493.
- [26] Daubechies I. Orthonormal basis of compactly supported wavelets // Commun. Pure Appl. Math. 1988. V. 46. P. 909–996.
- [27] Smith M. J. T., Barnwell T. P. Exact reconstruction techniques for tree-structured subband coders // IEEE Trans. Acoust. Speech Signal Process. 1986. V. 34. P. 434–441.
- [28] Mintzer F. Filters for distortion-free two-band multirate filter banks // IEEE Trans. Acoust. Speech Signal Process. 1985. V. 33. P. 626–630.
- [29] Vetterli M. Filter banks allowing perfect reconstruction // Signal Process. 1986. V. 10. P. 219–244.
- [30] Gröchenig K. Analyse multiéchelle et bases d'ondelettes // C. R. Acad. Sci. Paris. Sér. I. 1987. V. 305. P. 13–17.
- [31] Fefferman C., Stein E. M. H^p spaces of several variables // Acta Math. 1972. V. 129. P. 137–193.

Воронежский государственный университет;
Математический институт им. В. А. Стеклова РАН

Поступила в редакцию
28.07.1998