Math-Net.Ru

Общероссийский математический портал

Ю. А. Кашлев, Н. М. Садыков, Исправление к статье “Неравновесная статистическая термодинамика каналированных частиц. Переход к частицам, движущимся с тепловыми скоростями” (ТМФ. 1998.Т. 116. № 3. С. 442–455), *ТМФ*, 1998, том 117, номер 3, 503

DOI: <https://doi.org/10.4213/tmf1958>

Использование Общероссийского математического портала Math-Net.Ru подразумевает, что вы прочитали и согласны с пользовательским соглашением

<http://www.mathnet.ru/rus/agreement>

Параметры загрузки:

IP: 54.164.48.24

26 апреля 2023 г., 02:53:30

Список литературы

- [1] *В. Б. Брагинский, В. И. Панов.* ЖЭТФ. 1971. Т. 61. № 3. С. 873.
- [2] *I. P. Denisova, M. Dalal.* J. Math. Phys. 1997. V. 38. № 11. P. 5820.
- [3] *M. Born, L. Infeld.* Proc. Roy. Soc. 1934. V. A144. P. 425.
- [4] *Д. И. Блохинцев.* Пространство и время в микромире. М.: Наука, 1970. С. 43.
- [5] *I. P. Denisova, B. V. Mehta.* General Relativ. Gravit. 1997. V. 29. № 5. P. 583.
- [6] *J. R. Wilkinson.* Progress in Quantum Electronics. 1987. V. 11. P. 1.
- [7] *В. И. Денисов, М. И. Денисов.* Проверка принципа эквивалентности Эйнштейна с помощью лазерного гироскопа в космосе. Препринт НИИЯФ МГУ № 95-25/389. М.: НИИЯФ, 1995.

Поступила в редакцию 20.IV.1998 г.

Исправление к статье:

Ю. А. Кашлев, Н. М. Садыков “Неравновесная статистическая термодинамика
канализованных частиц. Переход к частицам, движущимся с тепловыми скоростями”
(ТМФ. 1998. Т. 116. № 3. С. 442–455)

Формула (25) должна выглядеть следующим образом:

$$\Phi = \left(\frac{m}{m_e} \right) \left\{ E_0 \psi_{cr}^2 R / \left(-\frac{dE}{dt} \right)_e \right\} \Big|_{E_0 = \text{const}}.$$

Редакция приносит авторам свои извинения.