А. А. Арсеньев
ИСПРАВЛЕНИЕ К СТАТЬЕ:
ТМФ. 1996. Т. 106. № 1. С. 16–23

В статье мною неявно было использовано равенство

$$|\langle \psi(\lambda) | VU^{-1}(\lambda, \omega) \rangle| = |UV\psi(\lambda, \omega)|, \quad (1)$$

которое, конечно, верно в случае задачи рассеяния на центрально-симметричном потенциале, но не верно в общем случае. Поэтому результаты этой работы справедливы при дополнительном предположении (1), а в общем случае нужно дополнительно предположить, что существует такая непрерывная функция $\varphi(\omega)$, что

$$|\langle \psi(\lambda) | VU^{-1}(\lambda, \varphi(\omega)) \rangle| = |UV\psi(\lambda, \omega)|, \quad (2)$$

и тогда основная формула (38) будет верна в форме

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |t(\operatorname{Re} \lambda_n, \varphi(\omega), \omega) - \text{v. p. } t(\lambda_0, \varphi(\omega), \omega)| d\omega = 1/\pi.$$

Доказательство остается без изменений. В частности, если рассматривается задача рассеяния на потенциале общего вида и ω – вектор на единичной сфере, то формула (2) справедлива при $\varphi(\omega) = -\omega$, что и оправдывает сделанное в конце статьи замечание. Таким образом, в рамках рассматриваемой нами модели существование резонансов амплитуды рассеяния связано не только с существованием полюса у аналитического продолжения матрицы рассеяния, но и с существованием нетривиальной симметрии (2). На это обстоятельство я сначала не обратил внимания.