Math-Net.Ru

Общероссийский математический портал

В. М. Круглов, Обобщение усиленного закона больших чисел Брунка–Прохорова, *Теория вероятн. и ее примен.*, 2002, том 47, выпуск 2, 347–349

DOI: <https://doi.org/10.4213/tvp3653>

Использование Общероссийского математического портала Math-Net.Ru подразумевает, что вы прочитали и согласны с пользовательским соглашением

<http://www.mathnet.ru/rus/agreement>

Параметры загрузки:

IP: 54.84.234.179

26 апреля 2023 г., 02:12:29

© 2002 г.

КРУГЛОВ В. М.*

ОБОБЩЕНИЕ УСИЛЕННОГО ЗАКОНА БОЛЬШИХ ЧИСЕЛ
БРУНКА–ПРОХОРОВА¹⁾

Доказано, что последовательность $\{b_n^{-1}(X_1 + \dots + X_n)\}_{n \geq 1}$ сходится почти всюду к нулю, если $\{X_n\}_{n \geq 1}$ — мартингал-разность относительно некоторой возрастающей последовательности σ -алгебр основного вероятностного пространства, ряд $\sum_{n=1}^{\infty} n^{r-1} b_n^{-2r} \mathbf{E}|X_n|^{2r}$ сходится для некоторого $r > 1$, последовательность положительных чисел $\{b_n\}_{n \geq 1}$ не убывает и неограничена, существует строго возрастающая последовательность натуральных чисел $\{k_n\}_{n \geq 1}$ такая, что $\sup_{n \geq 1} k_{n+1} k_n^{-1} = d < \infty$ и $0 < b = \inf_{n \geq 1} b_{k_n} b_{k_{n+1}}^{-1} \leq \sup_{n \geq 1} b_{k_n} b_{k_{n+1}}^{-1} = c < 1$.

При $b_n = n$ все условия выполняются и теорема совпадает по форме с известной теоремой Брунка–Прохорова для независимых случайных величин.

Ключевые слова и фразы: усиленный закон больших чисел, мартингал, сходимость почти всюду.

Теорема Брунка–Прохорова (см. [1]–[3]) утверждает, что последовательность средних арифметических $\{n^{-1}(X_1 + \dots + X_n)\}_{n \geq 1}$ сходится почти всюду к нулю, если $\{X_n\}_{n \geq 1}$ — последовательность независимых случайных величин, $\mathbf{E}X_n = 0$ и $\sum_{n=1}^{\infty} n^{r-1} \mathbf{E}|X_n|^{2r} < \infty$ для некоторого $r \geq 1$. При $r = 1$ она совпадает с общеизвестной теоремой Колмогорова. М. Лозв (см. [4, с. 253]) заметил, что теорема Колмогорова допускает обобщение путем замены нормирующих постоянных n положительными числами b_n , удовлетворяющими условиям: $b_n \leq b_{n+1}$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty$. Теорема Колмогорова с добавлением М. Лозва и теорема Брунка–Прохорова были обобщены на случай мартингал-разностей (см. [5], [6]). Естественно встает вопрос о возможном обобщении теоремы Брунка–Прохорова путем замены нормирующих постоянных n другими положительными числами. В статье [7] показано, что при $r > 1$ в теореме Брунка–Прохорова для мартингал-разностей в качестве нормирующих постоянных можно взять положительные числа b_n , удовлетворяющие условию $b_n/b_{n+1} \leq (n/(n+1))^\delta$, $\delta > (r-1)/(2r)$. Свое утверждение авторы статьи [7] выводят в качестве следствия из другой своей теоремы (см. [7, теорема 3.1]). Следует отметить, что эта другая теорема (имеется в виду теорема 3.1) давно известна (см., например, [5]).

Ниже будет доказано, что при $r > 1$ теорема Брунка–Прохорова для мартингал-разностей остается верной с заменой нормирующих постоянных n на положительные постоянные b_n , удовлетворяющие некоторым условиям. В частности, эти условия выполняются для последовательности $b_n = n^\delta$, $n = 1, 2, \dots$, $\delta > 0$. При $0 < \delta \leq (r-1)/(2r)$ эта последовательность не подпадает под действие упомянутой теоремы из [7].

Далее предполагается, что все рассматриваемые случайные величины определены на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$. Ради краткости речи во всех утверждениях, о которых говорится, что они выполняются $\mathbf{P}$ -почти всюду (п.в.), символ $\mathbf{P}$ будет опускаться.

Теорема. Пусть $\{X_n\}_{n \geq 1}$ — мартингал-разность относительно возрастающей последовательности $\{\mathcal{F}_n\}_{n \geq 1}$ σ -алгебр $\mathcal{F}_n \subseteq \mathcal{F}$ и $\{b_n\}_{n \geq 1}$ — неубывающая,

* Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, факультет числительной математики и кибернетики, Воробьевы горы, 119899 Москва, Россия.

¹⁾ Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, гранты № 99-01-00846, 99-01-00847, 01-01-00644.

неограниченная последовательность положительных чисел такие, что

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^{r-1} b_n^{-2r} \mathbf{E}|X_n|^{2r} < \infty \quad (1)$$

для некоторого $r > 1$.

Если существует строго возрастающая последовательность натуральных чисел $\{k_n\}_{n \geq 1}$ такая, что $\sup_{n \geq 1} k_{n+1} k_n^{-1} = d < \infty$ и $0 < b = \inf_{n \geq 1} b_{k_n} b_{k_{n+1}}^{-1} \leq \sup_{n \geq 1} b_{k_n} b_{k_{n+1}}^{-1} = c < 1$, то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} \sum_{k=1}^n X_k = 0 \quad \text{почти всюду.} \quad (2)$$

Доказательство. Положим $k_0 = 0$, $b_0 = 0$, $T_n = b_{k_n}^{-1} \sum_{j=k_{n-1}+1}^{k_n} X_j$. Для каждого натурального числа n найдется натуральное число m такое, что $k_{m-1} < n \leq k_m$. Без ограничения общности рассуждений можно считать, что $n > k_1$ и, следовательно, $k_{m-1} \geq 1$ и $b_n \geq b_{k_{m-1}} > 0$. Мы имеем

$$\frac{1}{b_n} \sum_{j=1}^n X_j = \frac{b_{k_{m-1}}}{b_n} \sum_{j=1}^{m-1} \frac{b_{k_j}}{b_{k_{m-1}}} T_j + \frac{1}{b_n} \sum_{j=k_{m-1}+1}^n X_j.$$

Так как $b_{k_{m-1}} \geq b b_{k_m}$, то

$$\left| \frac{1}{b_n} \sum_{j=1}^n X_j \right| \leq \left| \sum_{j=1}^{m-1} \frac{b_{k_j}}{b_{k_{m-1}}} T_j \right| + \frac{1}{b b_{k_m}} \max_{k_{m-1} < l \leq k_m} \left| \sum_{j=k_{m-1}+1}^l X_j \right|. \quad (3)$$

Для справедливости (2) достаточно доказать, что каждое из двух слагаемых справа в (3) сходится почти всюду к нулю при $m \rightarrow \infty$. Первое слагаемое будет сходиться почти всюду к нулю по лемме Теплица (см. [4, с. 252]), если выполнены следующие условия:

$$\lim_{j \rightarrow \infty} T_j = 0 \quad \text{п.в.}, \quad \sup_{m \geq 2} \sum_{j=1}^{m-1} \frac{b_{k_j}}{b_{k_{m-1}}} < \infty, \quad \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{b_{k_j}}{b_{k_{m-1}}} = 0 \quad \text{для каждого } j.$$

Третье из этих условий выполняется, так как по предположению последовательность $\{b_n\}_{n \geq 1}$ монотонно возрастает и неограничена. Второе условие следует из соотношений

$$\frac{b_{k_j}}{b_{k_{m-1}}} = \prod_{i=j}^{m-2} \frac{b_{k_i}}{b_{k_{i+1}}} \leq c^{m-j-1}, \quad \sum_{j=1}^{m-1} \frac{b_{k_j}}{b_{k_{m-1}}} \leq \sum_{j=1}^{m-1} c^{m-j-1} = \frac{1-c^m}{1-c} < \frac{1}{1-c},$$

так как по предположению $b_{k_j} \leq c b_{k_{j+1}}$, $c \in (0, 1)$. Таким образом, первое слагаемое справа в (3) будет сходиться почти всюду к нулю при $m \rightarrow \infty$, если последовательность $\{T_n\}_{n \geq 1}$ сходится почти всюду к нулю. Убедимся в этом. По неравенству Буркхольдера (см., например, [6, с. 396])

$$\mathbf{E}|T_n|^{2r} \leq D_r b_{k_n}^{-2r} \mathbf{E} \left[\sum_{j=k_{n-1}+1}^{k_n} X_j^2 \right]^r,$$

где D_r — некоторая постоянная, зависящая только от r . Положим $p = r/(r-1)$. По неравенству Гёльдера

$$\begin{aligned} \mathbf{E} \left[\sum_{j=k_{n-1}+1}^{k_n} X_j^2 \right]^r &\leq \mathbf{E} \left[(k_n - k_{n-1})^{1/p} \left(\sum_{j=k_{n-1}+1}^{k_n} |X_j|^{2r} \right)^{1/r} \right]^r \\ &= (k_n - k_{n-1})^{r-1} \sum_{j=k_{n-1}+1}^{k_n} \mathbf{E}|X_j|^{2r}. \end{aligned}$$

По предположению мы имеем, что $k_n - k_{n-1} \leq dk_{n-1}$, $n \geq 2$. Пусть ε — произвольное положительное число. Привлекая неравенство Маркова, мы получим

$$\begin{aligned} \varepsilon^{2r} \sum_{n=2}^{\infty} \mathbf{P} \{ |T_n| > \varepsilon \} &\leq \sum_{n=2}^{\infty} \mathbf{E} |T_n|^{2r} \leq D_r \sum_{n=2}^{\infty} (k_n - k_{n-1})^{r-1} b_{k_n}^{-2r} \sum_{j=k_{n-1}+1}^{k_n} \mathbf{E} |X_j|^{2r} \\ &\leq D_r d^{r-1} \sum_{n=2}^{\infty} \sum_{j=k_{n-1}+1}^{k_n} j^{r-1} b_j^{-2r} \mathbf{E} |X_j|^{2r} = D_r d^{r-1} \sum_{n=2}^{\infty} n^{r-1} b_n^{-2r} \mathbf{E} |X_n|^{2r} < \infty. \end{aligned}$$

Конечность последнего ряда справа обеспечивается условием (1). По лемме Бореля–Кантелли последовательность $\{T_n\}_{n \geq 1}$ сходится почти всюду к нулю.

Обратимся ко второму слагаемому в правой части (3). По максимальному неравенству Дуба (см., например, [6, с. 247])

$$\varepsilon^{2r} \mathbf{P} \left\{ \max_{k_{m-1} < l \leq k_m} \left| \sum_{j=k_{m-1}+1}^l X_j \right| > \varepsilon b_{k_m} \right\} \leq b_{k_m}^{-2r} \mathbf{E} \left| \sum_{j=k_{m-1}+1}^{k_m} X_j \right|^{2r}.$$

Снова привлекая неравенство Буркхольдера и неравенство Гёльдера, мы получим

$$\begin{aligned} b_{k_m}^{-2r} \mathbf{E} \left| \sum_{j=k_{m-1}+1}^{k_m} X_j \right|^{2r} &\leq D_r d^{r-1} \sum_{j=k_{m-1}+1}^{k_m} j^{r-1} b_j^{-2r} \mathbf{E} |c_{n,j} X_j|^{2r}, \\ \varepsilon^{2r} \sum_{m=2}^{\infty} \mathbf{P} \left\{ \max_{k_{m-1} < l \leq k_m} \left| \sum_{j=k_{m-1}+1}^l X_j \right| > \varepsilon b_{k_m} \right\} &\leq D_r d^{r-1} \sum_{m=2}^{\infty} \frac{m^{r-1}}{b_m^{2r}} \mathbf{E} |X_m|^{2r} < \infty. \end{aligned}$$

По лемме Бореля–Кантелли последовательность

$$\left\{ b_{k_m}^{-1} \max_{k_{m-1} < l \leq k_m} \left| \sum_{j=k_{m-1}+1}^l X_j \right| \right\}_{m \geq 1}$$

сходится почти всюду к нулю. Теорема доказана.

Следствие. Пусть $\{X_n\}_{n \geq 1}$ — мартигал-разность относительно возрастающей последовательности $\{\mathcal{F}_n\}_{n \geq 1}$ σ -алгебр $\mathcal{F}_n \subseteq \mathcal{F}$ и $b_n = n^\delta$, $n = 1, 2, \dots$. Если выполнено условие (1), то справедливо (2).

Доказательство. Последовательности $b_n = n^\delta$ и $k_n = 2^n$, $n = 1, 2, \dots$, удовлетворяют условиям теоремы. Следствие доказано.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Brunk H. D. The strong law of large numbers. — Duke Math. J., 1948, v. 15, p. 181–195.
2. Прохоров Ю. В. Об усиленном законе больших чисел. — Изв. АН СССР, сер. матем., 1950, т. 14, № 6, с. 523–536.
3. Chung K. L. The strong law of large numbers. — Proceedings of the Second Berkeley Symposium on Statistics and Probability (California, 1950), 1951, p. 341–352.
4. Лозв М. Теория вероятностей. М.: ИЛ, 1962, 719 с.
5. Chow Y. S. On a strong law of large numbers for martingales. — Ann. Math. Statist., 1967, v. 28, p. 610–611.
6. Chow Y. S., Teicher Y. Probability Theory: Independence, Interchangeability, Martingales. Berlin: Springer-Verlag, 1988, 467 p.
7. Fazekas L., Klesov O. A general approach to the strong laws of large numbers. — Теория вероятн. и ее примен., 2000, т. 45, в. 3, с. 568–583.

Поступила в редакцию
3.XII.2001