

Основы теории открытых квантовых систем. Лекция 3.

Теретёнков Александр Евгеньевич

21 сентября 2020 г.

В прошлой серии...

Мы увидели, что унитарной динамики недостаточно:

- Для описания декогерентности, в частности, процесса неселективного измерения.
- Для описания динамики населённостей, в частности, процесса селективного измерения.

Таким образом, уравнение Лиувилля – фон Неймана нужно обобщать.

Уравнение Горини – Коссаковского – Сударшана – Линдблада

В форме Линдблада:

$$\frac{d}{dt}\rho_t = -i[H, \rho_t] + \underbrace{\sum_j \left(C_j \rho_t C_j^\dagger - \frac{1}{2} C_j^\dagger C_j \rho_t - \frac{1}{2} \rho_t C_j^\dagger C_j \right)}_{=\mathcal{D}(\rho_t) - \text{Диссипатор}}$$

На самом деле можно показать, что достаточно суммировать по j от 1 до $n^2 - 1$.

Уравнение Горини – Коссаковского – Сударшана – Линдблада

В форме Коссаковского:

$$\frac{d}{dt} \rho_t = -i[H, \rho_t] + \sum_{i=1, k=1}^{n^2-1} a_{ik} \left([F_i, \rho_t F_k^\dagger] + [F_i \rho_t, F_k^\dagger] \right), \quad (1)$$

где матрица $a = a^\dagger \geq 0$.

Упражнение. Показать, что две эти формы эквивалентны.

Помогает ли нам уравнение ГКСЛ описать
декогерентность и перенос?

Пусть $C_{ij} = \sqrt{\gamma_{ij}}|i\rangle\langle j|$, $\gamma_{ij} \geq 0$

$$\mathcal{D}(\rho) = \sum_{ij} \gamma_{ij} \left(|i\rangle\langle j| \rho |j\rangle\langle i| - \frac{1}{2} |j\rangle\langle j| \rho - \frac{1}{2} \rho |j\rangle\langle j| \right)$$

$$H = \sum_i \varepsilon_i |i\rangle\langle i|$$

Такого вида генераторы ГКСЛ получаются в пределе слабой
связи в случае общего положения.

Помогает ли нам уравнение ГКСЛ описать
декогерентность и перенос?

$$\begin{aligned}\langle k | [H, \rho] | m \rangle &= \sum_i \varepsilon_i \langle k | [|i \rangle \langle i |, \rho] | m \rangle = \\ &= \sum_i \varepsilon_i (\delta_{ik} \rho_{im} - \delta_{im} \rho_{ki}) = (\varepsilon_k - \varepsilon_m) \rho_{km}\end{aligned}$$

Помогает ли нам уравнение ГКСЛ описать
декогерентность и перенос?

$$\begin{aligned}\langle k | \mathcal{D}(\rho) | m \rangle &= \sum_{ij} \gamma_{ij} \langle k | \left(|i\rangle\langle j| \rho |j\rangle\langle i| - \frac{1}{2} |j\rangle\langle j| \rho - \frac{1}{2} \rho |j\rangle\langle j| \right) |m\rangle = \\ &= \sum_{ij} \gamma_{ij} \left(\delta_{ik} \rho_{jj} \delta_{im} - \frac{1}{2} \delta_{kj} \rho_{jm} - \frac{1}{2} \rho_{kj} \delta_{jm} \right)\end{aligned}$$

Помогает ли нам уравнение ГКСЛ описать
декогерентность и перенос?

$$\begin{aligned}\langle k | \mathcal{D}(\rho) | m \rangle &= \sum_{ij} \gamma_{ij} \langle k | \left(|i\rangle\langle j| \rho |j\rangle\langle i| - \frac{1}{2} |j\rangle\langle j| \rho - \frac{1}{2} \rho |j\rangle\langle j| \right) |m\rangle = \\ &= \sum_{ij} \gamma_{ij} \left(\delta_{ik} \rho_{jj} \delta_{im} - \frac{1}{2} \delta_{kj} \rho_{jm} - \frac{1}{2} \rho_{kj} \delta_{jm} \right)\end{aligned}$$

$$k \neq m$$

$$\langle k | \mathcal{D}(\rho) | m \rangle = -\frac{1}{2} \sum_i (\gamma_{ik} + \gamma_{im}) \rho_{km}$$

Помогает ли нам уравнение ГКСЛ описать
декогерентность и перенос?

$$\begin{aligned}\langle k | \mathcal{D}(\rho) | m \rangle &= \sum_{ij} \gamma_{ij} \langle k | \left(|i\rangle\langle j| \rho |j\rangle\langle i| - \frac{1}{2} |j\rangle\langle j| \rho - \frac{1}{2} \rho |j\rangle\langle j| \right) |m\rangle = \\ &= \sum_{ij} \gamma_{ij} \left(\delta_{ik} \rho_{jj} \delta_{im} - \frac{1}{2} \delta_{kj} \rho_{jm} - \frac{1}{2} \rho_{kj} \delta_{jm} \right)\end{aligned}$$

$$k \neq m$$

$$\langle k | \mathcal{D}(\rho) | m \rangle = -\frac{1}{2} \sum_i (\gamma_{ik} + \gamma_{im}) \rho_{km}$$

$$k = m$$

$$\langle k | \mathcal{D}(\rho) | k \rangle = \sum_j \gamma_{kj} \rho_{jj} - \left(\sum_i \gamma_{ik} \right) \rho_{kk}$$

Помогает ли нам уравнение ГКСЛ описать декогерентность и перенос?

В результате получаем уравнение Паули для населённостей

$$\frac{d}{dt} \rho_{kk} = \sum_j \gamma_{kj} \rho_{jj} - \left(\sum_i \gamma_{ik} \right) \rho_{kk}$$

и динамику когерентностей

$$\frac{d}{dt} \rho_{km} = \left(-i(\varepsilon_k - \varepsilon_m) - \frac{1}{2} \sum_i (\gamma_{ik} + \gamma_{im}) \right) \rho_{km}$$

Таким образом, мы получили возможность описывать как перенос, так и декогерентность.

Декогерентность и спектроскопия

$$\frac{d}{dt} \rho_{km} = \left(-i(\varepsilon_k - \varepsilon_m) - \frac{1}{2} \sum_i (\gamma_{ik} + \gamma_{im}) \right) \rho_{km}$$

Обозначим, $\omega_{km} = \varepsilon_k - \varepsilon_m$, $\frac{1}{2} \sum_i (\gamma_{ik} + \gamma_{im}) = \Gamma_{km}$. Тогда
решение имеет вид

$$\rho_{km}(t) = e^{-(\Gamma_{km} - i\omega_{km})t} \rho_{km}(0)$$

Декогерентность и спектроскопия

$$\frac{d}{dt} \rho_{km} = \left(-i(\varepsilon_k - \varepsilon_m) - \frac{1}{2} \sum_i (\gamma_{ik} + \gamma_{im}) \right) \rho_{km}$$

Обозначим, $\omega_{km} = \varepsilon_k - \varepsilon_m$, $\frac{1}{2} \sum_i (\gamma_{ik} + \gamma_{im}) = \Gamma_{km}$. Тогда
решение имеет вид

$$\rho_{km}(t) = e^{-(\Gamma_{km} - i\omega_{km})t} \rho_{km}(0)$$

Декогерентность и спектроскопия

N -уровневая система обычно получается аппроксимациями из непрерывной, тогда оператора дипольного момента ex и

$$d_{km} = \int e\phi_k(x)^* x \phi_m(x)$$

Если оператор пространственной чётности коммутирует с гамильтонианом системы, то $\phi_i(x)$ имеют фиксированную чётность и

$$d_{kk} = 0$$

Декогерентность и спектроскопия

$$\langle d(t) \rangle = \text{Tr } d\rho(t) = \sum_{mk} d_{mk} \rho_{km}(t) = \sum_{m \neq k} d_{mk} e^{-(\Gamma_{km} - i\omega_{km})t} \rho_{km}(0),$$

$$\rho(-t) = (e^{\mathcal{L}t}(\rho(0))^T)^T$$

$$\rho_{km}(-t) = e^{-(\Gamma_{km} + i\omega_{km})t} \rho_{km}(0)$$

$$\langle d(-t) \rangle = \sum_{m \neq k} e^{-(\Gamma_{km} + i\omega_{km})t} d_{mk} \rho_{km}(0)$$

Декогерентность и спектроскопия

$$\langle d(\omega) \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\omega t} \langle d(t) \rangle dt - ?$$

Декогерентность и спектроскопия

$$\begin{aligned}\langle d(\omega) \rangle &= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-i\omega t} \langle d(t) \rangle dt = \\ &= \int_0^{+\infty} dt e^{-i\omega t} \sum_{m \neq k} d_{mk} e^{-(\Gamma_{km} - i\omega_{km})t} \rho_{km}(0) + \\ &\quad + \int_0^{+\infty} dt e^{i\omega t} \sum_{m \neq k} d_{mk} e^{-(\Gamma_{km} + i\omega_{km})t} \rho_{km}(0) = \\ &= \sum_{m \neq k} \frac{2\Gamma_{km}}{(\omega - \omega_{km})^2 + \Gamma_{km}^2} d_{mk} \rho_{km}(0)\end{aligned}$$

— Лоренцевское (однородное) уширение спектра.

Очевидные "хорошие" свойства ГКСЛ генератора

$$\frac{d}{dt}\rho_t = \mathcal{L}(\rho_t)$$

$$\mathcal{L}(\rho) \equiv -i[H, \rho] + \sum_j \left(C_j \rho C_j^\dagger - \frac{1}{2} C_j^\dagger C_j \rho - \frac{1}{2} \rho C_j^\dagger C_j \right)$$

- ① $\mathcal{L}(X^\dagger) = (\mathcal{L}(X))^\dagger$.
- ② $\text{Tr } \mathcal{L}(\rho) = 0$.

Генератор типа классической диффузии: $C_i = C_i^\dagger$

$$C_j \rho C_j - \frac{1}{2} C_j^2 \rho - \frac{1}{2} \rho C_j^2 = -\frac{1}{2} [C_j, [C_j, \rho]]$$

Отметим, что на супероператор $\partial_H \equiv -i[H, \cdot]$ можно смотреть как на абстрактное дифференцирование на алгебре матриц: он линеен и выполнено правило Лейбница

$$\partial_H(AB) = A\partial_H(B) + \partial_H(A)B.$$

$$\frac{d}{dt} \rho = \partial_H \rho + \frac{1}{2} \sum_j \partial_{C_j}^2 \rho$$

Утверждение. Всякий линейный супероператор Φ удовлетворяющий

$$\Phi(AB) = A\Phi(B) + \Phi(A)B$$

имеет вид $\Phi(A) = [H, A]$.

Упражнение. Спектр $[H, \cdot]$? Если $H = \sum_j \varepsilon_j |j\rangle\langle j|$.