

Основы теории открытых квантовых систем II. Лекция 8.

Теретёнков Александр Евгеньевич

21 марта 2022 г.

Уравнение с неэрмитовым гамильтонианом

Рассмотрим гильбертово пространство $\mathbb{C} \oplus \mathbb{C}^n$ и матрицу

$$\rho = \begin{pmatrix} \rho_{00} & \langle \psi | \\ |\psi \rangle & R \end{pmatrix}, \quad \rho_{00} = 1 - \text{Tr } R, \quad R = R^\dagger.$$

Уравнение с неэрмитовым гамильтонианом

Утверждение. Решение уравнения ГКСЛ $\rho(t)$ в $\mathbb{C} \oplus \mathbb{C}^n$

$$\frac{d}{dt}\rho(t) = -i[0 \oplus H, \rho(t)] + \sum_{l=1}^K \left(L_l \rho(t) L_l^\dagger - \frac{1}{2} L_l^\dagger L_l \rho(t) - \frac{1}{2} \rho(t) L_l^\dagger L_l \right),$$

где $H \in \mathbb{C}^{n \times n}$ ($H = H^\dagger$) и $L_l = \sqrt{\gamma_l} |0\rangle\langle l| \in \mathbb{C}^{(n+1) \times (n+1)}$,

имеет вид представленный на предыдущем слайде, где $|\psi(t)\rangle$ и $R(t)$ удовлетворяет уравнения

$$\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle = -iH_{\text{eff}}|\psi(t)\rangle,$$

$$\frac{d}{dt}R(t) = -iH_{\text{eff}}R(t) + iR(t)H_{\text{eff}}^\dagger,$$

где

$$iH_{\text{eff}} = iH + \frac{1}{2} \sum_{l=1}^n \gamma_l |l\rangle\langle l|,$$

—аккретивная матрица.

Доказательство. Для простоты рассмотрим случай $|\psi(t)\rangle = 0$.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} 0 \oplus R(t) &= -i0 \oplus H_{\text{eff}} R(t) + i0 \oplus R(t) H_{\text{eff}}^\dagger = \\ &= -i0 \oplus [H, R(t)] - \\ &\quad - \frac{1}{2} \sum_{l=1}^n 0 \oplus \gamma_l |l\rangle\langle l| R(t) - \frac{1}{2} \sum_{l=1}^n 0 \oplus \gamma_l R(t) |l\rangle\langle l| = \\ &= -i[0 \oplus H, 0 \oplus R(t)] - \frac{1}{2} \sum_{l=1}^n \gamma_l |l\rangle\langle 0| |0\rangle\langle l| 0 \oplus R(t) - \\ &\quad - \frac{1}{2} \sum_{l=1}^n \gamma_l 0 \oplus R(t) |l\rangle\langle 0| |0\rangle\langle l| = \\ &= -i[0 \oplus H, \rho(t)] - \frac{1}{2} \sum_l \left(L_l^\dagger L_l \rho(t) + \rho(t) L_l^\dagger L_l \right), \end{aligned}$$

где были использованы ортогональность $\langle 0|l\rangle = 0, l \neq 0$ и определение $L_l = \sqrt{\gamma_l} |0\rangle\langle l|$.

Уравнение с неэрмитовым гамильтонианом

Кроме того,

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \text{Tr } R(t)|0\rangle\langle 0| &= - \sum_l \gamma_l \langle l|R(t)|l\rangle|0\rangle\langle 0| = \\ &= - \sum_l \gamma_l |0\rangle\langle l|0 \oplus R(t)|l\rangle\langle 0| = - \sum_l L_l \rho(t) L_l^\dagger.\end{aligned}$$



"Одночастичное" вторичное квантование

Определение. Рассмотрим гильбертово пространство вида $\mathbb{C} \oplus \mathbb{C}^n$. Пусть, кроме того, \mathcal{X}_i — вспомогательные гильбертовы пространства $\dim \mathcal{X}_i \geq 2$. Введём линейную инъекцию $\hat{\cdot}: \mathbb{C} \oplus \mathbb{C}^n \rightarrow \otimes_{i=1}^n \mathcal{X}_i$, определённую на базисных векторах по правилу

$$|l\rangle \rightarrow |\hat{l}\rangle = |0\rangle_1 \otimes \cdots \otimes |0\rangle_{l-1} \otimes |1\rangle_l \otimes |0\rangle_{l+1} \otimes \cdots \otimes |0\rangle_n, \quad l \neq 0;$$
$$|0\rangle \rightarrow |\hat{0}\rangle = |0\rangle_1 \otimes \cdots \otimes |0\rangle_n.$$

Такое отображение будем называть **одночастичным вторичным квантованием**.

$$\hat{\rho} = \sum_{l,k=0}^n \rho_{lk} |\hat{l}\rangle \langle \hat{k}|.$$

"Одночастичное" вторичное квантование

Утверждение. Пусть a_l — произвольный набор операторов таких, что $a_l^\dagger |\hat{0}\rangle = |\hat{l}\rangle$ и $a_l |\hat{l}\rangle = |\hat{0}\rangle$. Пусть ρ_t удовлетворяет уравнению

$$\frac{d}{dt} \rho(t) = -i[0 \oplus H, \rho(t)] + \sum_{l=1}^K \left(L_l \rho(t) L_l^\dagger - \frac{1}{2} L_l^\dagger L_l \rho(t) - \frac{1}{2} \rho(t) L_l^\dagger L_l \right),$$

с коэффициентами, определёнными в предыдущем утверждении. Тогда $\hat{\rho}_t$ удовлетворяет уравнению

$$\frac{d}{dt} \hat{\rho}(t) = -i[\hat{H}, \hat{\rho}(t)] + \sum_{l=1}^n \gamma_l \left(a_l \hat{\rho}(t) a_l^\dagger - \frac{1}{2} a_l^\dagger a_l \hat{\rho}(t) - \frac{1}{2} \hat{\rho}(t) a_l^\dagger a_l \right),$$

$$\hat{H} = \sum_{l,k=1}^n H_{lk} a_l^\dagger a_k.$$

"Одночастичное" вторичное квантование

В физических приложениях в качестве операторов a_l чаще всего выбираются

- бозонные операторы уничтожения b_l , удовлетворяющие каноническим коммутационным соотношениями $[b_l, b_k^\dagger] = \delta_{lk}, [b_l, b_k] = 0,$
- фермионные операторы уничтожения f_l , удовлетворяющие антисимметрическим соотношениям $\{f_l, f_k^\dagger\} = \delta_{lk}, \{f_l, f_k\} = 0,$
- двухуровневые операторы уничтожения σ_l , удовлетворяющие $\{\sigma_l, \sigma_l^\dagger\} = I, \{\sigma_l, \sigma_l\} = 0, [\sigma_l, \sigma_k] = 0, [\sigma_l, \sigma_k^\dagger] = 0, l \neq k.$

Важно отметить, что не обязательно выбирать операторы одинакового типа для всех индексов.

"Одночастичное" вторичное квантование. Примеры

Для (бозонных) гауссовских состояний введём "ополовиненные" обозначения $\mu_j \equiv \text{Tr} a_j \hat{\rho}$, $Y_{ij} \equiv \text{Tr} a_i^\dagger a_j \hat{\rho} - \bar{\mu}_i \mu_j$, $Z_{ij} \equiv \text{Tr} a_i a_j \hat{\rho} - \mu_i \mu_j$

Упражнение. Если обозначить, то $V(t) = e^{-iH_{\text{eff}}t}$

$$\mu(t) = V(t)\mu(0),$$

$$Y(t) = \overline{V}(t)Y(0)V^T(t),$$

$$Z(t) = V(t)Z(0)V^T(t).$$

"Одночастичное" вторичное квантование. Примеры

Модель Джейнса-Каммингса с диссипацией (Сачдев) при нулевой температуре определяется уравнением ГКСЛ

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\hat{\rho}(t) = & -i[\Omega\sigma^\dagger\sigma + \omega_1 b^\dagger b + g(\sigma^\dagger b + \sigma b^\dagger), \hat{\rho}(t)] + \\ & + \gamma \left(b\hat{\rho}(t)b^\dagger - \frac{1}{2}b^\dagger b\hat{\rho}(t) - \frac{1}{2}\hat{\rho}(t)b^\dagger b \right).\end{aligned}$$

Оно сводится к одночастичному

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\rho(t) = & -i[\Omega|1\rangle\langle 1| + \omega_1|2\rangle\langle 2| + g(|1\rangle\langle 2| + |2\rangle\langle 1|), \rho(t)] + \\ & + \gamma \left(|0\rangle\langle 2|\rho(t)|2\rangle\langle 0| - \frac{1}{2}|2\rangle\langle 2|\rho(t) - \frac{1}{2}\rho(t)|2\rangle\langle 2| \right).\end{aligned}$$

А оно к динамике с неэрмитовым гамильтонианом

$$H_{\text{eff}} = \Omega|1\rangle\langle 1| + \left(\omega_1 - i\frac{\gamma}{2} \right) |2\rangle\langle 2| + g(|2\rangle\langle 1| + |1\rangle\langle 2|).$$

Немарковский резонансный распад

Вернёмся к модели спин-бозона в приближении врачающейся волны:

$$G(t) = g^2 e^{-(\frac{\gamma}{2} + i\omega_1)t}$$

$$H_{\text{eff}} = \Omega |\hat{1}\rangle\langle\hat{1}| + \left(\omega_1 - i\frac{\gamma}{2}\right) |\tilde{1}\rangle\langle\tilde{1}| + g(|\tilde{1}\rangle\langle\hat{1}| + |\hat{1}\rangle\langle\tilde{1}|).$$

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} \psi_1(t) \\ \psi_{\tilde{1}}(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -i\Omega & -ig \\ -ig & -i\omega_1 - \frac{\gamma}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \psi_1(t) \\ \psi_{\tilde{1}}(t) \end{pmatrix}.$$

Немарковский резонансный распад

Резонансный случай $\omega_1 = \Omega$.

Решение в случае начального условия $\psi_1(0) = 1, \psi_{\tilde{1}}(0) = 0$ имеет вид

$$\psi_1(t) = e^{-(\frac{\gamma}{4} + i\Omega)t} \left(\operatorname{ch} \Delta t + \frac{\gamma}{4\Delta} \operatorname{sh} \Delta t \right),$$

$$\psi_{\tilde{1}}(t) = -\frac{ig}{\Delta} e^{-(\frac{\gamma}{4} + i\Omega)t} \operatorname{sh} \Delta t,$$

где $\Delta = \frac{1}{4} \sqrt{\gamma^2 - 16g^2}$.