

Основы теории открытых квантовых систем.
Лекция 8. Вполне положительные отображения.
Соответствие Чоя-Ямилковского.
Представления Крауса и Стайнспринга

Теретёнков Александр Евгеньевич

29 октября 2025 г.

В прошлой лекции...

В общем случае

$$F_k F_j = \frac{\delta_{kj}}{n} I + \frac{i}{2} \sum_{l=1}^{n^2-1} z_{kjl}^* F_l$$

Коэффициенты:

$$z_{kjl} = f_{kjl} + i d_{kjl},$$

f_{kjl} — структурные константы $su(n)$. Кроме того, в выбранном базисе f_{kjl} — полностью антисимметричны, а d_{kjl} — полностью симметричны.

В прошлой лекции...

Обобщённые уравнения Блоха

$$\dot{v} = Gv + b$$

(вещественные v)

$$G = Q + R$$

В прошлой лекции...

$$\begin{aligned}Q_{sm} &= \sum_{j=1}^{n^2-1} h_j f_{jms} \\R_{sm} &= -\frac{1}{4} \sum_{j,k,l=1}^{n^2-1} a_{jk} (z_{jlm} f_{kls} + \bar{z}_{klm} f_{jls}) = \\&= -\frac{1}{4} \sum_{j \leq k, l=1}^{n^2-1} (2 - \delta_{jk}) \operatorname{Re} a_{jk} (f_{jlm} f_{kls} + f_{klm} f_{jls}) + \\&\quad + \frac{1}{2} \sum_{j \leq k, l=1}^{n^2-1} \operatorname{Im} a_{jk} (-d_{jlm} f_{kls} + d_{klm} f_{jls}) \\b_s &= \frac{i}{n} \sum_{j=1}^{n^2-1} a_{jk} f_{jks} = -\frac{2}{n} \sum_{j < k=1}^{n^2-1} \operatorname{Im} a_{jk} f_{jks}\end{aligned}$$

В прошлой лекции...

$$Q_{sm} = \sum_{j=1}^{n^2-1} h_j f_{jms}$$

— зависит только от структурных констант алгебр Ли.

$$Q = -Q^T$$

В случае обратимой эволюции это единственный ненулевой член.

Поэтому, в случае обратимой эволюции

$$\frac{d}{dt}(v, v) = (v, (Q + Q^T)v) = 0$$

Обобщённые уравнения Блоха

$$R_{sm} = -\frac{1}{4} \sum_{j \leq k, l=1}^{n^2-1} (2 - \delta_{jk}) \operatorname{Re} a_{jk} (f_{jlm} f_{kls} + f_{klm} f_{jls}) + \\ + \frac{1}{2} \sum_{j \leq k, l=1}^{n^2-1} \operatorname{Im} a_{jk} (-d_{jlm} f_{kls} + d_{klm} f_{jls})$$

При $\operatorname{Im} a_{jk} = 0$ уравнение зависит только от структурных констант алгебры Ли.

$$b_s = -\frac{2}{n} \sum_{j < k=1}^{n^2-1} \operatorname{Im} a_{jk} f_{jks}$$

При $\operatorname{Im} a_{jk} = 0$ получим $b_s = 0$.

Обобщённые уравнения Блоха

То есть, если a — вещественная матрица, то получаем однородное уравнение

$$\dot{v} = Gv,$$

причём G выражается через a только через структурные константы алгебры Ли $su(n)$.

На самом деле, случай вещественного a , это просто случай генератора типа классической диффузии.

Обобщённые уравнения Блоха

При $n = 2$ в общем случае $R = R^T$ (и так было в наших примерах). В случае произвольного n это неверно, однако если a — вещественная матрица, то $R = R^T$.

Симметричность спектра

Из того, что уравнения Блоха (в самосопряжённом базисе) вещественные следует, что если собственное значение комплексное, то и сопряжённое является собственным

Вполне положительные отображения

Линейное отображение $\Phi : \mathbb{C}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{C}^{n \times n}$ называется **положительным**, если

$$\Phi(X) \geq 0 \quad \forall X \geq 0$$

Вполне положительные отображения

Линейное отображение $\Phi : \mathbb{C}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{C}^{n \times n}$ называется **положительным**, если

$$\Phi(X) \geq 0 \quad \forall X \geq 0$$

Линейное отображение $\Phi : \mathbb{C}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{C}^{n \times n}$ называется **вполне положительным**, если отображение

$$\Phi \otimes \mathcal{I}_{n^2} : \mathbb{C}^{n^2 \times n^2} \rightarrow \mathbb{C}^{n^2 \times n^2}$$

положительно.

Вполне положительные отображения

Вполне положительность в более явном виде:

$$\Phi \otimes \mathcal{I}_{n^2} \underbrace{\begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}}_{\forall \geq 0} = \begin{pmatrix} \Phi(A_{11}) & \cdots & \Phi(A_{1n}) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \Phi(A_{n1}) & \cdots & \Phi(A_{nn}) \end{pmatrix} \geq 0$$

Вполне положительные отображения

Иногда также вводят k -положительное отображения:

Отображение называется **k -положительным**, если отображение

$$\Phi \otimes \mathcal{I}_{k^2} : \mathbb{C}^{nk \times nk} \rightarrow \mathbb{C}^{nk \times nk}$$

положительно.

Вполне положительные отображения

Отображение сохраняет след, если

$$\mathrm{Tr} \Phi(X) = \mathrm{Tr} X, \quad \forall X \in \mathbb{C}^{n \times n}$$

Сохраняющее след вполне положительное отображение называется **квантовым каналом** (в представлении Шредингера). Отметим, что если Φ сохраняет след, то и $\Phi \otimes \mathcal{I}_{k^2}$ сохраняет след.

Вполне положительные отображения

Положительные отображения являются аналогом матриц с неотрицательными коэффициентами. Очевидно, что если A — матрица с неотрицательными коэффициентами, то $A \otimes \mathcal{I}_{k^2}$ тоже такова, поэтому в классическом случае условие вполне положительности является излишним.

Вполне положительные отображения

Положительные отображения являются аналогом матриц с неотрицательными коэффициентами. Очевидно, что если A — матрица с неотрицательными коэффициентами, то $A \otimes \mathcal{I}_{k^2}$ тоже такова, поэтому в классическом случае условие вполне положительности является излишним.

Условие нормировки выделяющее стохастической матрицы $e^T P p = e^T p$ аналогично условию сохранению следа. Поэтому квантовые каналы являются аналогами стохастических матриц (классических каналов).

Вполне положительные отображения

Отображение называется унитальным (сохраняющим единицу), если

$$\Phi(I) = I$$

Вполне положительные отображения

Отображение называется унитальным (сохраняющим единицу), если

$$\Phi(I) = I$$

Утверждение. $\text{Tr } \Phi(X) = \text{Tr } X, \quad \forall X \in \mathbb{C}^{n \times n} \Leftrightarrow \Phi^*(I) = I.$

Вполне положительные отображения

Отображение называется унитальным (сохраняющим единицу), если

$$\Phi(I) = I$$

Утверждение. $\text{Tr } \Phi(X) = \text{Tr } X, \quad \forall X \in \mathbb{C}^{n \times n} \Leftrightarrow \Phi^*(I) = I.$

Доказательство:

$$\text{Tr } X = \text{Tr } \Phi(X) = \text{Tr } I^\dagger \Phi(X) = \text{Tr}(\Phi^*(I))^\dagger X$$

Выбирая в качестве $X = |i\rangle\langle j|$, получим $\Phi^*(I) = I$.

□

Вполне положительные отображения

Отображение называется унитальным (сохраняющим единицу), если

$$\Phi(I) = I$$

Утверждение. $\text{Tr } \Phi(X) = \text{Tr } X, \quad \forall X \in \mathbb{C}^{n \times n} \Leftrightarrow \Phi^*(I) = I.$

Доказательство:

$$\text{Tr } X = \text{Tr } \Phi(X) = \text{Tr } I^\dagger \Phi(X) = \text{Tr}(\Phi^*(I))^\dagger X$$

Выбирая в качестве $X = |i\rangle\langle j|$, получим $\Phi^*(I) = I$. □

Поэтому можно говорить, что унитальное вполне положительное отображение задаёт квантовый канал в представлении Гейзенберга.

Вполне положительные отображения

Отображение называется унитальным (сохраняющим единицу), если

$$\Phi(I) = I$$

Утверждение. $\text{Tr } \Phi(X) = \text{Tr } X, \quad \forall X \in \mathbb{C}^{n \times n} \Leftrightarrow \Phi^*(I) = I.$

Доказательство:

$$\text{Tr } X = \text{Tr } \Phi(X) = \text{Tr } I^\dagger \Phi(X) = \text{Tr}(\Phi^*(I))^\dagger X$$

Выбирая в качестве $X = |i\rangle\langle j|$, получим $\Phi^*(I) = I$. □

Поэтому можно говорить, что унитальное вполне положительное отображение задаёт квантовый канал в представлении Гейзенберга.

В классике, аналогом этого утверждения была возможность переписать условие нормировки как $P^T e = e$.

Вполне положительные отображения

Вполне положительное отображение, которое одновременно сохраняет след и унитально, часто называют **бистохастическим** каналом (иногда унитальным), так как оно аналогично бистохастическим матрицам $Pe = e, P^T e = e$.

Соответствие Чоя-Ямилковского

Максимально сцепленное состояние в $\mathbb{C}^n \otimes \mathbb{C}^n$

$$|\Omega\rangle = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{j=1}^n |j\rangle \otimes |j\rangle$$

$$|\Omega\rangle\langle\Omega| = \frac{1}{n} \sum_{i,j=1}^n |i\rangle\langle j| \otimes |i\rangle\langle j|$$

Соответствие Чоя-Ямилковского

Соответствие (иногда говорят изоморфизм) Чоя-Ямилковского:
Каждому линейному отображению $\Phi : \mathbb{C}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{C}^{n \times n}$
сопоставим $n^2 \times n^2$ -матрицу

$$\rho_\Phi = \Phi \otimes \mathcal{I}_{n^2}(|\Omega\rangle\langle\Omega|).$$

Соответствие Чоя-Ямилковского

Упражнение. Соответствие Чоя-Ямилковского является обратимым. Обратное соответствие задаётся формулой

$$\Phi(X) = n \operatorname{Tr}_R \rho_\Phi(I_n \otimes X^T)$$

X^T — транспонирование в базисе $|j\rangle$.

Соответствие Чоя-Ямилковского

Если Φ — квантовый канал, то ρ_Φ является матрицей плотности.

Доказательство: В силу вполне положительности

$$\Phi \otimes \mathcal{I}_{n^2}(|\Omega\rangle\langle\Omega|) \geq 0.$$

В силу сохранения нормировки ρ_Φ — матрица плотности. □

Представление Краусса

Утверждение. Φ — канал тогда и только тогда, когда

$$\Phi(\rho) = \sum_{l=1}^{n'} W_l \rho W_l^\dagger, \quad \sum_{l=1}^{n'} W_l^\dagger W_l = I_n.$$

(минимальное число членов будем называть крауссовским рангом $W - \text{rank}\Phi$).

Представление Крауса

Доказательство: Произвольную матрицу плотности можно представить в виде

$$\rho_{\Phi} = \sum_{l=1}^{n'} |w_l\rangle\langle w_l|, \quad n' \leq n^2, \quad |w_l\rangle \in \mathbb{C}^{n^2},$$

где $\min n' = \text{rank } \rho_{\Phi}$. В частности всегда можно выбрать $\langle w_l | w_k \rangle = \|w_l\|^2 \delta_{lk}$.

Введём матрицы $W_l \in \mathbb{C}^{n \times n}$ по формуле

$$\langle k | W_l | i \rangle = \sqrt{n} \langle k \otimes i | w_l \rangle$$

Представление Краусса

Так как $\langle k \otimes i | \rho_\Phi | m \otimes j \rangle = \frac{1}{n} \langle k | \Phi(|i\rangle\langle j|) | m \rangle$, то

$$\sum_{l=1}^{n'} \langle k \otimes i | w_l \rangle \langle w_l | m \otimes j \rangle = \frac{1}{n} \langle k | \Phi(|i\rangle\langle j|) | m \rangle$$

$$\frac{1}{n} \sum_{l=1}^{n'} \langle k | W_l | i \rangle \langle j | W_l^\dagger | m \rangle = \frac{1}{n} \langle k | \Phi(|i\rangle\langle j|) | m \rangle$$

$$\sum_{l=1}^{n'} \sum_{i,j} \langle k | W_l | i \rangle \langle i | \rho | j \rangle \langle j | W_l^\dagger | m \rangle = \langle k | \Phi(\rho) | m \rangle$$

$$\sum_{l=1}^{n'} W_l \rho W_l^\dagger = \Phi(\rho)$$

Представление Краусса

Сохранение следа

$$\sum_{l=1}^{n'} W_l^\dagger W_l = I_n$$

Представление Крауса

Наоборот, если

$$\Phi(\rho) = \sum_{l=1}^{n'} W_l \rho W_l^\dagger,$$

то для $X \geq 0$

$$\begin{aligned}\Phi \otimes \mathcal{I}_{n^2}(X) &= \sum_{l=1}^{n'} W_l \otimes I_n X (W_l \otimes I_n)^\dagger = \\ &= \sum_{l=1}^{n'} \sum_x W_l \otimes I_n |x\rangle\langle x| (W_l \otimes I_n)^\dagger \geq 0 \quad \square\end{aligned}$$

Представление Крауса

$$V = \begin{pmatrix} W_1 \\ \vdots \\ W_{n'} \end{pmatrix}$$

— матрица из n ортонормированных векторов (репер) в $k = n \times n'$ -мерном пространстве. Множество таких ортонормированных наборов называется (комплексным) многообразием Штифеля при фиксированных n и k .

$$V^\dagger V = \begin{pmatrix} W_1^\dagger & \dots & W_{n'}^\dagger \end{pmatrix} \begin{pmatrix} W_1 \\ \vdots \\ W_{n'} \end{pmatrix} = I_n,$$

а отображение называется изометрией.

Представление Крауса

Унитальность

$$\sum_{l=1}^{n'} W_l W_l^\dagger = I_n$$

Представление Краусса

Разложение Краусса в ортонормированном базисе

$$W_l = \sum_{i=1}^{n^2} F_i \operatorname{Tr}(F_i^+ W_l), \quad \operatorname{Tr} F_i^+ F_j = \delta_{ij}$$

$$\Phi(\rho) = \sum_{l=1}^{n'} W_l \rho W_l^\dagger = \sum_{i,j=1}^{n^2} \underbrace{\sum_{l=1}^{n'} \operatorname{Tr}(F_i^+ W_l) \overline{\operatorname{Tr}(F_j^+ W_l)} F_i \rho F_j^\dagger}_{C_{ij}}$$

$$C \geq 0$$

Сводная таблица для представления Чоя-Ямилковского

$$\begin{aligned}
 \Phi : \mathbb{C}^{n \times n} &\rightarrow \mathbb{C}^{n \times n} \\
 \Phi(X^\dagger) &= \Phi(X)^\dagger \\
 \operatorname{tr} \Phi(\rho) &= \operatorname{tr} \rho \\
 \Phi(I) &= I \\
 (\Phi \otimes I_n)(X) &\geq 0, \forall X \geq 0 \\
 (\Phi \otimes I_k)(X) &\geq 0, \forall X \geq 0, k \leq n \\
 \Phi(\rho) &= \sum_l W_l \rho W_l^\dagger \\
 &\quad W - \operatorname{rank} \Phi \\
 \operatorname{tr} F_l^\dagger F_k &= \delta_{lk} \\
 \Phi(\rho) &= \sum_{lk} C_{lk} F_l \rho F_k^\dagger
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \rho_\Phi : \mathbb{C}^n \otimes \mathbb{C}^n &\rightarrow \mathbb{C} \\
 \rho_\Phi^\dagger &= \rho_\Phi \\
 \operatorname{Tr}_R \rho_\Phi &= \frac{I_n}{n} \\
 \operatorname{Tr}_S \rho_\Phi &= \frac{I_n}{n} \\
 \rho_\Phi &\geq 0 \\
 \langle \psi | \rho_\Phi | \psi \rangle &\geq 0, S - \operatorname{rank}(|\psi\rangle) = k \\
 \rho_\Phi &= \sum_l |w_l\rangle \langle w_l| \\
 &\quad \operatorname{rank} \rho_\Phi \\
 \langle \varphi_l | \varphi_k \rangle &= \delta_{lk} \\
 \rho_\Phi &= \sum_{lk} C_{lk} |\varphi_l\rangle \langle \varphi_k|
 \end{aligned}$$

$S - \operatorname{rank}(|\psi\rangle) \equiv \operatorname{rank} \operatorname{Tr}_R |\psi\rangle \langle \psi|$ — ранк Шмидта.

Представление Стайнспринга

Резервуар $R' = \mathbb{C}^{n'}$

$$\Phi(\rho) = \text{Tr}_{R'} U(\rho \otimes |1\rangle\langle 1|)U^\dagger$$

$$(U|i \otimes 1\rangle = \sum_{l=1}^{n'} W_l |i \otimes l\rangle)$$

Достроим набор ортонормированных векторов до ортонормированного базиса

$$U = \begin{pmatrix} W_1 & \dots \\ \vdots & \\ W_{n'} & \dots \end{pmatrix}$$

$$U(\rho \otimes |1\rangle\langle 1|)U^\dagger = \begin{pmatrix} W_1 \rho W_1^\dagger & \dots \\ \vdots & \\ W_{n'} \rho W_{n'}^\dagger & \dots & W_{n'} \rho W_{n'}^\dagger \end{pmatrix}$$

Примеры вполне положительных отображений

Унитарное отображение U_i с вероятностью p_i , тогда

$$\Phi(\rho) = \mathbb{E}U\rho U^\dagger = \sum_i p_i U_i \rho U_i^\dagger$$

Φ — унитальный канал. ($W_i = \sqrt{p_i}U_i$)

Примеры вполне положительных отображений

Упражнение. Пусть

$$\Phi(\rho) = \sum_{ij} P_{ij} |i\rangle\langle j| \rho |j\rangle\langle i|,$$

тогда вполне-положительное, если P матрица с неотрицательными коэффициентами, квантовый канал, если P — стохастическая, унитальный канал, если P — бистохастическая.

Условные математические ожидания

Вполне положительный идемпотент $\mathcal{P}^2 = \mathcal{P}$ называется условным математическим ожиданием.

Примеры:

1

$$\mathcal{P}\rho = \sum_x \Pi_x \rho \Pi_x$$

Π_x — ортогональное разложение единицы.

2 $\mathcal{H}_S \otimes \mathcal{H}_R$

$$\mathcal{P}\rho = \text{Tr}_R \rho \otimes \rho_\beta$$