

УДК 513.6

В. В. Батырев, Д. А. Мельников

**ТЕОРЕМА О НЕПРОДОЛЖАЕМОСТИ ТОРИЧЕСКИХ МНОГООБРАЗИЙ**

**1. Введение.** В этой статье будет исследована проблема продолжаемости гладких торических многообразий, то есть вложения их как обильных дивизоров в гладкое многообразие. Основной результат работы содержится в теореме 2. В пункте 2 доказано обобщение точной последовательности Эйлера на торические многообразия. В пункте 3 результаты пункта 2 применяются к подсчету когомологий  $H^1(X, T_X \otimes \mathcal{L}^{-1})$ , где  $T_X$  — касательное расслоение на  $X$ , а  $\mathcal{L}$  — обильный обратимый пучок. Завершает доказательство применение критерия непродолжаемости Фуджиты.

Мы придерживаемся следующих обозначений:  $K$  — основное поле;  $M$  и  $N$  — двойственные решетки;  $\sigma$  — конус в пространстве  $N_{\mathbf{Q}} = N \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Q}$ ;  $\Sigma$  — веер в  $N_{\mathbf{Q}}$ ;  $\Sigma^{(k)}$  — множество  $k$ -мерных конусов из  $\Sigma$ ;  $|\Sigma^{(k)}| = \bigcup_{\sigma \in \Sigma^{(k)}} \sigma$ ;  $X_{\Sigma}$  — торическое многообразие, ассоциированное с веером  $\Sigma$ ;  $D_i$  — страты  $X$ , ассоциированные с конусами  $\sigma_i \in \Sigma^{(1)}$ ;  $T = \text{Spec } K[M]$  — максимальный тор, содержащийся в  $X$ ;  $\text{Div inv}(X)$  — группа инвариантных при действии  $T$  дивизоров на  $X$ ;  $T_X$  — касательное расслоение;  $\Omega^1_X$  — пучок 1-дифференциалов на  $X$ .

**2. Точная последовательность Эйлера.** Для проективного пространства хорошо известна точная последовательность Эйлера:

$$0 \rightarrow \Omega_{\mathbb{P}^n}^1 \rightarrow \mathcal{O}(-1)^{n+1} \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}^n} \rightarrow 0. \tag{1}$$

Мы докажем ее обобщение для гладких торических многообразий.

**Теорема 1.** Пусть  $X$  — гладкое торическое многообразие,  $\dim(X) = n$ ,  $\text{rk Pic}(X) = \rho$ . Тогда существует точная последовательность

$$0 \rightarrow \Omega_X^1 \rightarrow \bigoplus_{i=1}^{n+\rho} \mathcal{O}_X(-D_i) \rightarrow \mathcal{O}_X^{\rho} \rightarrow 0. \tag{2}$$

**Доказательство.** Обозначим через  $M$  группу характеров  $n$ -мерного тора  $T$ ,  $M \cong \mathbf{Z}^n$ . Имеем точную последовательность

$$0 \rightarrow M^{\rho} \rightarrow \text{Div inv}(X) \xrightarrow{q} \text{Pic}(X) \rightarrow 0,$$

где

$$p: M \rightarrow \text{Div inv}(X), \quad p(f) = \text{div}(f), \quad q: \text{Div inv}(X) \rightarrow \text{Pic}(X),$$

$q(D) = \bar{D}$  — образ дивизора  $D$  в  $\text{Pic}(X)$ . Умножим последовательность (2) на структурный пучок  $\mathcal{O}_X$  и отождествим  $M \otimes \mathcal{O}_X$  с пучком  $\Omega_X^1(\log)$  1-дифференциалов на  $X$  с логарифмическими полюсами вне  $T$  (см. [1], § 15). Рассмотрим естественные вложения

$$s: \Omega_X^1 \rightarrow \Omega_X^1(\log), \quad t: \bigoplus \mathcal{O}(-D_i) \rightarrow \text{Div inv}(X) \otimes \mathcal{O}_X.$$

Вычет Пуанкаре  $r: \Omega_X^1(\log) \rightarrow \bigoplus \mathcal{O}_{D_i}$  дает изоморфизм  $\Omega_X^1(\log)/\Omega_X^1 \cong \bigoplus \mathcal{O}_{D_i}$  (см. [1], с. 115). Коядро  $t$  также изоморфно  $\bigoplus \mathcal{O}_{D_i}$ .

Покажем, что

$$\bar{p} = p \otimes \text{id} : \Omega_X^1(\log) \rightarrow \text{Div inv}(X) \otimes \mathcal{O}_X$$

индуцирует тождественное отображение на  $\bigoplus \mathcal{O}_{D_i}$ . Локально, в аффинной карте  $W = \text{Spec } K[x_1, \dots, x_n]$ ,

$$p \left( f \frac{dx_i}{x_i} \right) = \text{div}(x_i) \otimes f \pmod{\mathcal{O}(-\text{div}(x_i))} = r \left( f \frac{dx_i}{x_i} \right)$$

(здесь  $f$  — характер  $\Gamma$  с полюсами вне  $W$ ). Таким образом, последовательность (1) является ядром эпиморфизма точных последовательностей

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \rightarrow & \Omega_X^1(\log) & \xrightarrow{\bar{p}} & \text{Div inv}(X) \otimes \mathcal{O}_X & \rightarrow & \text{Pic}(X) \otimes \mathcal{O}_X \rightarrow 0 \\ & & \downarrow r & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \rightarrow & \bigoplus \mathcal{O}_{D_i} & \xrightarrow{\text{id}} & \bigoplus \mathcal{O}_{D_i} & \longrightarrow & 0 \rightarrow 0, \end{array}$$

откуда следует утверждение теоремы.

**3. Основная теорема.** Сформулируем сначала несколько вспомогательных лемм об обратимых пучках на торическом многообразии. Пусть  $\mathcal{E} \in \text{Pic}(X_\Sigma)$ . Так как  $\text{Pic}(\Gamma) = 0$ , то  $\mathcal{E}|_\Gamma \cong \mathcal{O}_\Gamma$ . Назовем изоморфизм  $\varphi : \mathcal{E}|_\Gamma \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_\Gamma$  тривиализацией  $\mathcal{E}$ . Группа инвариантных дивизоров  $\text{Div inv}(X)$  изоморфна  $\{(\mathcal{E}, \varphi) \mid \mathcal{E} \in \text{Pic}(X_\Sigma), \varphi \text{ — тривиализация } \mathcal{E}\}$ . Решетка характеров тора действует транзитивно на тривиализациях, поэтому

$$\text{Pic}(X) \cong \text{Div inv}(X) / M.$$

**Лемма 1** (см. [1], 6.4):  $\text{Div inv}(X_\Sigma) = \{\text{функции } g : |\Sigma| \cap N \rightarrow \mathbf{Z} \text{ такие, что } g|_\sigma \text{ линейны для любого } \sigma \in \Sigma\}$ .

Обозначим функцию  $g$ , соответствующую  $(\mathcal{E}, \varphi)$ , через  $\text{ord}(\mathcal{E}, \varphi)$ .

**Лемма 2** (см. [1], 6.7, 6.9). Пусть  $\Sigma$  — полный веер,  $\mathcal{E} \in \text{Pic}(X_\Sigma)$  порождается своими глобальными сечениями тогда и только тогда, когда  $\text{ord}(\mathcal{E})$  выпукла вверх. Пучок  $\mathcal{E}$  обилен тогда и только тогда, когда  $\text{ord}(\mathcal{E})$  строго выпукла вверх, то есть выпукла вверх и для разных  $\sigma, \sigma' \in \Sigma^{(n)}$   $\text{ord}(\mathcal{E})|_\sigma$  и  $\text{ord}(\mathcal{E})|_{\sigma'}$  — разные линейные функции.

Будем обозначать через  $g_\sigma$  линейную функцию на  $\mathbf{R}^n$ , ограничение которой на  $\sigma$  совпадает с  $g|_\sigma$ .

**Лемма 3.** Пусть  $\mathcal{E} \in \text{Pic}(X_\Sigma)$  обилен на полном гладком многообразии  $X_\Sigma$  и  $D_0 \in \text{Div inv}(X)$  — дивизор, ассоциированный с конусом  $\sigma_0 \in \Sigma^{(1)}$ . Тогда  $\mathcal{E} \otimes \mathcal{O}(-D_0)$  порожден глобальными сечениями.

**Доказательство.** Обозначим:  $g = \text{ord}(\mathcal{E})$ ;  $h = \text{ord}(-D_0)$ ;  $e_i$  — примитивные векторы решетки  $N$ , лежащие на  $\sigma_i \in \Sigma^{(1)}$ . Докажем выпуклость функции  $g+h$ . Достаточно проверить справедливость неравенств

$$g_\sigma(e_i) + h_\sigma(e_i) \geq g(e_i) + h(e_i) \quad \forall \sigma \in \Sigma^{(n)}, \quad \forall e_i \notin \sigma.$$

Если  $e_0 \notin \sigma$ , то  $h_\sigma(e_i) = 0$ ,  $h(e_i) \leq 1$  и наше неравенство следует из строгой выпуклости  $g$  ( $g_\sigma(e_i) > g(e_i)$ ), если  $e_i \notin \sigma$ . Пусть  $e_0 \in \sigma$ , тогда выберем тривиализацию  $\mathcal{E}$  так, чтобы  $g_\sigma = 0$  ( $\sigma$  фиксировано). Рассмотрим такие векторы  $e_1, \dots, e_n \in N$ , что

$$\langle e_0, \dots, e_{n-1} \rangle = \sigma, \quad \langle e_1, \dots, e_n \rangle = \sigma' \in \Sigma^{(n)}.$$

Пусть

$$e_i = \sum_{j=0}^{n-1} a_{ij} e_j, \quad e_0 = \sum_{j=1}^n b_j e_j,$$

( $b_n = -1$ , поскольку  $\sigma$  и  $\sigma'$  базисные). Тогда

$$h_{\sigma}(e_i) = a_{i0}, \quad h(e_i) = 0, \quad g_{\sigma}(e_i) = 0, \quad g(e_i) \leq g_{\sigma'}(e_i) = a_{i0} g_{\sigma'}(e_0) = -a_{i0} g(e_n).$$

Так как  $g(e_n) < 0$ ,  $g(e_i) < 0$ , то  $g(e_i) \leq a_{i0}$ . Выпуклость доказана.

**Теорема 2.** Пусть  $X$  — гладкое торическое многообразие размерности  $n$  над алгебраически замкнутым полем характеристики нуль, которое вложено как обильный дивизор в гладкое многообразие  $Y$ . Тогда либо  $X \cong \mathbf{P}^n$ ,  $Y \cong \mathbf{P}^{n+1}$  и  $X$  — гиперплоскость в  $Y$ , либо  $X$  и  $Y$  — расслоения на проективные пространства над  $\mathbf{P}^1$   $X \cong \mathbf{P}(\mathcal{E})$ ,  $Y \cong \mathbf{P}(\mathcal{F})$  и существует точная последовательность локально-свободных пучков на  $\mathbf{P}^1$

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbf{P}^1} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow 0,$$

которая индуцирует вложение  $X \rightarrow Y$ . Более того, любое такое  $X$  можно вложить указанным способом в подходящее расслоение  $Y$ .

**Доказательство.** Будем вычислять  $H^1(X, T_X \otimes \mathcal{L}^{-1})$  для обильного  $\mathcal{L}$ , а затем применим критерий Фуджиты [2].

Докажем, что если  $H^1(X, T_X \otimes \mathcal{L}^{-1}) \neq 0$  для некоторого обильного пучка  $\mathcal{L}$ , то  $X$  — расслоения на проективные пространства над  $\mathbf{P}^1$  (это верно для любого поля  $K$ ). Воспользуемся последовательностью, двойственной последовательности (1), умноженной на  $\mathcal{L}^{-1}$ :

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_X^0 \otimes \mathcal{L}^{-1} \rightarrow \bigoplus \mathcal{O}_{D_i} \otimes \mathcal{L}^{-1} \rightarrow T_X \otimes \mathcal{L}^{-1} \rightarrow 0.$$

Здесь

$$H^2(X, \mathcal{L}^{-1}) = H^{n-2}(X, \omega \otimes \mathcal{L}) = 0$$

(по [1], 7.5.2). Отсюда

$$H^1(X, T_X \otimes \mathcal{L}^{-1}) = \bigoplus_{m \in M} H^1(X, \mathcal{O}(D_i) \otimes \mathcal{L}^{-1})(m).$$

Эта группа снабжена  $M$ -градуировкой. Зафиксируем  $i \leq n + \rho$ ,  $m \in M$ , такие, что

$$H^1(X, \mathcal{O}(D_i) \otimes \mathcal{L}^{-1})(m) \neq 0.$$

Пусть  $g = \text{ord}(\mathcal{L} \otimes \mathcal{O}(-D_i))$ . Введем замкнутое множество

$$Z_m = \{x \in |\Sigma| : m(x) \geq -g(x)\}.$$

Тогда ([1], § 7)

$$H^1(X, \mathcal{O}(D_i) \otimes \mathcal{L}^{-1})(m) = H_{Z_m}^1(\mathbf{R}^n, K).$$

Рассмотрим точную последовательность пары

$$\dots \rightarrow H^0(\mathbf{R}^n \setminus Z_m) \rightarrow H_{Z_m}^1(\mathbf{R}^n) \rightarrow H^1(\mathbf{R}^n) = 0.$$

Так как  $H_{Z_m}^1(\mathbf{R}^n) \neq 0$ , то множество  $\mathcal{U} = \mathbf{R}^n \setminus Z_m$  несвязно. По лемме 3 функция  $g$  выпукла вверх. Тогда  $Z_m$  является выпуклым конусом. Следовательно,  $\mathcal{U}$  несвязно тогда и только тогда, когда  $Z_m$  — подпространство размерности  $n - 1$ , в частности,  $g(x) \leq -m(x)$  для любого  $x$ . Имеем  $Z_m \subset |\Sigma^{(n-1)}|$ . В самом деле, если существует  $x \in Z_m$ , не лежащий в  $|\Sigma^{(n-1)}|$ , то  $x$  находится строго внутри некоторого конуса

$\sigma \in \Sigma^{(n)}$ . Но  $g|_{\sigma}$  линейна и не константа (поскольку  $\sigma \not\subset Z_m$ ), следовательно, существует  $y \in \sigma$ , такой, что  $g(y) > -m(y)$ . Противоречие. Покажем теперь, что в  $Z_m$  лежат ровно  $n$  конусов из  $\Sigma^{(1)}$ . Действительно,  $g|_{Z_m} = -m$ , а  $\text{ord}(D_i)$  равна нулю на всех примитивных векторах конусов из  $\Sigma^{(1)}$ , кроме одного. Таким образом, если бы в  $Z_m$  лежало более  $n$  конусов из  $\Sigma^{(1)}$ , то функция  $\text{ord}(\mathcal{L}) = g + \text{ord}(D_i)$  не была бы строго выпуклой. В силу гладкости  $X$  эти конусы образуют веер проективного пространства  $\mathbf{P}^{n-1}$ . Выберем базис в  $N$  так, чтобы  $Z_m = \{x_n = 0\}$ ,

$$\Sigma^{(1)} \cap Z_m = \{\langle x_1 \rangle, \dots, \langle x_{n-1} \rangle, e_i = \langle -x_1 - \dots - x_{n-1} \rangle\}$$

и  $D_i$  был ассоциирован с конусом  $\langle e_i \rangle$ . Докажем, что в полупространствах  $x_n > 0$  и  $x_n < 0$  лежит по одному конусу из  $\Sigma^{(1)}$ . Предположим, что в  $\{x_n > 0\}$  содержится не менее двух конусов из  $\Sigma^{(1)}$ . Выберем (перенумеруем, если это будет необходимо,  $x_1, \dots, x_{n-1}$ ) такие  $e, e' \in N \cap \{x_n > 0\}$ , что

$$\langle x_1, \dots, x_{n-1}, e \rangle = \sigma_1 \in \Sigma^{(n)} \text{ и } \langle x_1, \dots, x_{n-2}, e, e' \rangle = \sigma_2 \in \Sigma^{(n)}.$$

Тогда

$$e' = \sum_{j=1}^{n-1} a_j x_j + a_n e, \quad a_j \in \mathbf{Z},$$

поскольку  $\sigma_1, \sigma_2$  — базисные, то  $a_{n-1} = -1$ . Обозначим  $h = \text{ord}(\mathcal{L})$ , тогда  $h(e_i) = h_{\sigma_i}(e_i) - 1$ . Из неравенств  $h(e') < h_{\sigma_1}(e')$  и  $h(e_i) < h_{\sigma_2}(e_i)$  следует

$$\sum_{j=0}^{n-1} a_j h(x_j) + a_n h(e) - 1 < h(e') < \sum_{j=1}^{n-1} a_j h(x_j) + a_n h(e).$$

Но  $h(e')$  — целое. Противоречие.

Итак, в каждом из полупространств  $x_n > 0$  и  $x_n < 0$  содержится по одному лучу из  $\Sigma^{(1)}$ . Таким образом,  $\Sigma$  является веером расслоения на проективные пространства над  $\mathbf{P}^1$ .

Применим теперь критерий непродолжаемости Фуджиты, заключающийся в следующем: пусть для любого обильного пучка  $\mathcal{L}$  на многообразии  $X$  не  $\cong \mathbf{P}^n$

$$H^1(X, T_X \otimes \mathcal{L}^{-1}) = 0;$$

тогда  $X$  не может быть обильным дивизором в гладком многообразии. В [2] утверждение доказано над полем  $\mathbf{C}$ . Однако, используя то, что  $H^i(X, \mathcal{L} \otimes \omega) = 0$  при  $i > 0$  (см. [1], 7.5.2), нетрудно перенести доказательство [2] на алгебраически замкнутое поле характеристики нуль. Получаем, что обильными дивизорами среди гладких торических многообразий могут быть только расслоения. Теперь заключение нашей теоремы следует из результатов [3].

Авторы благодарны В. И. Данилову за ряд весьма полезных замечаний.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Данилов В. И. Геометрия торических многообразий. — Успехи матем. наук, 1978, 33, № 2, 85—134.
2. Fujita T. Impossibility criterion of being an ample divisor. — J. Math. Soc. Jap., 1982, 34, N 2, 355—363.

3. Badescu L. On ample divisors. II. — In: Proceedings of the Week of Algebraic Geometry. Bucharest, 1980, p. 12–32. Teubner-Texte zur Mathematik, Bd 40. Leipzig, 1981.

Поступила в редакцию  
21.05.84

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. I. МАТЕМАТИКА. МЕХАНИКА, 1986, № 3

УДК 517.51

Д. В. Панников

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИБЛИЖЕНИЯ  ${}_1F_1(1, c, az)$  НА  $[0, \infty)$

Вырожденная гипергеометрическая функция имеет вид

$${}_1F_1(1, c, az) = \Gamma(c) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(az)^k}{\Gamma(c+k)}.$$

Например,  ${}_1F_1(1, 1, z) = e^z$ . Для оценки сверху чебышевских постоянных для  $e^{-z}$  относительно  $[0, \infty)$

$$\rho_n = \min_{\pi} \|e^{-z} - \pi(z)\|_{C[0, \infty)},$$

где минимум взят по действительным рациональным функциям степени не выше  $n$ , в работах [1, 2, 3] использованы различные методы. Положим

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (\rho_n)^{1/n} = 1/q.$$

Давно сформулирована гипотеза о том, что  $q=9$  (см., например, [3]), а в последнее время — о том, что  $q > 9$  (см. [4]). В настоящей статье доказывается, что  $q > 9$ . Этот результат допускает следующее обобщение.

**Теорема.** Пусть  $c \in \mathbb{R}$ ,  $1 - c \in \mathbb{N}$ . Тогда

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (\min_{\pi_n} \|{}_1F_1(1, c, -z) - \pi_n(z)\|_{C[0, \infty)})^{1/n} < 1/9,$$

где минимум взят по действительным рациональным функциям степени не выше  $n$ .

Теорема опирается на ряд вспомогательных утверждений.

**Лемма 1.** Пусть  $1 - c \in \mathbb{N}$ , многочлен  $Q(z)$  представлен в виде:

$$Q(z) = \int_0^{\infty} t^{c-1} e^{-t} T(t, z) dt,$$

где  $T(t, z)$  — многочлен от двух переменных. Тогда

$$Q(z) {}_1F_1(1, c, z) - \frac{e^z \Gamma(c)}{z^{c-1}} \int_0^z t^{c-1} e^{-t} T(t, z) dt = P(z)$$

есть многочлен.