



Math-Net.Ru

Общероссийский математический портал

Н. К. Никольский, О возмущениях спектра
унитарных операторов,
Матем. заметки, 1969, том 5,
выпуск 3, 341–349

<https://www.mathnet.ru/mzm6854>

Использование Общероссийского математического портала
Math-Net.Ru подразумевает, что вы прочитали и согласны
с пользовательским соглашением

<https://www.mathnet.ru/rus/agreement>

Параметры загрузки:

IP: 18.97.14.83

20 мая 2025 г., 13:28:11



О ВОЗМУЩЕНИЯХ СПЕКТРА УНИТАРНЫХ ОПЕРАТОРОВ

Н. К. Никольский

Изучается устойчивость существенного спектра унитарных операторов при ядерных и компактных возмущениях. Библ. 10 назв.

1. Пусть A — линейный непрерывный оператор в (сепарабельном) гильбертовом пространстве \mathcal{H} . *Существенным спектром* оператора A будем называть дополнение $\sigma_e(A)$ множества всех нормальных точек *) оператора A до всей комплексной плоскости. Хорошо известно следующее утверждение об устойчивости существенного спектра (см. [1], теорема И. Ц. Гохберга, стр. 39, и следствия из нее).

ТЕОРЕМА А. *Если резольвентное множество $\rho(A)$ оператора A связно и K — вполне непрерывный оператор, то*

$$\sigma_e(A) = \sigma_e(A + K).$$

С другой стороны, уже для унитарных операторов A , спектр которых заполняет единичную окружность $C = \{z: |z|=1\}$, это предложение, вообще говоря, не имеет места. Более того, легко указать унитарный оператор U и одномерный оператор K такие, что

$$\sigma_e(U + K) = \bar{D} \stackrel{\text{def}}{=} \{z: |z| \leq 1\}.$$

*) Число λ называется *нормальной точкой оператора A* [1], если λ — либо регулярная точка A , либо изолированное собственное число, которому соответствует конечномерный спектральный проектор.

В настоящей заметке *) описываются те унитарные операторы U , на которые в той или иной мере распространяется теорема A о возмущении существенного спектра. Устанавливается, что устойчивость существенного спектра оператора связана с наличием некоторого «люка» в его спектре, соединяющего внешность и внутренность единичной окружности C . Строго говоря, основной целью заметки является доказательство следующих теорем.

ТЕОРЕМА 1. Пусть U — унитарный оператор в (сепарабельном) гильбертовом пространстве \mathcal{H} .

1) Если оператор U имеет неприводящее **) инвариантное подпространство, то

$$\sigma_e(U + K) = \bar{D} = \{z : |z| \leq 1\}$$

при некотором одномерном операторе K .

2) Если любое U -инвариантное подпространство приводит оператор U , то $\sigma_e(U + K) = \sigma_e(U)$ для любого ***) K , $K \in \mathfrak{S}_1$.

Здесь и далее через \mathfrak{S}_1 обозначается симметрично-нормированный (с.-н.) идеал (см. [1]) всех ядерных операторов в \mathcal{H} ; \mathfrak{S}_∞ — с.-н. идеал всех вполне непрерывных операторов в \mathcal{H} ; \mathfrak{S}_2 — с.-н. идеал всех операторов Гильберта-Шмидта.

ТЕОРЕМА 2. Пусть U — унитарный оператор в \mathcal{H} , не имеющий неприводящих инвариантных подпространств.

1) Если спектр $\sigma(U)$ оператора U совпадает со всей окружностью C , а \mathfrak{S} — с.-н. идеал операторов в \mathcal{H} , причем $\mathfrak{S} \supset \mathfrak{S}_1$, $\mathfrak{S} \neq \mathfrak{S}_1$, то существует оператор K , $K \in \mathfrak{S}$ такой, что $\sigma_e(U + K) = \bar{D}$.

2) Если $\sigma(U) \neq C$, то $\sigma_e(U + K) = \sigma_e(U)$ для любого K , $K \in \mathfrak{S}_\infty$.

Другими словами, из теорем 1 и 2 вытекает, что если $\sigma(U) = C$, то существует T , $T \in \mathfrak{S}$, такой, что $\sigma_e(U + T) = \bar{D}$, причем \mathfrak{S} — любой с.-н. идеал, отличный от \mathfrak{S}_1 .

*) Своим появлением заметка обязана вопросу В. И. Мацаева и А. С. Маркуса о поведении существенного спектра при компактных возмущениях, а также поддержке и добрым советам М. Ш. Бирмана.

**) Подпространство (\equiv замкнутое подпространство) M приводит оператор U , если $UM \subset M$ и $U(\mathcal{H} \ominus M) \subset \mathcal{H} \ominus M$.

***) Легко показать, что в этом случае $\sum \|\lambda_k - 1\| < \infty$, если $\{\lambda_k\}$ — собственные числа оператора $U + K$, $K \in \mathfrak{S}_1$.

Что же касается возмущений из \mathfrak{S}_1 , то здесь все определяется не спектром U , а наличием у него неприводящих инвариантных подпространств.

2. Простейшим унитарным оператором со свойством неустойчивости существенного спектра является оператор сдвига S в пространстве L^2 всех (классов) функций, измеримых и суммируемых с квадратом на окружности $C = \{z: |z| = 1\}$,

$$(Sf)(z) = zf(z), \quad z \in C, \quad f \in L^2.$$

Действительно, положим

$$K = -(\cdot, e_{-1})e_0, \quad e_0(z) \equiv 1, \quad z \in C; \quad e_{-1} = S^{-1}e_0,$$

и заметим, что

$$S + K = S_+ \oplus Sl_+^*,$$

где $S_+ = S/H^2$ — оператор (одностороннего) сдвига на подпространстве H^2 всех функций из L^2 , коэффициенты Фурье которых с отрицательными номерами равны нулю. Теперь ясно, что $\sigma_e(S + K) = \sigma_e(S_+) = \bar{D} = \{z: |z| \leq 1\}$, и наше утверждение доказано.

Итак, если $U = S$ или если унитарный оператор U содержит часть *), унитарно эквивалентную оператору сдвига S , то его можно возмутить одномерным оператором K так, что $\sigma_e(U + K) = \sigma_e(S_+) = \bar{D}$.

В связи с этим обстоятельством напомним результат Дж. Вермера [2] об операторах, не содержащих оператора S .

ТЕОРЕМА Б. Унитарный оператор U не содержит никакой части, унитарно эквивалентной оператору сдвига S в том, и только в том случае, когда любое U -инвариантное подпространство приводит оператор U .

Несколько более полное утверждение содержится в работе [3]:

ТЕОРЕМА В. Пусть U — унитарный оператор в \mathcal{H} . Существуют подпространства \mathcal{H}_0 и \mathcal{H}_1 , приводящие U , $\mathcal{H} = \mathcal{H}_0 \oplus \mathcal{H}_1$, и такие, что

1) U/\mathcal{H}_0 унитарно эквивалентен прямой сумме нескольких экземпляров (может быть в счетном числе) оператора сдвига S ;

*) Частью оператора U называется сужение U/M оператора U на некоторое его инвариантное подпространство M .

2) любое инвариантное подпространство оператора $U|_{\mathcal{H}_1}$ является приводящим;

3) оператор $U|_{\mathcal{H}_1}$ унитарно эквивалентен оператору умножения на независимую переменную в пространстве *)

$\int_C \oplus L(\xi) d\mu(\xi)$, причем $\mu\Delta = 0$ для некоторого борелевского множества Δ , $\Delta \subset C$, положительной лебеговой меры, $\text{mes } \Delta > 0$.

С л е д с т в и е (Дж. Вермер). Любое U -инвариантное подпространство приводит оператор U в том, и только в том случае, когда $E(\Delta) = 0$ для некоторого борелевского множества Δ , $\Delta \subset C$, с $\text{mes } \Delta > 0$ (т. е. когда $\mathcal{H}_0 = \{0\}$). Здесь $E(\cdot)$ — спектральная мера, соответствующая унитарному оператору U .

3. Доказательству теорем 1 и 2 предшлели несколько лемм. Некоторые из них, по существу, содержатся в работе М. Ш. Бирмана и С. Б. Энтиной [5] (см. также [6]), хотя формально и являются обобщениями соответствующих утверждений из этой статьи.

ЛЕММА 1. Пусть Ω — ограниченная односвязная область комплексной плоскости со спрямляемой границей Γ , а F — функция со значениями в \mathfrak{S}_1 , регулярная в Ω . Если

$$F_R(z) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{F(z) + F(z)^*}{2} \geq 0$$

$$\left(\text{или } F_I(z) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{F(z) - F(z)^*}{2i} \geq 0 \right), z \in \Omega,$$

то при почти всех ξ , $\xi \in \Gamma$, существуют в смысле \mathfrak{S}_2 угловые граничные значения функции $F_1 = D_1 F D_2$,

$$F_1(\xi) = \lim_{z \rightarrow \xi} F_1(z),$$

каковы бы ни были вполне непрерывные операторы D_1 и D_2 .

Д о к а з а т е л ь с т в о. Следуя схеме доказательства леммы 2.4 из работы [5], установим сначала, что существуют слабые угловые граничные значения функции F .

*) Напомним [4], что прямой интеграл измеримого семейства L -подпространств из \mathcal{H} относительно меры μ ($\mu \geq 0$) есть подпространство пространства $L^2(C, \mathcal{H}, \mu)$, состоящее из всех (классов) функций f таких, что $f(\xi) \in L(\xi)$ при μ -почти всех ξ , $\xi \in C$.

Так как при любых f и g из пространства \mathcal{H} имеем

$$4(F(z)f, g) = (F(z)(f+g), f+g) - (F(z)(f-g), f-g) + \\ + i(F(z)f+ig, f+ig) - i(F(z)f-ig, f-ig)$$

то можно ограничиться рассмотрением функций вида $(F(\cdot)f, f)$, $f \in \mathcal{H}$. Для этих функций $\operatorname{Re}(F(z)f, f) \geq 0$, $z \in \Omega$, и наше утверждение следует из теоремы П. Фату — И. И. Привалова (см. [7]).

Чтобы закончить доказательство леммы, достаточно установить ограниченность норм $\|F(z)\|_{\mathfrak{S}_2}$ при угловом стремлении $z \rightarrow \zeta$, $z \in \Omega$, для почти всех ζ , $\zeta \in \Gamma$, и сослаться на лемму 2.1 из работы [5] о сильной сходимости в \mathfrak{S}_2 «окаймленных» последовательностей операторов. Имеем (ср. [6] и [5])

$$\|F(z)\|_{\mathfrak{S}_2}^2 = \operatorname{Sp} F(z)F(z)^* \leq \det(I + F(z)F(z)^*) \leq \\ \leq \det(I + F(z)F(z)^* + F(z) + F(z)^*) = \\ = \det(I + F(z))(I + F(z)^*) = |\det(I + F(z))|^2.$$

С другой стороны, $\det(I + F(z)F(z)^*) \geq 1$, $z \in \Omega$, так что функция $\det(I + F(\cdot))$ имеет (теорема П. Фату — И. И. Привалова) угловые граничные значения почти всюду на Γ , и, следовательно, нормы $\|F(z)\|_{\mathfrak{S}_2}$ ограничены в нужном нам смысле. Лемма доказана.

ЛЕММА 2. Функция $G_1 = D_1GD_2$, где $D_i \in \mathfrak{S}_2$, $i = 1, 2$, $G(z) = (U - z)^{-1}$, $|z| < 1$, а U — унитарный оператор в \mathcal{H} , имеет угловые граничные значения (в смысле \mathfrak{S}_2) при почти всех ζ , $|\zeta| = 1$.

Доказательство.

$$G_1 = D_1GD_2 = D_1U^{-1}(UG)D_2 = \tilde{D}_1UGD_2 = \\ = \frac{1}{4}\{(\tilde{D}_1^* + D_2)^*UG(\tilde{D}_1^* + D_2) - (\tilde{D}_1^* - D_2)^*UG(\tilde{D}_1^* - D_2) - \\ - i(\tilde{D}_1^* + iD_2)^*UG(\tilde{D}_1^* + iD_2) + i(\tilde{D}_1^* - iD_2)^*UG(\tilde{D}_1^* - iD_2)\}.$$

Отсюда следует, что можно ограничиться рассмотрением функции вида $F_1 = D^*UGD$, $D \in \mathfrak{S}_2$. Факторизуем теперь оператор D , $D = AB$, $A \in \mathfrak{S}_2$, $B \in \mathfrak{S}_\infty$, и положим $F = A^*UGA$. Проверим, что функция F удовлетворяет

условиям леммы 1. Действительно,

$$\begin{aligned} 2F_R(z) &= A^*(U(U-z)^{-1} + (U^* - \bar{z})^{-1}U^*)A = \\ &= A^*(U^* - \bar{z})^{-1}((U^* - \bar{z})U + U^*(U-z))(U-z)^{-1}A = \\ &= A^*(U^* - \bar{z})^{-1}(2 - 2(zU^*)_R)(U-z)^{-1}A \geq 0, \end{aligned}$$

так как

$$2 - 2(zU^*)_R \geq 2(1 - \|zU^*\|)I = 2(1 - |z|)I > 0.$$

Лемма 2 вытекает теперь из леммы 1.

ЛЕММА 3. Пусть U — унитарный оператор в \mathcal{H} , $E(\cdot)$ — его спектральная мера и Δ — борелевское подмножество на окружности C такое, что $E(\Delta) = 0$, $\text{mes } \Delta > 0$. Тогда при почти всех ζ , $\zeta \in \Delta$,

$$\mathfrak{S}_2 - \lim_{z \rightarrow \zeta} \left(D_1 G(z) D_2 - D_1 G\left(\frac{1}{z}\right) D_2 \right) = 0,$$

где $z \rightarrow \zeta$ угловым образом, $G(z) = (U - z)^{-1}$, $|z| \neq 1$, а $D_i \in \mathfrak{S}_2$, $i = 1, 2$.

Доказательство вытекает из леммы 2 и известной теоремы И. И. Привалова [7] о граничных значениях интегралов типа Коши (эта теорема применяется к функции Φ вида

$$\Phi(z) = (D_1 G(z) D_2 f, g) = \int_{|\zeta|=1} \frac{\psi(\zeta) d\mu(\zeta)}{z - \zeta}, \quad |z| \neq 1,$$

где μ — мера из представления п. 3) теоремы В

$$f, g \in \int_C \oplus L(\zeta) d\mu(\zeta)$$

и

$$\psi(\zeta) = ((D_2 f)(\zeta), (D_1^* g)(\zeta)), \quad \zeta \in C.$$

ЛЕММА 4. Пусть \mathfrak{S} — с.-н. идеал кольца всех ограниченных операторов в гильбертовом пространстве \mathcal{H} . Если A и B — самосопряженные (может быть неограниченные) операторы в \mathcal{H} и $A - B \in \mathfrak{S}$, то и $U_A - U_B \in \mathfrak{S}$. Здесь $U_A = (A + i)(A - i)^{-1}$ — преобразование Кэли оператора A .

Доказательство.

$$\begin{aligned} U_A - U_B &= (B - i)^{-1}((B - i)(A + i) - \\ &- (B + i)(A - i))(A - i)^{-1} = 2i(B - i)^{-1}(B - A)(A - i)^{-1} \in \mathfrak{S}. \end{aligned}$$

ЛЕММА 5. Пусть $\{\lambda_k\}_{k=1}^{\infty}$ и $\{\mu_k\}_{k=1}^{\infty}$ — последовательности комплексных чисел, $|\lambda_k| = |\mu_k| = 1$, $k \geq 1$, всюду плотные на окружности C . Тогда при некоторой перестановке $\{p_k\}_{k=1}^{\infty}$ натурального ряда $\sum_{k=1}^{\infty} |\lambda_k - \mu_{p_k}| < \infty$.

Доказательство леммы 5 лишь незначительными деталями отличается от доказательства одного предложения Дж. фон Неймана ([8] или [9], стр. 326) и потому может быть опущено*).

4. Доказательство теоремы 1. Первая часть теоремы уже доказана в начале. п. 2. Чтобы доказать второе утверждение теоремы, представим оператор $U + K - \lambda$, $K \in \mathfrak{S}_1$, в виде

$$U + K - \lambda = (I + K(U - \lambda)^{-1})(U - \lambda), \lambda \notin C.$$

Рассмотрим функции d_{\pm} :

$$d_+(\lambda) = \det_2(I + K(U - \lambda)^{-1}), |\lambda| < 1,$$

$$d_-(\lambda) = \det_2(I + K(U - \lambda)^{-1}), |\lambda| > 1,$$

где $\det_2(I + A)$, $A \in \mathfrak{S}_1$ (регуляризованный определитель порядка 2) определяется равенством $\det_2(I + A) = \det(I + A) \cdot \exp(\operatorname{Sp} A)$ (см. [1], стр. 214). Легко видеть, что $\det_2(I + AB) = \det_2(I + BA)$; $A, B \in \mathfrak{S}_2$; и, следовательно,

$$d_{\pm}(\lambda) = \det_2(I + D_1(U - \lambda)^{-1}D_2),$$

где $K = D_2D_1$ и $D_i \in \mathfrak{S}_2$, $i = 1, 2$. Если воспользоваться теперь непрерывной зависимостью $\det_2(I + A)$ от оператора A в метрике \mathfrak{S}_2 ([1], стр. 212) и леммой 3, то заметим, что

$$\lim_{\lambda \rightarrow \zeta} \left(d_+(\lambda) - d_-\left(\frac{1}{\bar{\lambda}}\right) \right) = 0 \quad (1)$$

при почти всех ζ , $\zeta \in \Delta$, где Δ — борелевское подмножество окружности C такое, что $E(\Delta) = 0$, $\operatorname{mes} \Delta > 0$, а $E(\cdot)$ — спектральная мера оператора U (см. теоремы Б и В).

*) Из леммы 5, в частности, вытекает, что если A и B — самосопряженные операторы с $\sigma(A) = \sigma(B) = (-\infty, \infty)$, то $\|UAU^{-1} - B\|_{\gamma} < \varepsilon$, где $\varepsilon > 0$, U — некоторый унитарный оператор, а \mathfrak{S} — с.-н. — идеал, $\mathfrak{S} \neq \mathfrak{S}_1$, $\mathfrak{S} \supset \mathfrak{S}_1$.

Теперь легко закончить доказательство теоремы 1. Так как функция d_+ регулярна в круге $\{\lambda: |\lambda| < 1\}$, то либо $d_+(\lambda) \equiv 0, |\lambda| < 1$, либо $d_+(\lambda) \neq 0$, за исключением, может быть, дискретного множества точек, сгущающегося только к окружности C . Последний случай означает как раз, что $\sigma_e(U + K) = \sigma_e(U)$, а первый случай невозможен. Действительно, если $d_+(\lambda) \equiv 0, |\lambda| < 1$, то из равенства (1) вытекает, что функция d_- имеет почти всюду на множестве Δ угловые граничные значения, равные нулю. Следовательно (теорема единственности Н. Н. Лузина, [7], стр. 292), $d_- \equiv 0$, что невозможно. Теорема доказана.

5. Доказательство теоремы 2. В доказательстве нуждается только первое утверждение теоремы 2, так как ее вторая часть содержится уже в теореме А.

Пусть \mathfrak{S} — с.-н. идеал, упомянутый в условии теоремы 2, U — унитарный оператор с $\sigma(U) = C$. Не умаляя общности, считаем, что $\lambda = 1$ не является собственным числом оператора U . Пусть A и H — самосопряженные операторы в \mathcal{H} , преобразования Кэли которых совпадают соответственно с операторами U и \tilde{S} , где \tilde{S} — оператор в \mathcal{H} , унитарно эквивалентный оператору сдвига S в пространстве L^2 . По теореме С. Курода [10] существуют самосопряженные операторы B и L с чисто точечным спектром такие, что $B - A \in \mathfrak{S}$ и $H - L \in \mathfrak{S}$. Спектры операторов U_B и U_L также точечные, и

$$U_B - U_A = U_B - U \in \mathfrak{S}, \quad U_L - U_H = U_L - \tilde{S} \in \mathfrak{S} \quad (\text{лемма 4}).$$

Применяя лемму 5 к последовательностям собственных чисел операторов U_B и U_L , убеждаемся, что существует унитарный оператор V такой, что $U_B - VU_LV^{-1} \in \mathfrak{S}_1$. Следовательно,

$$U - V\tilde{S}V^{-1} = (U - U_B) + (U_B - VU_LV^{-1}) + \\ + (VU_LV^{-1} - V\tilde{S}V^{-1}) \in \mathfrak{S}.$$

Из теоремы 1, п. 1) теперь вытекает, что

$$\sigma_e(U + K) = D = \{z: |z| \leq 1\}$$

при соответственном выборе оператора $K, K \in \mathfrak{S}$. Теорема доказана.

Ленинградское отделение
Математического института
им. В. А. Стеклова АН СССР

Поступило
1.III.1968

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- [1] Г о х б е р г И. Ц., К р е й н М. Г., Введение в теорию линейных несамосопряженных операторов в гильбертовом пространстве, М., 1965.
- [2] W e r m e r J., On invariant subspaces of normal operators, Proc. Amer. Math. Soc., 3, № 2 (1952), 270—277.
- [3] Н и к о л ь с к и й Н. К., Об инвариантных подпространствах унитарных операторов, Вестник Ленингр. ун-та. Сер. матем., № 19 (1966), 36—43.
- [4] Д а н ф о р д Н., Ш в а р ц Д ж., Линейные операторы, т. 1, М., 1962.
- [5] Б и р м а н М. Ш., Э н т и н а С. Б., Стационарный подход в абстрактной теории рассеяния, Изв. АН СССР. Сер. матем., 31, № 2 (1967), 401—430.
- [6] d e B r a n g e s L., Perturbation of selfadjoint transformations, Amer. J. Math., 84, № 4 (1962), 543—560.
- [7] П р и в а л о в И. И., Граничные свойства аналитических функций, М.—Л., 1950.
- [8] v o n N e u m a n n J., Charakterisierung des Spektrum eines Integraloperators, Act. sc. et ind., Paris, 1935.
- [9] А х и е з е р Н. И., Г л а з м а н И. М., Теория линейных операторов в гильбертовом пространстве, М., 1966.
- [10] К у р о д а S. T., On a theorem of Weyl-von Neumann, Proc. Japan Acad., 34, № 1 (1958), 11—15.