



Math-Net.Ru

Общероссийский математический портал

Е. Ю. Ногина, Соотношения между некоторыми классами эффективно топологических пространств,
Матем. заметки, 1969, том 5,
выпуск 4, 483–495

<https://www.mathnet.ru/mzm9482>

Использование Общероссийского математического портала Math-Net.Ru подразумевает, что вы прочитали и согласны с пользовательским соглашением

<https://www.mathnet.ru/rus/agreement>

Параметры загрузки:

IP: 18.97.9.168

22 мая 2025 г., 19:59:16



СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ НЕКОТОРЫМИ КЛАССАМИ ЭФФЕКТИВНО ТОПОЛОГИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВ

Е. Ю. Ногина

Исследуются соотношения между свойствами эффективно топологических пространств, такими, как наличие перечислимо регулярной базы, вычислимого пересечения, эффективная регулярность, нормальность и др.; устанавливается некоторый алгоритмический (конструктивный) аналог теоремы Урысона о метризации топологических пространств со счетной базой, показывается независимость условий, фигурирующих в этом аналоге. Библ. 8 назв.

Введение. При изучении эффективно топологических пространств (ЭТП) *) оказываются существенными как, во-первых, их свойства, являющиеся эффективизацией традиционных «классических» свойств обычных топологических пространств (счетности базы, сепарабельности, аксиом отделимости и т. п.), так, во-вторых, их свойства, «классические» аналоги которых не представляют специального интереса ввиду своей тривиальности или ввиду того, что они совпадают с другими, известными свойствами. К числу свойств ЭТП первого рода относятся свойства перечислимости базы, эффективной сепарабельности (ЭТП с этим свойством называются ЭС ЭТП), свойства «быть

*) Понятие ЭТП представляет собой один из вариантов конструктивного аналога понятия топологического пространства; этот вариант предполагает нумерацию самого пространства и его базы натуральными числами (н. ч.). Определение ЭТП см. в [3]; при изъятии из приведенного в [3] определения ЭТП условия 1) все результаты как работы [3], так и настоящей заметки остаются справедливыми. В дальнейшем терминология [3] и [5] используется без разъяснений; следует иметь в виду следующую опечатку в [3]: в определениях ЭТ_i при $i = 0, 1, 2$ вместо «элемент базы» следует читать «эффективно открытое (ЭО) множество».

эффективно T_i -пространством» и т. п. К числу свойств второго рода — такие, например, свойства:

А) «существует перечислимое множество E пар н. ч. такое, что если m — номер точки пространства, n — номер элемента базы, то пара $\langle m, n \rangle$ тогда и только тогда принадлежит E , когда точка с номером m принадлежит элементу базы с номером n »; ЭТП с таким свойством будем называть *вполне эффективно топологическим пространством* (ВЭТП);

В) «пересечение любых двух ЭО множеств есть ЭО множество, причем существует вычислимая функция (в. ф.), дающая по номерам двух ЭО множеств номер ЭО множества, являющегося их пересечением»; ЭТП со свойством В будем называть *ЭТП с вычислимым пересечением*;

С) «существует в. ф., дающая по номеру элемента \mathcal{U} базы номер (в некоторой главной нумерации) перечислимого множества $\{\langle m_0, n_0 \rangle, \langle m_1, n_1 \rangle, \dots\}$ пар н. ч. таких, что для всякого н. ч. i н. ч. m_i — номер ЭО множества \mathcal{W}_i , n_i — номер ЭЗ множества \mathcal{F}_i , причем выполняются условия $\mathcal{W}_i \subseteq \mathcal{F}_i \subseteq \mathcal{U}$ и $\bigcup_i \mathcal{W}_i = \mathcal{U}$ »; ЭТП с таким свойством будем называть *пространством с перечислимо регулярной базой*.

«Классический» аналог свойства А) бессодержателен. «Классический» аналог свойства В) состоит в открытости пересечения любых двух открытых множеств. «Классическим» аналогом свойства С) является следующее свойство «счетной регулярности базы»: «каждый элемент \mathcal{U} базы получается объединением взятых не более чем в счетном числе открытых множеств, замыкания которых содержатся в \mathcal{U} » (для T_0 -пространств со счетной базой свойство счетной регулярности базы эквивалентно свойству регулярности самого пространства).

Свойства А), В), С) служат показателями «хорошего устройства» ЭТП. Наличие этих свойств, как показано ниже в § 1 (теорема 4), играет решающую (и неустранимую) роль при установлении конструктивного аналога теоремы Урысона о метризации топологических пространств со счетной базой. В § 4 настоящей работы показывается (теорема 10) независимость этих свойств друг от друга и от других свойств ЭТП, фигурирующих в конструктивном аналоге теоремы Урысона. Для ЭТП со свойствами А) и В) (т. е. для ВЭТП с вычислимым пересечением) оказываются (по теореме 2 из [3]) эквивалентными свойства «быть ЭТ₄П» и «быть ЭТ_ФП» (в «классическом» случае понятия T_{4-} ,

т. е. нормальных, пространств и T_Φ -, т. е. таких T_1 -пространств, в которых любые два непересекающихся замкнутых множества функционально отделимы, совпадают); в § 3 настоящей заметки показывается (теоремы 7 и 8), что указанная эквивалентность перестает иметь место при лишении ЭТП любого из свойств А) или В). Наконец, наличие свойств В) и С) достаточно для того, чтобы эффективно регулярное ЭТП ($\text{ЭТ}_3\Pi$) было эффективно нормальным ($\text{ЭТ}_4\Pi$) (теорема 1 из [3]); в § 2 настоящей заметки (теоремы 5 и 6) показывается, что оба эти свойства существенны.

§ 1. Некоторые определения и результаты общего характера. Пусть \mathfrak{X}_1 и \mathfrak{X}_2 суть ЭТП,

$$\mathfrak{X}_1 = \langle \mathcal{X}_1, \alpha_1, \mathfrak{U}_1, \beta_1 \rangle, \quad \mathfrak{X}_2 = \langle \mathcal{X}_2, \alpha_2, \mathfrak{U}_2, \beta_2 \rangle.$$

Мы скажем, что \mathfrak{X}_1 и \mathfrak{X}_2 эффективно эквивалентны, если $\mathcal{X}_1 = \mathcal{X}_2$, $\alpha_1 = \alpha_2$ и: 1) каждый элемент \mathfrak{U}_1 есть ЭО в \mathfrak{X}_2 множество, причем существует в. ф., дающая по β_1 -номеру (11) произвольного элемента \mathfrak{U}_1 — его номер как ЭО в \mathfrak{X}_2 множества; 2) то же с переменной ролей \mathfrak{X}_1 и \mathfrak{X}_2 . ЭТП назовем *допускающим перечислимую базу*, если оно эффективно эквивалентно некоторому ЭТП с перечислимой базой. Свойство «допускать перечислимую базу» является инвариантом эффективного гомеоморфизма, как и другие основные свойства ЭТП. Более точно, имеет место

ТЕОРЕМА 1. Пусть \mathfrak{X}_1 и \mathfrak{X}_2 — эффективно гомеоморфные ЭТП. Тогда \mathfrak{X}_1 и \mathfrak{X}_2 одновременно принадлежат или не принадлежат каждому из следующих классов пространств: классу $V\text{ЭТП}$; ЭС ЭТП; ЭТП, допускающих перечислимую базу; ЭТП с вычислимым пересечением; ЭТП с перечислимо регулярной базой; для $i = 0, 1, 2, 3, 4$, ф классу $\text{ЭТ}_i\Pi$.

В то же время перечислимость базы не является инвариантом эффективного гомеоморфизма.

Поскольку каждое ЭТП можно рассматривать и как обычное топологическое пространство, оно может обладать и обычными топологическими свойствами, например быть T_i -пространством. Как указано в [3], ЭТП, являющееся T_i -пространством, может и не быть эффективно T_i -пространством ($\text{ЭТ}_i\Pi$). При некоторых условиях, однако, свойство T_i влечет ЭТ_i (и даже ЭТ_j при $j > i$). Именно, имеет место

ТЕОРЕМА 2. *Всякое ВЭТП с перечислимо регулярной базой, являющееся T_0 -пространством и допускающее перечислимую базу, есть ЭТ₃П.*

Теорема 2 является непосредственным следствием лемм 1—3 и теоремы 1.

ЛЕММА 1. *Если $\langle \mathcal{X}, \alpha, \mathfrak{U}, \beta \rangle$ — ВЭТП с перечислимой и перечислимо регулярной базой, являющееся T_0 -пространством, то существует в. ф. h такая, что для всякого н. ч. n из основания нумерации $\alpha h(n)$ есть номер (в нумерации ЭЗ множеств, см. [3]) одноточечного множества $\{\alpha(n)\}$.*

ЛЕММА 2. *Если ЭТП $\langle \mathcal{X}, \alpha, \mathfrak{U}, \beta \rangle$ таково, что для него существует в. ф. h , удовлетворяющая условию леммы 1, то $\langle \mathcal{X}, \alpha, \mathfrak{U}, \beta \rangle$ — ЭТ₁П.*

ЛЕММА 3 (см. [3]). *Всякое ВЭТ₀П*) с перечислимо регулярной базой является ЭТ₃П.*

Из теоремы 2 (настоящей заметки) и следствия 2 теоремы 2 статьи [3] вытекает

ТЕОРЕМА 3. *ВЭТП с перечислимо регулярной базой и вычислимым пересечением, допускающее перечислимую базу и являющееся T_0 -пространством, есть ЭТ_ФП.*

Мы получаем теперь возможность (благодаря теоремам 1 и 2) следующим образом усилить метризационную теорему 3 из [3].

ТЕОРЕМА 4. *ЭТП, допускающее перечислимую базу, тогда и только тогда эффективно метризуемо, когда оно является ЭС ВЭТП с вычислимым пересечением и перечислимо регулярной базой и T_0 -пространством.*

Для дальнейшего нам удобно фиксировать следующие обозначения:

1) N — натуральный ряд; N_1, N_2, N_3, N_4 — некоторые бесконечные попарно непересекающиеся разрешимые множества н. ч., f_1, f_2, f_3, f_4 — их прямые пересчеты; P — перечислимое, но неразрешимое множество; Q — его дополнение до N ; g — в. ф. типа $N \rightarrow N$, R и S — взаимно дополнительные неперечислимые множества такие, что $g(R) = S \& (\forall n \in N) (g(g(n)) = n)$; χ — 1-1-значная натуральная вычислимая нумерация множества всех непустых кортежей н. ч.; ω — некоторая главная нумерация совокупности всех перечислимых множеств н. ч.

2) \mathcal{R} — множество рациональных чисел, θ — 1-1-значная вычислимая натуральная нумерация \mathcal{R} ; ζ есть

*) Вместо слов «ВЭТП, являющееся ЭТ₃П, мы пишем «ВЭТ₃П».

1—1-значная вычислимая натуральная нумерация пар рациональных чисел; $\mathcal{R}_1 \stackrel{\text{def}}{=} \{r/r \in \mathcal{R} \& 0 < r < 1/2\}$.

3) \mathfrak{K} — конструктивный континуум, γ — некоторая канторова или эквивалентная ей нумерация \mathfrak{K} ; $\mathcal{S}(x, r)$ — окрестность в конструктивном континууме с центром в x из \mathfrak{K} и радиусом r из \mathcal{R} ; \mathfrak{S} — совокупность всех таких окрестностей, τ — нумерация этой совокупности, осуществленная, как указано в [3]; заметим, что $\langle \mathfrak{K}, \gamma, \mathfrak{S}, \tau \rangle$ есть (как и всякое ЭС ЭМП) ЭТП, допускающее перечислимую базу.

Через $[a]$ будем обозначать множество членов кортежа a ; через $\delta\alpha$ — основание нумерации α ; через $\tilde{\beta}$ и $\hat{\beta}$ — соответственно нумерации (описанные в [3]) совокупностей ЭО множеств и ЭЗ множеств ЭТП, в котором β служит нумерацией базы. В дальнейшем запись $\varphi(a_1, \dots, a_n)$ употребляется лишь для того случая, когда φ определено на $\langle a_1, \dots, a_n \rangle$, так что, скажем, запись « $\varphi(n) \notin M$ » означает « $\varphi(n)$ определено и $\varphi(n) \notin M$ ».

§ 2. Соотношение между эффективной регулярностью (ЭТ₃) и эффективной нормальностью (ЭТ₄). Как установлено в [3], всякое ЭТ₄ П является ЭТ₃ П, а всякое ЭТ₃ П с вычислимым пересечением и перечислимо регулярной базой является ЭТ₄ П.

ТЕОРЕМА 5. *Существует ЭТ₃ П с перечислимо регулярной базой, не являющееся ЭТ₄ П.*

Доказательство. Пусть K — непустое подмножество множества N_1 ; L, M неперечислимы, $L \subset N_2$, $M \subset N_3$; l_0 (соответственно m_0) — фиксированный элемент множества L (соответственно M). Зададим ЭТП \mathfrak{Z} . $\nu \stackrel{\text{def}}{=} \langle \mathcal{X}, \alpha, \mathfrak{U}, \beta \rangle$, где $\mathcal{X} \stackrel{\text{def}}{=} K \cup L \cup M$; $\alpha(x) \stackrel{\text{def}}{=} x$ для x из \mathcal{X} ; элементами нумерованной совокупности $([1]) \langle \mathfrak{U}, \beta \rangle$ являются для x из \mathcal{X} множества $\{x\}$ с номером $f_1(x)$ и $\mathcal{X} \setminus \{x\}$ с номером $f_2(x)$, а также множества $K \cup M \setminus \{m_0\}$, $K \cup L \setminus \{l_0\}$, $M \cup \{l_0\}$, $L \cup \{m_0\}$ с номерами $f_3(0), f_3(1), f_3(2), f_3(3)$ соответственно. Легко видеть, что \mathfrak{Z} есть ЭТ₃ П с перечислимо регулярной базой, не являющееся ЭТ₄ П. Теорема 5 доказана.

ТЕОРЕМА 6. *Существует ЭС ВЭТ₃ П с перечислимой базой и вычислимым пересечением, не являющееся ни ЭТП с перечислимо регулярной базой, ни ЭТ₄ П.*

Доказательство. Пусть $\mathcal{X} \stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{R} \setminus P$, α — сужение на $\theta^{-1}(\mathcal{X})$ нумерации θ . Для всякого x из $\mathcal{R} \setminus P$

множество $\{x\}$ с номером $f_1(\theta^{-1}(x))$ отнесем к совокупности $\langle \mathfrak{U}_1, \beta_1 \rangle$. Для всяких p из P , q из Q , r из \mathcal{R}_1 множества $\mathcal{S}(q, r) \cap \mathcal{X}$ с номером $f_2(\zeta^{-1}(q, r))$, и \mathcal{X} с номером $f_2(\zeta^{-1}(p, r))$ отнесем к совокупности $\langle \mathfrak{U}_2, \beta_2 \rangle$. Для всяких n из N , x из $\mathcal{R} \setminus N$, r из \mathcal{R}_1 множества $\mathcal{X} \setminus \mathcal{S}(n, r)$ с номером $f_3(\zeta^{-1}(n, r))$ и $\mathcal{X} \setminus \{x\}$ с номером $f_3(\zeta^{-1}(x, 0))$ отнесем к совокупности $\langle \mathfrak{U}_3, \beta_3 \rangle$. Для всякого k из $N \setminus \{0\}$ и кортеже $\langle m_0, \dots, m_k \rangle$ и $\langle n_0, \dots, n_k \rangle$ таких,

$$[\langle m_0, \dots, m_k \rangle] \subset \delta\beta_3 \& [\langle n_0, \dots, n_{k-1} \rangle] \subset \delta\beta_3 \& n_k \in \delta\beta_2 \& \& \beta_3(n_0) \cap \dots \cap \beta_3(n_{k-1}) \cap \beta_2(n_k) \neq \Lambda,$$

множества

$$\beta_3(m_0) \cap \dots \cap \beta_3(m_k)$$

с номером $f_4(\chi^{-1}(m_0, \dots, m_k))$ и

$$\beta_3(n_0) \cap \dots \cap \beta_3(n_{k-1}) \cap \beta_2(n_k)$$

с номером $f_4(\chi^{-1}(n_0, \dots, n_k))$ отнесем к совокупности $\langle \mathfrak{U}_4, \beta_4 \rangle$.

Положим

$$\mathfrak{U} \stackrel{\text{df}}{=} \mathfrak{U}_1 \cup \mathfrak{U}_2 \cup \mathfrak{U}_3 \cup \mathfrak{U}_4,$$

β — нумерация \mathfrak{U} , являющаяся продолжением нумераций $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ и такая, что $\delta\beta = \delta\beta_1 \cup \delta\beta_2 \cup \delta\beta_3 \cup \delta\beta_4$.

$$\mathfrak{Z} \stackrel{\text{df}}{=} \langle \mathcal{X}, \alpha, \mathfrak{U}, \beta \rangle.$$

Нетрудно видеть, что \mathfrak{Z} есть ЭС ВЭТ₃ П с вычислимым пересечением и перечислимой базой. Покажем, что \mathfrak{Z} не есть ЭТ₄ П. Для i из N

$$\mathcal{F}_i \stackrel{\text{df}}{=} \mathcal{X} \setminus \beta(f_3(\zeta^{-1}(i, 1/4))),$$

$$\mathcal{G}_i \stackrel{\text{df}}{=} \mathcal{X} \setminus \beta(f_2(\zeta^{-1}(i, 1/3))).$$

Если \mathfrak{Z} есть ЭТ₄ П, то существует в. ф. φ и ψ такие, что

$$(\forall i)(\tilde{\beta}(\varphi(i)) \cap \tilde{\beta}(\psi(i)) = \Lambda \& \mathcal{F}_i \subseteq \tilde{\beta}(\varphi(i)) \& \mathcal{G}_i \subseteq \tilde{\beta}(\psi(i))).$$

Положим для i из N

$$K_i \stackrel{\text{df}}{=} \{n \mid n \in N_2 \& \neg (\exists r \in \mathcal{R})(\zeta(f_2^{-1}(n))) = \langle i, r \rangle\};$$

$$L_i \stackrel{\text{df}}{=} \{n \mid n \in N_4 \& [\chi(f_4^{-1}(n))] \cap K_i \neq \Lambda\};$$

$$H_i \stackrel{\text{df}}{=} \omega(\varphi(i)) \setminus (N_1 \cup L_i \cup K_i); \quad J \stackrel{\text{df}}{=} \{i \mid (H_i \neq \Lambda)\}.$$

Очевидно, J пересчитимо и $Q \subset J$. Пусть D — множество β_2 -номеров множества \mathcal{L} . Положим

$$T \stackrel{\text{df}}{=} \{n \mid [\chi(f_4^{-1}(n))] \cap N_2 \subset D\}; \quad Z \stackrel{\text{df}}{=} D \cup N_3 \cup T.$$

Так как $(\forall_i \in J \setminus Q) (H_i \cap Z \neq \Lambda)$, легко показать, что

$$(\forall_i \in J) (i \in Q \leftrightarrow (\omega(\psi(i)) \cap Z \neq \Lambda)),$$

и тем самым прийти к противоречию с непересчитимостью Q . Итак, \mathfrak{S} не является ЭТ₄П и, как это следует из теоремы 1 работы [3], оно не есть ЭТП с пересчитимо регулярной базой.

§ 3. Соотношение между эффективной нормальностью (ЭТ₄) и аксиомой эффективной функциональной отделимости (ЭТ_Ф). В [3] было установлено, что всякое ЭТ_ФП есть ЭТ₄П, а всякое ВЭТ₄П с вычислимым пересечением есть ЭТ_ФП. Однако

ТЕОРЕМА 7. *Существует ВЭТ₄П, не являющееся ЭТ_ФП.*

ТЕОРЕМА 8. *Существует ЭТ₄П с вычислимым пересечением, не являющееся ЭТ_ФП.*

Доказательство теоремы 7. Положим

$$M \stackrel{\text{df}}{=} \{k \mid 0 < \gamma(k) < 1\};$$

для n из M

$$\mathcal{Y}_n \stackrel{\text{df}}{=} \{k \mid \gamma(k) < \gamma(n)\}, \quad \mathcal{Z}_n \stackrel{\text{df}}{=} \{k \mid \gamma(k) > \gamma(n)\}.$$

Зададим ЭТП \mathfrak{S} :

$$\mathfrak{S} \stackrel{\text{df}}{=} \langle \mathcal{L}, \alpha, \mathfrak{U}, \beta \rangle,$$

где $\mathcal{L} \stackrel{\text{df}}{=} \delta\gamma$; $\alpha(x) \stackrel{\text{df}}{=} x$ для x из \mathcal{L} ; κ совокупности $\langle \mathfrak{U}, \beta \rangle$ отнесены для всякого x из \mathcal{L} множества $\{x\}, \mathcal{L} \setminus \{x\}$, для

всякого m из M множества $\mathcal{Y}_m, \mathcal{Z}_m$ с номерами $f_1(x), f_2(x), f_3(m), f_4(m)$ соответственно. Легко видеть, что \mathfrak{E} ВЭТ₃П.

ЛЕММА. Пусть L — перечеислимое подмножество $\delta\beta$ такое, что $\mathcal{X} = \bigcup_{n \in L} \beta(n)$. Тогда: или 1) $L \cap N_2 \neq \Lambda$, или 2) существует пара $\langle k, m \rangle$, удовлетворяющая условию

$$[\langle f_3(k), f_4(m) \rangle] \subseteq L \& \mathcal{Y}_k \cap \mathcal{Y}_m \neq \Lambda.$$

Доказательство леммы. Положим

$$\mathcal{Y} \stackrel{\text{df}}{=} \bigcup_{k \in L \cap N_3} \beta(k), \quad \mathcal{Z} \stackrel{\text{df}}{=} \bigcup_{k \in L \cap N_1} \beta(k).$$

Предположим, что условие 2) места не имеет, тогда $\mathcal{Y} \cap \mathcal{Z} = \Lambda$. Так как $\mathcal{Y} \cap \gamma^{-1}(1) = \Lambda$, $\mathcal{Z} \cap \gamma^{-1}(0) = \Lambda$ и не существует нетривиальных вполне разрешимых [4] подмножеств множества \mathfrak{R} (как это следует из [2], см. также [7]), найдется x_0 из \mathfrak{R} такое, что $\gamma^{-1}(x_0) \cap (\mathcal{Y} \cup \mathcal{Z}) = \Lambda$. Если теперь не выполнено и условие 1), то $\gamma^{-1}(x_0) \subset \bigcup_{n \in L \cap N_1} \beta(n)$,

что невозможно, поскольку, как нетрудно показать, никакое перечеислимое множество γ -номеров элементов конструктивного континуума не может содержать всех γ -номеров некоторого элемента. Лемма доказана.

Покажем теперь, что \mathfrak{E} есть ЭТ₄П. Пусть l, t суть $\hat{\beta}$ -номера двух непересекающихся ЭЗ множеств \mathcal{F} и \mathcal{G} . Тогда $\mathcal{X} = \bigcup_{n \in \omega(l) \cup \omega(t)} \beta(n)$. По лемме: или 1) $(\exists n) (f_2(n) \in \omega(l) \cup \omega(t))$, или 2) существует пара $\langle k, m \rangle$, удовлетворяющая условию

$$[\langle f_3(k), f_4(m) \rangle] \subset \omega(l) \cup \omega(t) \& \mathcal{Y}_k \cap \mathcal{Y}_m \neq \Lambda.$$

Пусть имеет место 1) и $f_2(n) \in \omega(l)$. Тогда, если $n \in \tilde{\beta}(l)$ (соответственно $n \in \tilde{\beta}(t)$), ЭО множества Λ и \mathcal{X} (соответственно $\{n\}$ и $\mathcal{X} \setminus \{n\}$) отделяют \mathcal{F} и \mathcal{G} . Пусть 2) имеет место и $f_3(k) \in \omega(l)$. Тогда множества \mathcal{F} и \mathcal{G} отделяются ЭО множествами Λ и \mathcal{X} (соответственно $\mathcal{Y}_h(k, m), \mathcal{Z}_h(k, m)$), если $f_4(m) \in \omega(l)$ (соответственно $f_4(m) \in \omega(t)$). Здесь h есть в. ф. такая, что

$$(\forall m \in \delta\gamma) \left(h(k, m) \in \gamma^{-1} \left(\frac{\gamma(m) + \gamma(k)}{2} \right) \right).$$

Однако \mathfrak{E} не ЭТ_фП. Пусть n, l из M таковы, что $\gamma(l) > \gamma(n)$:

$$\mathcal{F}_0 \stackrel{\text{df}}{=} \mathcal{X} \setminus \mathcal{Y}_n, \quad \mathcal{G}_0 \stackrel{\text{df}}{=} \mathcal{X} \setminus \mathcal{Y}_l.$$

Если \mathfrak{Z} есть $\mathfrak{E}\mathfrak{T}_\Phi\Pi$, существует эффективно непрерывная на \mathfrak{Z} функция ψ со значениями из отрезка $[0, 1]$ конструктивного континуума, удовлетворяющая условиям $\mathcal{F}_0 \subseteq \psi^{-1}(0)$, $\mathcal{G}_0 \subseteq \psi^{-1}(1)$. Пусть D, E, H — перечислимые множества н. ч. такие, что

$$\begin{aligned} \bigcup_{n \in D} \beta(n) &= \psi^{-1}(\{y \in \mathfrak{R} \mid 0 < y < 1\}), \\ \bigcup_{n \in E} \beta(n) &= \psi^{-1}(\{y \in \mathfrak{R} \mid y > 1/2\}), \\ \bigcup_{n \in H} \beta(n) &= \psi^{-1}(\{y \in \mathfrak{R} \mid y < 1/2\}). \end{aligned}$$

Представление $\mathcal{X} = \bigcup_{n \in D \cup E \cup H} \beta(n)$ противоречит лемме; таким образом, \mathfrak{Z} не $\mathfrak{E}\mathfrak{T}_\Phi\Pi$. Теорема 7 доказана.

Доказательство теоремы 8. Пусть $a \in N \setminus \delta\tau$, $\langle \mathfrak{U}, \beta \rangle$ — нумерованная совокупность, получающаяся добавлением к совокупности $\langle \mathfrak{S}, \tau \rangle$ множества $\{0\}$ с номером a . Положим

$$\mathfrak{Z} \stackrel{\text{df}}{=} \langle \mathfrak{R}, \gamma, \mathfrak{U}, \beta \rangle.$$

Нетрудно показать, что \mathfrak{Z} есть $\mathfrak{E}\mathfrak{T}_4\Pi$ с вычислимым пересечением. Предположим теперь, что \mathfrak{Z} есть $\mathfrak{E}\mathfrak{T}_\Phi\Pi$. Тогда существует эффективно непрерывная на \mathfrak{Z} функция ψ со значениями из отрезка $[0, 1]$ конструктивного континуума, равная 0 на $\mathfrak{E}\mathfrak{Z}$ множестве $\{0\}$ и 1 на $\mathfrak{E}\mathfrak{Z}$ множестве $\mathfrak{R} \setminus \{0\}$, и множество $\{0\}$ оказывается вполне перечислимым [4] в $\langle \mathfrak{R}, \gamma \rangle$, как полный прообраз вполне перечислимого в $\langle \mathfrak{R}, \gamma \rangle$ множества $\{x \mid x \in \mathfrak{R} \text{ и } (-1/2 < x < 1/2)\}$ при вычислимом отображении $\psi \langle \mathfrak{R}, \gamma \rangle$ в $\langle \mathfrak{R}, \gamma \rangle$, что невозможно (как это следует из [2], см. также [7]). Следовательно, \mathfrak{Z} не $\mathfrak{E}\mathfrak{T}_\Phi\Pi$.

З а м е ч а н и е. Легко заметить, что построенное при доказательстве теоремы 8 $\mathfrak{E}\mathfrak{T}\Pi$ \mathfrak{Z} будет $\mathfrak{E}\mathfrak{S}$ $\mathfrak{E}\mathfrak{T}_4\Pi$ с перечислимой и перечислимо регулярной базой и вычислимым пересечением, не являющееся $\mathfrak{V}\mathfrak{E}\mathfrak{T}\Pi$.

§ 4. Независимость условий, фигурирующих в конструктивном аналоге метризацииной теоремы П. С. Урысона. Некоторым конструктивным аналогом теоремы Урысона (о других ее аналогах см. в [3]) является теорема 4. Предположение о том, что пространство допускает перечислимую базу, является здесь существенным. Дей-

ствительно, среди эффективно метрических пространств, не допускающих перечислимой базы, существуют «очень плохие» пространства — например, не обладающие вычислимым пересечением ([3]). С другой стороны, имеет место

ТЕОРЕМА 9. *Существует ЭС ВЭТП с вычислимым пересечением и перечислимо регулярной базой, являющееся T_0 -пространством, но не эффективно метризуемое.*

Доказательство. Пусть \mathcal{X} — счетное множество, α — нумерация множества \mathcal{X} , такая, что каждый элемент из \mathcal{X} имеет ровно два α -номера и $(\forall n \in N) (\alpha(n) = \alpha(g(n)))$. К совокупности $\langle \mathfrak{U}, \beta \rangle$ отнесем для всякого s из S множество $\{\alpha(s)\}$ с номером $f_1(s)$ и для всякого непустого кортежа $\langle s_0, \dots, s_k \rangle$ такого, что $[\langle s_0, \dots, s_k \rangle] \subset S$, множество $\mathcal{X} \setminus \bigcup_{i=0}^k \alpha(s_i)$ с номером $f_2(\chi(s_0, \dots, s_k))$.

$\mathfrak{Z} \stackrel{\text{df}}{=} \langle \mathcal{X}, \alpha, \mathfrak{U}, \beta \rangle$. Легко показать, что \mathfrak{Z} есть ЭС ВЭТП с вычислимым пересечением и перечислимо регулярной базой. \mathfrak{Z} — пространство с дискретной топологией, однако оно не ЭТ₀П и, следовательно, не является эффективно метризуемым. Теорема доказана.

Встает вопрос о независимости тех условий, которые, согласно теореме 4, в совокупности необходимы и достаточны для эффективной метризуемости ЭТП, допускающих перечислимую базу. Следующая теорема показывает, что они независимы.

ТЕОРЕМА 10. *Для каждого из следующих классов пространств: класса ЭС ЭТП; ЭТП, являющихся T_0 -пространством; класса ЭТП с вычислимым пересечением; ЭТП с перечислимой регулярной базой; класса ВЭТП — существует ЭТП с перечислимой базой, не принадлежащее этому классу, но содержащееся в пересечении остальных классов.*

Теорема 10 следует из примеров 1, 2, 3, теоремы 6 и замечания к теореме 8.

Пример 1. Пусть F и G — два взаимно дополнительных множества $\langle [8] \rangle$,

$$\mathcal{X} \stackrel{\text{df}}{=} \{\theta(i) \mid i \in F\},$$

α — сужение нумерации θ на множество $\theta^{-1}(\mathcal{X})$. Для всяких н. ч. i и положительного рационального r множество $\mathcal{S}(\theta(i), r) \cap \mathcal{X}$ с ξ — номером пары $\langle i, r \rangle$ отнесем к совокупности $\langle \mathfrak{U}, \beta \rangle$. Легко видеть, что $\langle \mathcal{X}, \alpha, \mathfrak{U}, \beta \rangle$ есть ВЭТ₃П с перечислимо регулярной перечислимой базой и

вычислимым пересечением, не являющееся ЭС пространством.

Пример 2. Пусть совокупность $\langle \mathcal{X}, \alpha \rangle$ состоит из двух точек, занумерованных 0 и 1; к совокупности $\langle \mathfrak{U}, \beta \rangle$ отнесено множество $\{\alpha(0), \alpha(1)\}$ с номером 0. Тогда $\langle \mathcal{X}, \alpha, \mathfrak{U}, \beta \rangle$ — ЭС ВЭТП с перечислимой перечислимо регулярной базой и вычислимым пересечением, не являющееся T_0 -пространством.

Пример 3. Пусть $H \stackrel{\text{def}}{=} f_1(Q)$; $E \stackrel{\text{def}}{=} f_2(P)$; h — в. ф. типа $N \rightarrow N$, $h(N_1) = N_2$, $(\forall n \in N) (h(h(n)) = n)$; $T \stackrel{\text{def}}{=} H \cup E \cup N_3$; $\mathcal{X} \stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{R} \setminus (N \setminus T)$; α — сужение на $\theta^{-1}(\mathcal{X})$ нумерации θ . К нумерованной совокупности $\langle \mathfrak{U}, \beta \rangle$ отнесем для всякого x из $\mathcal{X} \setminus H$ множество $\{x\}$ с номером $f_1(\theta^{-1}(x))$; для всякого x из $\mathcal{X} \setminus N$ множество $\mathcal{X} \setminus \{x\}$ с номером $f_2(\theta^{-1}(x))$, множества $\mathcal{X} \setminus N_3$ и $\mathcal{X} \setminus E$ с номерами $f_3(0)$, $f_3(1)$ соответственно; для n из $N_1 \cup N_2$ и r из \mathcal{R}_1 множество $\mathcal{X} \cap (\mathcal{S}(n, r) \cup \mathcal{S}(h(n), r))$ с номерами $f_4(\zeta^{-1}(n, r))$ и $f_4(\zeta^{-1}(h(n), r))$. Положим $\mathfrak{X} \stackrel{\text{def}}{=} \langle \mathcal{X}, \alpha, \mathfrak{U}, \beta \rangle$. Нетрудно, показать, что \mathfrak{X} есть ЭС ВЭТ₃П с перечислимой перечислимо регулярной базой, не являющееся ЭТП с вычислимым пересечением.

§ 5. Соотношение между эффективной регулярностью (ЭТ₃) и наличием перечислимо регулярной базы. Хотя «классические» аналоги этих свойств эквивалентны для T_0 -пространств со счетной базой, сами эти свойства не являются эквивалентными для ЭТП с перечислимой базой. Действительно, по теореме 3 возможно ЭТ₃П с перечислимой, но не перечислимо регулярной базой. Кроме того, имеет место

ТЕОРЕМА 11. *Существует ЭТ₀П (и даже ЭТ₂П) с перечислимой перечислимо регулярной базой, не являющиеся ЭТ₃П.*

В то же время, как показывает лемма 3, всякое ВЭТ₀П с перечислимой регулярной базой является ЭТ₃П.

Доказательство теоремы 11. Пусть λ есть 1-1-значная натуральная вычислимая нумерация множества $\mathcal{R} \setminus N$. Положим

$$R_1 \stackrel{\text{def}}{=} f_1(R), S_1 \stackrel{\text{def}}{=} f_1(S), g_1(n) \stackrel{\text{def}}{=} f_1(g(n))$$

для n из N ;

$$\mathcal{X} \stackrel{\text{def}}{=} R_1 \cup (\mathcal{R} \setminus N).$$

Число l из R_1 назовем α -номером элемента l ; число $f_2(n)$ такое, что $\gamma(n) \in \mathcal{R} \setminus N$ назовем α -номером элемента $\gamma(n)$. К нумерованной совокупности $\langle \mathfrak{U}, \beta \rangle$ отнесем для всякого x из \mathcal{X} множество $\{x\}$ с номером x , если $x \in R_1$, с номером $f_2(\lambda^{-1}(x))$, если $x \in \mathcal{R} \setminus N$, и множества $\mathcal{X} \setminus \{x\}$ с номером $g_1(x)$, если $x \in R_1$ с номером $f_3(\lambda^{-1}(x))$, если $x \in \mathcal{R} \setminus N$, а также всевозможные непустые подмножества \mathcal{W} множества $\mathcal{R} \setminus N$ такие, что $\lambda^{-1}(\mathcal{W})$ перечислимо, с номерами вида $f_4(m)$, где m есть ω -номер $\lambda^{-1}(\mathcal{W})$,

$$\mathfrak{Z} \stackrel{\text{df}}{=} \langle \mathcal{X}, \alpha, \mathfrak{U}, \beta \rangle.$$

Нетрудно, показать, что \mathfrak{Z} есть $\mathcal{E}T_2\Pi$ с перечислимо регулярной базой и, поскольку множество ω -номеров непустых множеств перечислимо, перечислима и база \mathfrak{Z} . Предположим теперь, что \mathfrak{Z} есть $\mathcal{E}T_3\Pi$. Тогда, так как $\mathcal{R} \setminus N$ есть $\mathcal{E}O$ в \mathfrak{Z} множество, существует в. ф. u такая, что

$$n \in \gamma^{-1}(\mathcal{R} \setminus N) \rightarrow R_1 \subset \tilde{\beta}(u(n)) \& \gamma(n) \notin \tilde{\beta}(u(n)).$$

Очевидно,

$$n \in \gamma^{-1}(\mathcal{R} \setminus N) \rightarrow \omega(u(n)) \cap N_3 \neq \Lambda.$$

Отсюда следует, что должна существовать в. ф., дающая по γ -номеру элемента из $\mathcal{R} \setminus N$ его λ -номер, что невозможно (как это следует, например, из результатов [6], [7]). Теорема доказана.

Автор глубоко признателен В. А. Успенскому за предложение темы исследования и большое внимание к работе.

Вычислительный центр
АН СССР

Поступило
5.V.1968

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- [1] Мальцев А. И., Алгоритмы и рекурсивные функции, М., 1965.
- [2] Марков А. А., О непрерывности конструктивных функций, Успехи матем. наук, 9, № 3 (1954), 226—230.
- [3] Ногина Е. Ю., Об эффективно топологических пространствах, Докл. АН СССР, 169, № 1 (1966), 28—31.

- [4] Успенский В. А., Системы перечислимых множеств и их нумерации, Докл. АН СССР, 105, № 6 (1955), 1155—1158.
- [5] Успенский В. А., Лекции о вычислимых функциях, М., 1960.
- [6] Цейтин Г. С., Алгоритмические операторы в конструктивных полных сепарабельных метрических пространствах, Докл. АН СССР, 12, № 1 (1959), 49—52.
- [7] Moschovakis Y. N., Recursive metric spaces. Fund. Math., 55, № 3 (1964), 215—238.
- [8] Rogers H., Theory of recursive functions and effective computability, N.—Y., 1967.