



Math-Net.Ru

Общероссийский математический портал

А. А. Петюшко, Д. Н. Бабин, Классификация Хомского для матриц биграммных языков,
Интеллектуальные системы. Теория и приложения, 2016, том 20, выпуск 2, 331–336

<https://www.mathnet.ru/ista134>

Использование Общероссийского математического портала Math-Net.Ru подразумевает, что вы прочитали и согласны с пользовательским соглашением
<https://www.mathnet.ru/rus/agreement>

Параметры загрузки:

IP: 18.97.14.86

13 мая 2025 г., 17:07:31



Классификация Хомского для матриц биграммных языков.

А. А. Петюшко, ДН. Бабин

Множество слов, у которых частоты встречаемости пар соседних букв образуют одну и ту же матрицу - это формальный (биграммный) язык. В статье описывается матрица, соответствующие регулярным и контекстно-свободным биграммным языкам.

Матрицы традиционно являются инструментом решения прикладных задач. Ещё в начале 20 века выдающимся русским учёным А. А. Марковым [1] был создан аппарат цепей, впоследствии названных цепями Маркова. В дальнейшем этот аппарат получил широкое применение для распознавания и статистического моделирования естественных языков, погоды и других явлений [2]. При таком подходе целью является сама матрица, по которой можно будет предсказывать дальнейшее поведение изучаемого объекта.

В данной статье изучается обратная задача: рассматривается формальный язык с фиксированной матрицей биграмм. В классификации Хомского [3] принадлежность слова языку определяется либо с помощью автомата (регулярные языки), либо с помощью автомата с магазинной памятью (контекстно-свободные языки), либо с помощью машины Тьюринга [4]. Нашей целью является установление соответствия между матричным описанием языка и описанием Хомского.

Пусть A ($|A| < \infty$) - конечный алфавит. *Биграммой* в алфавите A называется двухбуквенное слово $ab \in A^*$, $a, b \in A$ ($ab \neq ba$ при $a \neq b$). Обозначим через $\theta_\beta(\alpha)$, где $\beta \in A^*$, $\alpha \in A^*$, количество подслов β в слове α , т.е. количество различных разложений слова α в виде $\alpha = \alpha'\beta\alpha''$ (α' и α'' могут быть пустыми).

По слову $\alpha \in A^*$ можно построить квадратную матрицу биграмм $\Theta(\alpha)$ размера $|A| \times |A|$ такую, что на месте (i, j) матрицы будет стоять значение $\theta_{a_i a_j}(\alpha)$. Обозначим через Ξ множество квадратных матриц размера $|A| \times |A|$, каждый элемент которых является неотрицательным целым числом.

Назовём *языком* $L(\Theta)$, порожденным матрицей $\Theta \in \Xi$, множество всех слов, имеющих одну и ту же матрицу биграмм Θ ,

$$L(\Theta) = \{\beta \in A^* | \Theta(\beta) = \Theta\}.$$

Построим по матрице Θ ориентированный граф G_Θ , вершинами которого будут все буквы из алфавита A , при этом ребра будут соответствовать биграммам с учётом их кратностей, т.е. кратность θ_{ab} будет порождать θ_{ab} ориентированных рёбер $a \rightarrow b$. Аналогично, кратность θ_{cc} будет порождать θ_{cc} петель $c \rightarrow c$.

Ориентированный граф назовём *эйлеровым*, если выполняются следующие условия:

1) Неизолированные вершины составляют одну компоненту связности соответствующего неориентированного графа;

2) У всех вершин количество входящих рёбер равно количеству исходящих рёбер.

Назовём ориентированный граф *почти эйлеровым*, если выполняется условие 1), и у всех вершин, кроме двух, количество входящих рёбер равно количеству исходящих рёбер, а у оставшихся двух вершин разность количества входящих рёбер и количества исходящих рёбер равна $+1$ и -1 , соответственно.

Известно [5], что в эйлеровом графе существует эйлеров цикл, а в почти эйлеровом - эйлеров путь, не являющийся эйлеровым циклом (то есть начальная вершина пути не совпадает с конечной).

Имеет место следующий критерий непустоты:

Теорема 1. [6] *Для того, чтобы язык $L(\Theta)$ был непуст, достаточно, чтобы построенный по Θ ориентированный граф G_Θ был либо эйлеровым, либо почти эйлеровым.*

Следствие 1. *Проблема пустоты языка $L(\Theta)$ алгоритмически разрешима.*

Более интересен случай, когда матрица биграмм рассматривается как матрица пропорций биграмм, то есть языка, в котором сохраняются отношения $\theta_{ab}(\alpha)/\theta_{cd}(\alpha) \forall a, b, c, d \in A, \theta_{cd}(\alpha) > 0$ для любого слова α из этого языка.

Назовём *биграммным языком*, заданным матрицей $\Theta \in \Xi$, назовём

$$F_\Theta = \bigcup_{k=1}^{\infty} L(k\Theta),$$

Имеет место теорема о числе слов в частотных языках:

Теорема 2. [6] *Пусть задан набор биграмм $\Theta \in \Xi$. Тогда*

1) *Если ориентированный граф G_Θ является эйлеровым, то в частотном языке F_Θ счетное число слов;*

2) Если ориентированный граф G_Θ является почти эйлеровым, то частотный язык F_Θ совпадает с $L(\Theta)$ (и, соответственно, в нем конечное число слов);

3) Если ориентированный граф G_Θ не является ни эйлеровым, ни почти эйлеровым, то в частотном языке F_Θ нет ни одного слова.

Имеет место

Следствие 2. *Задача определения по набору значений $\Theta \in \Xi$, пуст, конечен или счетен частотный язык F_Θ , алгоритмически разрешима.*

Назовём две ненулевые матрицы Θ_1 и Θ_2 из Ξ кратными, если существует действительный коэффициент $c \in R, c \neq 0$, такой что верно $\Theta_1 = c\Theta_2$. В противном случае ненулевые матрицы назовём некратными.

Теорема 3. [6] *Пусть $A, |A| < \infty$ - некоторый конечный алфавит, а матрица биграмм Θ такова, что ориентированный граф G_Θ является эйлеровым. Тогда:*

1) *Если существует такое разложение $\Theta = \Theta_1 + \Theta_2$ в сумму двух ненулевых некратных матриц, причём обе матрицы Θ_1 и Θ_2 задают ориентированные графы G_{Θ_1} и G_{Θ_2} , которые являются эйлеровыми, то язык F_Θ нерегулярен;*

2) *В противном случае язык F_Θ регулярен.*

Обозначим через $\Xi_k \subset \Xi$ множество матриц размера $|A| \times |A|$, каждый элемент которых не превосходит $k > 0$. Через N_f^k - количество тех из них, которые задают конечные (непустые) языки F_Θ , через N_i^k - количество матриц, задающих счётные языки F_Θ , через N_{reg}^k - количество матриц, задающих счётные регулярные языки F_Θ , через N_{nreg}^k - количество матриц, задающих счётные нерегулярные языки F_Θ . Через N^k обозначим общее количество матриц биграмм $\Theta \in \Xi_k$. Очевидно, что $N^k = (k + 1)^{n^2}$.

Теорема 4. [7] *Выполнены следующие соотношения:*

1) *Для всех $k > k_0$ выполнено $\frac{1}{n(n-1)} < \frac{N_i^k}{N_f^k} < 1$;*

2) $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{N_i^k}{N^k} = 0$;

3) $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{N_{reg}^k}{N_{nreg}^k} = 0$.

Обозначим через N_q^k количество матриц биграмм $\Theta \in \Xi_k$, задающих непустые языки F_Θ . Имеет место следствие:

Следствие 3. $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{N_q^k}{N^k} = 0$.

Имеет место критерий контекстно-свободности биграммного языка:

Теорема 5. [8] *Пусть матрица кратностей биграмм $\Theta \in \Xi$, задающая эйлеров граф, разлагается в сумму не менее двух линейно незави-*

симых матриц, также задающих эйлеровы графы. Тогда:

1) Если Θ разлагается **единственным образом** в сумму двух линейно независимых матриц $\Theta = \Theta_1 + \Theta_2$, соответствующих **простым** эйлеровым циклам, и не разлагается в сумму большего количества линейно независимых матриц, соответствующих эйлеровым циклам, то язык F_Θ контекстно-свободный;

2) Иначе язык F_Θ не контекстно-свободный.

Литература.

1. А. А. Марков. Пример статистического исследования над текстом «Евгения Онегина» иллюстрирующий связь испытаний в цепь. // Известия Императорской Академии наук, серия VI. ч 1913. ч Т. 10. ч № 3. ч С. 153ч162.

2. U. Essen and V. Steinbiss. Cooccurrence smoothing for stochastic language modeling. // Acoustics, Speech, and Signal Processing, International Conference on. ч IEEE, 1992. ч Vol. 1. ч P. 161ч164.

3. N. Chomsky. Three models for the description of language. // Information Theory, IRE Transactions on. ч 1956. ч Vol. 2. ч № 3. ч P. 113ч124.

4. В. Б. Кудрявцев, С. В. Алешин, А. С. Подколзин. Введение в теорию автоматов. ч М.: Наука, 1985.

5. О. Оре. ч М.: Наука, 1980.

6. А. А. Петюшко. О биграммных языках. // Дискретная математика. ч 2013. ч Т. 25. ч № 3. ч С. 64ч77.

7. А. А. Петюшко. О мощности биграммных языков. // Дискретная математика. ч 2014. ч Т. 26. ч № 2. ч С. 71ч82.

8. А. А. Петюшко. О контекстно-свободных биграммных языках. // Интеллектуальные системы. Теория и приложения. ч 2015. ч Т. 19. ч № 2. ч С. 187ч208.