



M. M. Arslanov, The lattice of the degrees below  $0'$ , *Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat.*, 1988, Number 7, 27–33

Use of the all-Russian mathematical portal Math-Net.Ru implies that you have read and agreed to these terms of use

<http://www.mathnet.ru/eng/agreement>

Download details:

IP: 18.97.9.175

February 15, 2025, 22:24:33



Поскольку, имея ответы на все вопросы „ $f_i \in U(R_j)$ ?“, можно распознать, полна ли система, используя не более  $O(m)$  операций, где  $m$  — число функций, и  $m = O(N)$ , то теорема доказана.

В заключение отметим, что теорема 1 о ступенчатых билинейных алгоритмах допускает обобщение на так называемые приближенные алгоритмы [5].

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеев В. Б., Емельянов Н. Р. Метод построения быстрых алгоритмов в  $k$ -значной логике // Матем. заметки.— 1985.— Т. 38.— № 1.— С. 148—156.
2. Schönhage A., Strassen V. Schnelle Multiplikation grosser Zahlen // Computing.— 1971.— V. 7.— № 3—4.— P. 281—292.
3. Rosenberg I. La structure des fonctions de plusieurs variables sur un ensemble fini // C. R. Acad. Sci.— Paris, 1965.— V. 260.— S. 3817—3819.
4. Емельянов Н. Р. Об одном подходе к построению эффективных алгоритмов распознавания полноты в многозначных логиках // Матем. заметки.— 1986.— Т. 39.— № 5.— С. 766—775.
5. Schönhage A. Partial and total matrix multiplication // SIAM J. Comput.— 1981.— V. 10.— № 3.— P. 434—455.

г. Москва

Поступила  
16.02.1988

М. М. Арсланов

УДК 510.5

### О СТРУКТУРЕ СТЕПЕНЕЙ НИЖЕ $0'$

Множество  $A \subseteq \omega$ ,  $\omega = \{0, 1, \dots\}$ , называется  $n$ -рекурсивно перечислимым ( $n$ -р. п.), если  $A = \lim_s A_s$  для некоторой рекурсивной последовательности общерекурсивных функций  $\{A_s\}_{s \in \omega}$  такой, что для всех  $x$   $A_0(x) = 0$  и  $|\{s : A_s(x) \neq A_{s+1}(x)\}| \leq n$ . Множество  $A$  называется  $\omega$ -р. п., если для некоторой общерекурсивной функции  $f$  и для всех  $x$   $|\{s : A_s(x) \neq A_{s+1}(x)\}| \leq f(x)$  (множество  $A$   $f$ -р. п.). Ясно, что единственным  $0$ -р. п. множеством является пустое множество  $\emptyset$ ,  $1$ -р. п. множества — это обычные р. п. множества, а  $2$ -р. п. множествами являются разности р. п. множеств ( $d$ -р. п. множества).

Для  $1 \leq \alpha \leq \omega$  тьюринговая степень называется  $\alpha$ -р. п., если она содержит какое-нибудь  $\alpha$ -р. п. множество; она называется собственно  $\alpha$ -р. п. степенью, если является  $\alpha$ -р. п., но не  $\beta$ -р. п. степенью ни для какого  $\beta < \alpha$ . В [1] мы доказали, что если  $f, g$  — общерекурсивные функции,  $\text{rang}(g)$  бесконечен, то  $A$   $f$ -р. п.  $\Rightarrow A$   $g$ -р. п.

С. Б. Купер [2] установил, что собственно  $d$ -р. п. степени существуют. Этот результат легко обобщается на случай  $n$ -р. п. степеней для произвольного  $n > 2$ . А. Лахлан доказал, что для любой  $d$ -р. п. степени  $a > 0$  найдется такая р. п. степень  $b$ , что  $0 < b \leq a$ . Результат Лахлана также легко обобщается: для произвольных  $m, n, 1 \leq m < n$ , для любой  $n$ -р. п. степени  $a > 0$  существует  $m$ -р. п. степень  $b$  такая, что  $0 < b \leq a$ . Комбинируя этот результат с методом разрешения (описание метода см. в доказательстве теоремы 1), Л. Хей и М. Лерман доказали (см. [3]), что для любых  $m, n > 0$ , для любой  $n$ -р. п. степени  $a > 0$  существует  $m$ -р. п. степень  $b$  такая, что  $0 < b < a$ .

В [4] мы установили, что для произвольного  $n > 1$  существуют такие  $n$ -р. п. степени  $a$  и  $b$ , что  $a < b$  и ни для какой  $(n-1)$ -р. п. степени  $c$  справедливо  $a < c < b$ .

Если  $a \leq b$  и  $b$  р. п. относительно  $a$ , тогда  $b$  называется  $a$ -REA-степенью [5];  $b$  называется  $n$ -REA-степенью, если  $n = 1$  и  $b$  р. п., либо  $n > 1$  и для некоторой  $(n-1)$ -REA-степени  $a \leq b$   $b$  р. п. относительно  $a$ . Лахлан доказал, что каждая  $n$ -р. п. степень для  $n \geq 1$  является и  $n$ -REA-степенью. В [4] мы установили, что для степеней, расположенных ниже  $0'$ , обратное утверждение неверно: для произвольного  $n \geq 2$  существует  $n$ -REA-степень  $a$ , которая не является  $n$ -р. п.-степенью. Позднее такое утверждение появилось также в работе К. Джокуша и Р. Шора [5].

Дальнейшие результаты о  $d$ -р. п. степенях приведены в нашей заметке [6]. В частности, установлено следующее.

1. Для любой степени  $a < 0'$ , если  $a$  р. п., то существует собственно  $d$ -р. п. степень  $b$  такая, что  $a < b < 0'$ .

2. Для каждой  $d$ -р. п. степени  $d > 0$  существует  $d$ -р. п. степень  $b < 0'$  такая, что  $d \cup b = 0'$ . Известно (С. Е. М. Ейтс и С. Б. Купер [7]), что это утверждение ложно для р. п. степеней. Поэтому верхние полурешетки р. п. и  $d$ -р. п. степеней не элементарно эквивалентны. Вопрос об элементарной эквивалентности этих полурешеток был поставлен в [3].

Ниже мы приводим подробные доказательства этих двух утверждений. Условимся об обозначениях. Стандартные нумерации р. п. множеств, одноместных частично-рекурсивных функций и частично-рекурсивных с оракулом  $A$  функций обозначаются соответственно через  $\{W_x\}$ ,  $\{\varphi_x\}$  и  $\{\varphi_x^A\}$ . Характеристическая функция множества  $A$  обозначается той же буквой:  $A(x) = 1$ , если  $x \in A$ , и  $A(x) = 0$ , если  $x \notin A$ . Тьюринговую сводимость множества  $A$  к множеству  $B$  обозначим через  $A \leq_T B$ . Если  $A \leq_T B$  и  $B \leq_T A$ , то  $A \equiv_T B$ . Для множеств  $A$  и  $B$   $A \oplus B = \{2x : x \in A\} \cup \{2x + 1 : x \in B\}$ . Множество  $A \cap \{0, 1, \dots, x\}$  обозначаем через  $A[x]$ ;  $|A|$  — мощность множества  $A$ . По определению  $A' = \{x : \varphi_x^A(x) \downarrow\}$ , где для функции  $f$  запись  $f(x) \downarrow$  означает, что  $x \in \text{dom}(f)$ . В противном случае пишем  $f(x) \uparrow$ . Через  $W_{e,s}$  обозначим подмножество  $W_e$ , полученное после  $s$  шагов перечисления  $W_e$ . Аналогично,  $\varphi_{e,s}(x)$  означает  $\varphi_e(x)$ , если вычисление значения  $\varphi_e(x)$  завершается за  $s$  шагов, в противном случае  $\varphi_{e,s}(x) \uparrow$ . Как обычно, для функции  $\varphi_e^A(x)$   $\text{use}(A, e, x)$  означает такое наименьшее число  $t$ , что при вычислении  $\varphi_e^A(x)$  вопросы оракулу  $A$  задаются из интервала  $\{0, \dots, t\}$ ;  $\text{use}(A, e, x, s)$  определена и равна  $\text{use}(A, e, x)$ , если  $\varphi_e^A(x)$  вычисляется за  $s$  шагов, в противном случае  $\text{use}(A, e, x, s)$  не определена. Наконец, для  $x > 0$   $(x)_0$  означает показатель степени числа 2 в разложении  $x$  на простые множители.

**Теорема 1.** Пусть  $A$  — нерекурсивное р. п. множество. Существуют такие р. п. множества  $B$  и  $C$ , что: 1)  $B - C <_T 0'$ ; 2)  $\emptyset' \leq_T A \oplus (B - C)$ .

**Доказательство.** Для выполнения условия 1) построим р. п. множества  $B$  и  $C$  так, чтобы  $A \leq_T^{ne} B - C$ . Последнему условию удовлетворяем с помощью стратегии, разработанной Дж. Саксом (см. [1], с. 66): для удовлетворения требованию  $R_e$ :  $A \neq \varphi_e^{B-C}$ , где  $e \in \omega$ , на каждом шаге конструкции, на котором рассматривается  $R_e$ , находим наибольшее число  $x$  такое, что  $A_s[x] = \varphi_{e,s}^{B_s - C_s}[x]$ , и запрещаем для множества  $B - C$  интервал  $\{0, u\}$ , где  $u = \max\{\text{use}(B_s - C_s, e, t, s) : t \leq x\}$ . Запрету присваиваем приоритет  $e$ . Для удовлетворения  $R_e$  этого достаточно. Действительно, если, напр.,  $A = \varphi_e^{B-C}$ , то множество  $A$  рекурсивно: пусть  $s$  — шаг, к которому требования с большими приоритетами удовлетворены. Для вычисления  $A(x)$  для произвольного  $x$  находим шаг  $n \geq s$  такой, что  $A_n[x] = \varphi_{e,n}^{B_n - C_n}[x]$ . Такой шаг найдется, и должно быть  $A(x) = A_n(x)$ .

Для выполнения условия 2) используем „метод разрешения“, разработанный Р. Фридбергом, А. А. Мучником, С. Е. М. Ейтсом и описанный, напр., в [1] (с. 31). Стратегия заключается в следующем. Пусть  $K$  — креативное множество. Для каждого  $x \in N$  определяем интервал  $(0, u_x)$  и ждем перечисления числа  $x$  в  $K$ . Если  $x \in K_s - K_{s-1}$ , то для некоторого  $t \geq s$  добиваемся выполнения либо неравенства  $A[u_x] \neq A_t[u_x]$ , либо неравенства  $B - C[u_x] \neq B_t - C_t[u_x]$ . Если вам удастся это сделать для каждого  $x \in N$ , то  $K \leq_T A \oplus (B - C)$ , т. к., очевидно,  $K(x) = K_s(x)$ , где  $s$  — тот шаг, для которого  $A_s \oplus (B_s - C_s)[u_x] = A \oplus (B - C)[u_x]$ . Ясно, что выполнение первого неравенства от нашего желания не зависит, а выполнению второго неравенства могут препятствовать запреты, созданные в процессе работы по первой стратегии (для удовлетворения  $R_e$ ). Поэтому мы постуаем следующим образом.

При перечислении  $x$  в  $K_s$  некоторое число  $u \leq u_x$  включаем в  $B$  (игнорируя любые запреты) и ждем изменения  $A[u_x]$ . Если для некоторого  $t > s$

$A_s[u_x] \neq A_t[u_x]$ , то  $u$  включаем в  $C$  (удаляем из  $B - C$ ). Из конструкции будет видно, что таким образом эти две стратегии могут быть успешно соединены.

Обозначим через  $P_e$  требование

$$e \in K_s - K_{s-1} \Rightarrow A_s[u_e] \neq A[u_e] \vee (B_s - C_s)[u_e] \neq (B - C)[u_e]$$

и примем следующее приоритетное упорядочение требований:  $P_0, R_0, P_1, R_1, \dots$

Разъяснение конструкции. Последовательно для чисел  $0, 1, \dots$ , еще не перечисленных в  $K$ , устанавливаем маркеры  $u_0, u_1, u_2, \dots$  так, чтобы они располагались правее всех запретов. Как только некоторое число  $i$  перечислится в  $K_s$ , добиваемся выполнения  $A_s \oplus (B_s - C_s)[u_i] \neq A \oplus (B - C)[u_i]$ . Но может случиться, что  $A_s[u_i] = A[u_i]$ , а интервал  $(0, u_i)$  входит в зону некоторого запрета с большим приоритетом. Чтобы это не произошло, как только некоторое требование  $R_e, e < i$ , создаст запреты; содержащее  $(0, u_i)$ , мы тут же этот маркер  $u_i$  передвигаем направо, располагая его правее всех запретов. При этом мы вынуждены число  $u_{i,s}$  — позицию маркера  $u_i$  на шаге  $s$  — перечислить в  $B$  (иначе могло бы оказаться  $A_{s'} \oplus (B_{s'} - C_{s'})[u_{i,s}] = A \oplus (B - C)[u_{i,s}]$  для  $s' < s$ , но  $i \in K_s - K_{s'}$ ). Таким образом, мы нарушаем запрет требования  $R_e$  ради удовлетворения требования  $P_i$ , имеющего меньший приоритет. Это может привести к последующему увеличению запрета  $R_e$ , в результате чего  $u_i$  снова может оказаться в зоне запрета  $R_e$ . Тогда снова передвигаем  $u_i$ , перечислив  $u_{i,s'}$  в  $B$  и т. д. Одновременно следим за поведением множества  $A$  в интервалах  $(0, u_{i,s})$ ,  $s \in N$ . Для некоторого  $s$  должно случиться, что  $A_s[0, u_{i,s}] \neq A[0, u_{i,s}]$ , иначе  $A$  рекурсивно. Как только для некоторого  $s$   $A_s[u_{i,s}] \neq A[u_{i,s}]$ , то все числа  $u_{i,s'}$ ,  $s' \leq s$ , перечисленные в  $B$  при передвижении  $u_i$ , перечисляем в  $C$  ( $u_{i,s'}$  убираем из  $B - C$ ), добиваясь выполнения  $R_e$ .

Кроме того, как только  $i \in K_s$  и  $u_{i,s}$  не входят в зону запрета с большим приоритетом, то число  $u_{i,s}$  перечисляем в  $B$ .

Перейдем к подробному изложению конструкции. Пусть  $A_0 = B_0 = A_1 = B_1 = \emptyset$ . Для удобства фиксируем такое перечисление элементов  $K$ , что  $\forall s > 0 (K_{2s} - K_{2s-1} = \emptyset \ \& \ |K_{2s-1} - K_{2s-2}| \leq 1)$ .

В процессе конструкции устанавливаем маркеры  $\{u_i\}_{i \geq 0}$ . Позицию маркера  $u_i$  к концу шага  $s$  обозначим через  $u_{i,s}$ . На каждом шаге будет задействовано только конечное множество маркеров. На шаге  $s + 1$   $u_{i,s+1} = u_{i,s}$ , если маркер  $u_i$  не перемещается на новую позицию. Число называется свободным на шаге  $s$ , если оно строго больше как всех запрещенных к шагу  $s$  чисел, так и позиций всех маркеров, установленных к шагу  $s$ .

Шаг  $2s, s > 0$ . Пусть  $(s)_0 = e$ . Находим наибольшее число  $x$ , для которого  $A_{2s}[x] = \varphi_{e, 2s}^{B_{2s} - C_{2s}}[x]$ , и запрещаем с приоритетом  $e$  для множества  $B - C$  интервал  $(0, u)$ , где  $u = \max \{use(B_{2s} - C_{2s}, e, t, 2s) : t \leq x\}$ . Переходим к шагу  $2s + 1$ .

Шаг  $2s + 1, s \geq 0$ . 1°. а) Для каждого  $e$  перемещаем все не исключенные из рассмотрения маркеры  $u_i, i > e$ , оказавшиеся в зоне запрета  $R_e$  и для которых  $i \in K_{2s+1}$ , направо на первые свободные места, сохраняя порядок их расположения. Перечисляем число  $u_{i_0, 2s}$ , позицию левого крайнего такого маркера, в  $B_{2s+1}$  (теперь для всех таких маркеров  $u_i$  имеем  $B_{2s} - C_{2s}[u_{i, 2s}] \neq B - C[u_{i, 2s}]$ ). б) Маркеры  $u_j, j > i$ , расположенные правее таких  $u_i$  и также не исключенные из рассмотрения, передвигаем вместе с  $u_i$ , сохраняя порядок расположения маркеров.

2°. Для каждого не исключенного из рассмотрения маркера  $u_i$ , перемещенного в п. 1° а) одного из нечетных шагов  $2s' + 1, s' \leq s$ , на новую позицию, проверяем условие  $\exists t (t_0 \leq t \leq 2s \ \& \ A_{2s+1}[u_{i,t}] \neq A_t[u_{i,t}])$ , где  $t_0$  — шаг, для которого  $i \in K_{t_0} - K_{t_0-1}$ . Если это условие выполняется, то все позиции  $u_{i,t}, t_0 \leq t \leq 2s$ , перечисленные в  $B$  (но не в  $C$ ), перечисляем в  $C_{2s+1}$ , и маркер  $u_i$  исключаем из дальнейшего рассмотрения.

3°. Находим (если существует) число  $x \in K_{2s+1} - K_{2s}$ . Если маркер  $u_x$  уже установлен и число  $u_{x, 2s}$  не входит в зону запрета некоторого требования

с большим приоритетом, то число  $u_{x, 2s}$  перечисляем в  $B_{2s+1}$ , и маркер  $u_i$  исключаем из рассмотрения.

4°. Находим наименьшее число  $x \in \overline{K}_{2s+1}$ , для которого маркер  $u_x$  еще не установлен, устанавливаем  $u_x$  возле первого свободного числа. Переходим к шагу  $2s + 2$ .

*Лемма 1. Каждый маркер передвигается конечное число раз.*

*Доказательство.* Пусть  $i$  — наименьшее число такое, что  $u_i$  передвигается бесконечно и  $s$  — шаг, после которого  $u_j$ ,  $j < i$ , не передвигаются. После шага  $s$  передвижение  $u_i$  означает, что некоторое  $R_e$ ,  $e < i$ , создает все новые и новые запреты, вынуждая  $u_i$  передвигаться на новые позиции. Это значит, что мы больше не имеем дело с п. 2°, т. е. для каждой новой позиции  $u_{i, s}$   $A_{2s+1}[u_{i, s}] = A[u_{i, s}]$ . Это означает рекурсивность  $A$ .

*Лемма 2. Каждое требование  $R_e$  удовлетворяется, т. е.  $A \neq \varphi_e^{B-C}$  и  $R_e$  создает конечное множество запретов.*

*Доказательство.* Пусть  $A = \varphi_e^{B-C}$  и  $\forall i < e$  ( $R_i$  удовлетворено). По лемме 1 найдется шаг  $s$ , после которого маркеры  $u_i$ ,  $i \leq e$ , больше не передвигаются, и  $R_i$ ,  $i < e$ , новых запретов не создают. Теперь либо найдется шаг  $s_1 > s$ , начиная с которого запреты, наложенные из-за  $R_e$ , больше не будут нарушаться, либо некоторый  $u_j$ ,  $j > e$ , передвигаясь бесконечно часто, эти запреты бесконечно часто нарушает. При этом условии п. 2° шага  $2s + 1$  не должно выполняться, иначе, перечисляя соответствующие числа в  $C$ , мы эти запреты восстанавливаем. Это снова (см. доказательство леммы 1) означает, что множество  $A$  рекурсивно.

*Лемма 3.  $K \leq_T A \oplus (B - C)$ .*

*Доказательство.* По произвольному  $x \in N$  находим первый шаг  $s$  такой, что либо  $x \in K_s$ , либо на шаге  $s$  устанавливается маркер  $u_x$ . Если  $x \in K_s$ , то  $x \in K$ . Если  $x \notin K_s$ , то находим такую позицию  $u_{x, s_1}$  маркера  $u_x$ , что  $A[u_{x, s_1}] = A_{s_1}[u_{x, s_1}]$  и  $B_{s_1} - C_{s_1}[u_{x, s_1}] = B - C[u_{x, s_1}]$  (по лемме 1 такой шаг найдется). По конструкции имеем  $x \in K \Leftrightarrow x \in K_{s_1}$ .

Теорема полностью доказана.

*Теорема 2. Для любой нерекурсивной разности  $A_1 - A_2$  р. п. множеств  $A_1$  и  $A_2$  найдется разность  $B - C$  р. п. множеств  $B$  и  $C$  такая, что  $B - C <_T \emptyset'$  и  $(A_1 - A_2) \oplus (B - C) \equiv_T \emptyset'$ .*

*Доказательство.* Пусть  $f$  — взаимно однозначная функция такая, что  $f$  общерекурсивна и  $\text{rang}(f) = A_1$ . Легко проверить, что множество  $A \equiv_T f^{-1}(A_2)$  р. п. и  $\emptyset <_T A \leq_T A_1 - A_2$ . Пусть  $B$  и  $C$  — р. п. множества, построенные в теореме 1 по множеству  $A$ . Имеем  $B - C <_T \emptyset'$  и  $\emptyset' \equiv_T A \oplus \oplus (B - C) \leq_T (A_1 - A_2) \oplus (B - C) \leq_T \emptyset'$ , что и требовалось доказать.

*Следствие 1. Полурешетки р. п. степеней и степеней, содержащих разности р. п. множество, не элементарно эквивалентны.*

*Доказательство.* С. Б. Купер и С. Е. М. Ейтс установили (см., напр., [4], с. 187), что предложение  $\exists a (a > 0 \ \& \ \forall b < 0' (a \cup b < 0'))$  в полурешетке р. п. степеней истинно. В теореме 2 доказано, что оно ложно в полурешетке степеней, содержащих разности р. п. множеств.

*Следствие 2. Существует такая собственно d-р. п. степень  $a < 0'$ , что между  $a$  и  $0'$  нет р. п. степеней.*

*Доказательство.* Пусть  $a$  — такая р. п. степень, что  $a > 0$  и  $\forall b < 0' (a \cup b < 0')$ . По теореме 1 существует d-р. п. степень  $b < 0'$ , для которой  $a \cup b = 0'$ . Между  $b$  и  $0'$  нет р. п. степеней.

*Теорема 3. Пусть  $a > 0$  есть n-р. п. степень,  $1 < n < \omega$ . Существует d-р. п. степень  $b < 0'$  такая, что  $a \cup b = 0'$ .*

*Доказательство.* Известно (см. [1], теорема 7-III), что существует такая р. п. степень  $a_1$ , что  $0 < a_1 \leq a$ . По теореме 1 существует d-р. п. степень  $b$  такая, что  $a_1 \cup b = 0'$ ;  $a \cup b = 0'$ .

*Следствие 3. Полурешетки р. п. степеней и степеней, содержащих i-р. п. множества для произвольных фиксированных  $n$ ,  $1 < n < \omega$ , не элементарно эквивалентны.*

Для доказательства см. доказательство следствия 1 теоремы 2.

В теореме 4 доказывается, что над каждой р. п. степени  $\alpha < 0'$  находится собственно  $d$ -р. п. степень.

Теорема 4. Пусть  $A$  — не  $T$ -полное р. п. множество. Существуют р. п. множества  $B$  и  $C$ , для которых

$$A <_T B - C <_T \emptyset' \text{ и } \forall x (W_x \neq_T B - C).$$

Доказательство. Искомые р. п. множества строим по шагам, удовлетворяя для каждого  $x = \langle e, i, j \rangle$ , где  $\langle e, i, j \rangle$  — канторовская нумерация троек натуральных чисел, требованию

$$R_x: A \oplus (B - C) \neq \varphi_i^{W_e} \vee W_e \neq \varphi_j^{A \oplus (B - C)}. \quad (1)$$

При доказательстве мы используем описанную нами в [1] (теорема 2-1) конструкцию р. п. множеств  $B$  и  $C$ ,  $C \subseteq B$ ,  $T$ -степень разности которых  $B - C$  не содержит р. п. множества. Искомые множества строятся методом приоритета с конечными нарушениями. Напомним эту конструкцию.

Для удовлетворения требованию  $R_x: B - C \neq \varphi_i^{W_e} \vee W_e \neq \varphi_j^{B - C}$ :

а) берем некоторое число  $a$ , еще не положенное в  $B$  и не задержанное какими-либо запретами, и ждем такого шага  $s$ , на котором

$$0 = B_s - C_s(a) = \varphi_{i,s}^{W_{e,s}}(a) \& W_{e,s}[u'] = \varphi_{j,s}^{B_s - C_s}[u'], \quad (2)$$

где  $u' = \text{use}(W_{e,s}, i, a, s)$  (если такой шаг  $s$  не встретится, то требование  $R_x$  удовлетворено);

б) включаем число  $a$  в  $B_{s+1}$  (нарушаем левый конъюнкт соотношения (2)) и запрещаем с приоритетом  $x$  интервал  $(0, u)$ , где  $u = \max\{\text{use}(B_{s+1} - C_{s+1}, j, t, s + 1) : t \leq u'\}$ ;

в) ждем появления шага  $s_1 > s$  такого, что

$$1 = B_{s_1} - C_{s_1}(a) = \varphi_{i,s_1}^{W_{e,s_1}}(a) \& W_{e,s_1}[u'_1] = \varphi_{j,s_1}^{B_{s_1} - C_{s_1}}[u'_1], \quad (3)$$

где  $u'_1 = \text{use}(W_{e,s_1}, i, a, s_1)$  (если такой шаг  $s$  не встретится, то требование  $R_x$  снова удовлетворено);

г) включаем число  $a$  в  $C_{s_1+1}$  и запрещаем с приоритетом  $x$  интервал  $u_1 = \max\{\text{use}(B_{s_1+1} - C_{s_1+1}, j, t, s_1) : t \leq u'_1\}$ .

Теперь требование  $R_x$  окончательно удовлетворено, т. к. левый конъюнкт соотношения (2) на шаге  $s_1$  стал, как на шаге  $s$ ,  $B_{s_1} - C_{s_1}[u] = B_s - C_s[u]$ , а  $W_{e,s} \subseteq W_{e,s_1}[u]$ , т. к. правый конъюнкт соотношения (3) мог выполняться только из-за перечисления в  $W_e$  между шагами  $s$  и  $s_1$  новых элементов.

Для завершения доказательства для всех  $x$  производим приоритетное упорядочение всех требований  $R_x$  и проводим обычную приоритетную конструкцию, при каждом нарушении запретов требования  $R_x$  выбирая новое число  $a$ .

Единственная трудность, которая встречается при использовании этой конструкции для удовлетворения соотношения (1), — появление множества  $A$  в оракулах равенств  $W_{e,s}[u'] = \varphi_{j,s}^{A \oplus (B_s - C_s)}[u']$  и  $W_{e,s}[u] = W_{e,s_1}[u'_1] = \varphi_{j,s_1}^{A \oplus (B_{s_1} - C_{s_1})}[u'_1]$  в соотношениях (2) и (3) соответственно: после достижения равенств (2) или (3) (если они не будут достигнуты, то требование  $R_x$  удовлетворено) может измениться множество  $A$  в соответствующем отрезке, что в свою очередь может привести к нарушению (2) и (3). Для преодоления этой трудности используем, как и при доказательстве теоремы 1, метод разрешения, пытаясь эти изменения множества  $A$  использовать для  $T$ -сведения креативного множества  $K$  к  $A$ . Мы снова с каждым числом  $i$  связываем маркер  $u_i$  и пытаемся добиться соотношения  $i \in K_s - K_{s-1} \Rightarrow \exists t \geq s \{A_t[u_{i,t}] \neq A[u_{i,t}]\}$ , где  $u_{i,t}$  — текущая позиция маркера  $u_i$ .

Опишем конструкцию более подробно.

Для удовлетворения  $R_x$  берем некоторое число  $a$ , еще не положенное в  $B$  и не задержанное запретами, и:

а) ждем такого шага  $s$ , на котором

$$0 = A_s \oplus (B_s - C_s)(a) = \varphi_{i,s}^{W_{e,s}}(a) \& W_{e,s}[u'] = \varphi_{j,s}^{A_s(B_s - C_s)}[u'], \quad (4)$$

где  $u' = \text{use}(W_{e,s}, i, a, s)$  (если такой шаг не встретится, то требование  $R_x$  удовлетворено);

б) число  $a$  пока в  $B_{s+1}$  не включаем, а:

б1) устанавливаем маркер  $u_0$ , выбирая его позицию

$$u_{0,s} = 1 + \max \{ \text{use}(A_s \oplus (B_s - C_s), j, t, s) : t \leq u' \};$$

б2) ждем перечисления числа 0 в  $K$ ;

б3) одновременно берем новое число  $a_1$ , еще не положенное в  $B$  и не задержанное требованиями  $\{R_x\}_{x \in N}$ , для него снова ждем выполнения соотношения (4); при его выполнении устанавливаем маркер  $u_1$ , выбирая его позицию как для маркера  $u_0$  с заменой  $a$  на  $a_1$ ; ждем перечисления 1 в  $K$ ; берем новое число  $a_2$  и т. д.

Как только в этом процессе на некотором шаге  $s'$  мы дождемся перечисления какого-нибудь числа, напр., числа 0 в  $K_{s'}$ , то:

в) число  $a$  включаем в  $B_{s'+1}$  (нарушаем левый конъюнкт (4) и запрещаем с приоритетом  $x$  интервал  $(0, u'_0)$ ,  $u'_0 = \max \{ \text{use}(B_{s'+1} - C_{s'+1}, j, t, s' + 1) : t \leq u' \}$ ;

г) ждем появления шага  $s_1 > s$  такого, что

$$1 = A_{s_1} \oplus (B_{s_1} - C_{s_1})(a) = \varphi_{i,s_1}^{W_{e,s_1}}(a) \& W_{e,s_1}[u_0'] = \varphi_{j,s_1}^{A_{s_1} \oplus (B_{s_1} - C_{s_1})}[u_0'], \quad (5)$$

где  $u_0' = \text{use}(W_{e,s_1}, i, a, s_1)$ ;

д) включаем число  $a$  в  $C_{s_1+1}$  и запрещаем с приоритетом  $x$  интервал  $(0, u_0)$ ,  $u_0 = \max_{t < u_0'} \{ \text{use}(A_{s_1+1} \oplus (B_{s_1+1} - C_{s_1+1}), j, t, s_1) \}$ .

При этом:

е) как только множество  $A$  изменится в интервале, входящем в оракул из (4) и (5) для очередного числа  $a_i$ , весь процесс начинаем сначала, с п. а) для этого  $a_i$ . Заметим, что бесконечное возвращение в п. а) из п. е) для некоторого  $a_i$  означает, что функция  $\varphi_j^{A \oplus (B-C)}$  не всюду определена и поэтому требование  $R_x$  удовлетворено.

Как только для удовлетворения какого-нибудь требования  $R_x$  в  $B$  или  $C$  перечислим некоторое число, то весь описанный процесс удовлетворения требования  $R_y$ ,  $y > x$ , начинаем сначала. Мы полагаем, что для  $x < y$  требование  $R_x$  имеет больший, чем  $R_y$ , приоритет, и в процессе удовлетворения требования  $R_x$  игнорируем запреты  $R_y$ .

Если для удовлетворения какого-нибудь требования  $R_x$  в пп. в) или д) в  $B$  или  $C$  перечислим некоторое число  $a_i$ , входящее в зону запрета того же требования, созданную с числом  $a_j$ ,  $i \neq j$ , то процесс удовлетворения требования  $R_x$  посредством  $a_j$  начинаем сначала: выбираем новое число  $a_j$ , ждем выполнения соотношения (4), устанавливаем маркер  $u_j$  на новую позицию и т. д.

Ясно, что либо для некоторого  $a_i$  этот процесс должен завершиться успешно (после п. б) п. в) не встречается, и множество  $A$  в интервале  $(0, u_i)$  не меняется, либо после п. б) мы приходим в п. в), и множество  $A$  в интервале  $(0, u_i)$  не меняется), либо при каждом перечислении  $i$  в  $K$  попытка удовлетворения (4) и (5) в пп. б) и в) наталкивается на изменение множества  $A$  в интервале  $(0, u_i)$ . Но последнее теперь означает, что  $K \leq_T A$ : для вычисления  $K(i)$  для произвольного  $i$  находим шаг  $s$  и число  $u_{i,s}$ , позицию маркера  $u_i$  на шаге  $s$  такие, что  $A_s[u_{i,s}] = A[u_{i,s}]$ . По конструкции имеем  $K(i) = K_s(i)$ . Теорема доказана.

Заметим, что подробное доказательство третьего утверждения из [6] (для любой  $d$ -р. п. степени  $a < \theta'$  существуют  $d$ -р. п. степени  $b$  и  $c$  такие,

что  $a < b < 0'$ ,  $a < c < 0'$ ,  $b \cup c = 0'$ ) приведено в [8]. При этом на самом деле получаются следующие утверждения.

1. Для любой р. п. степени  $a < 0'$  существуют  $\omega$ -р. п. степени  $b < 0'$ ,  $c < 0'$  такие, что  $a < b$ ,  $a < c$ ,  $b \cup c = 0'$ .

2. Для любой  $d$ -р. п. степени  $a < 0'$  существуют степени  $b < 0'$ ,  $c < 0'$  такие, что  $a < b$ ,  $a < c$ ,  $b \cup c = 0'$ .

#### ЛИТЕРАТУРА

1. Арсланов М. М. Рекурсивно перечислимые множества и степени неразрешимости.—Казань, 1986.—206 с.
2. Cooper S. B. Degrees of unsolvability // Ph. D. Thesis.—Leicester University, 1971.
3. Epstein R. L., Haas R., Kramer R. Hierarchies of sets and degrees below  $0'$  // Lect. Notes Math.—1981.—V. 859.—P. 32—48.
4. Арсланов М. М. Об одной иерархии степеней неразрешимости // Вероятн. методы и кибернетика.—1982.—№ 18.—С. 10—17.
5. Jockusch C. G., Shore R. A. Pseudo jump operators. II. Transfinite iterations, hierarchies and minimal covers // J. Symb. Logic.—1984.—V. 49.—P. 1205—1236.
6. Арсланов М. М. Структурные свойства степеней ниже  $0'$  // ДАН СССР.—1985.—Т. 283.—№ 2.—С. 270—273.
7. Cooper S. B. On a theorem of C. E. M. Yates // Handwritten notes.—1974.
8. Арсланов М. М. Локальная теория степеней неразрешимости и  $\Delta_2^0$ -множества.—Казань, 1987.—140 с.

г. Казань

Поступила  
16.02.1988